

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RUBÉOLA NO PERÍODO DE 2001 A 2004 NO ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL

MARIA DARCÍLIA RODRIGUES ARAÚJO

SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE / SVS - SECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Introdução

A implementação do Plano de Erradicação do Sarampo no país, a partir de 1999 impulsionou a vigilância e o controle da rubéola no Brasil, o que corresponde a um decréscimo de 95% quando comparado à incidência de 1997. As taxas de incidência no sexo feminino, em 2002, ficaram em 1/10⁵ mulheres tanto na faixa etária de 15-19 como de 20-29 anos. Em 2003, foram confirmados 561 casos de rubéola entre os 16036 casos suspeitos notificados, demonstrando a alta sensibilidade e especificidade do sistema de vigilância.

Objetivo

Demonstrar o avanço da Vigilância da Rubéola no Estado de Rondônia após a implementação do Plano de Erradicação do Sarampo e Controle da Rubéola e eliminação da Síndrome da Rubéola no país e o impacto da Campanha de Vacinação em Mulheres em idade fértil (MIF)

Metodologia

Esse estudo se baseou na análise de dados do sistema de notificação e avaliação da campanha de vacinação - MIF (Mulheres em Idade Fértil) a técnica analítica utilizada foi o banco de dados da Vigilância Epidemiológica dos anos de 2001 a 2004.

Resultados


O resultado da campanha de MIF realizada no ano de 2001 demonstrou importante declínio na incidência do número de casos de rubéola no decorrer dos anos seguintes. Há incidência da sensibilização da Vigilância epidemiológica no Estado, pois houve incremento nas notificações por regionais de saúde

Tabela 1 – Distribuição de casos e incidência de rubéola, segundo sexo e ano de ocorrência – Rondônia, 2000 a 2004.


Ano	Sexo					
	Feminino			Masculino		
	Casos	População	Inc./100.000	Casos	População	Inc./100.000
2000	292	671.647	43,5	249	708.140	35,2
2001 – Campanha (MIF)	12	685.089	1,8	15	722.789	2,1
2002	13	696.570	1,9	5	735.206	0,7
2003	3	708.100	0,4	1	747.814	0,1
2004	1	719.615	0,1	0	760.325	0,0

Fonte: SINAN/SESAU/RO e IBGE


**Municípios que notificaram casos suspeitos de Rubéola
IDRS-JI-PARANÁ
2001-2004**




**Municípios que notificaram casos suspeitos de Rubéola
II DRS - CACOAL
2001-2004**



**Municípios que notificaram casos suspeitos de Rubéola
III DRS - VILHENA
2001-2004**



**Municípios que notificaram casos suspeitos de Rubéola
IV DRS - ROLIM DE MOURA
2001-2004**



Conclusão

Para alcançar os indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde é importante manter uma vigilância epidemiológica atuante nos municípios do Estado de Rondônia, Brasil e coberturas vacinais mais homogêneas.