



Unidad de Enfermedades No Transmisibles

Cuadro 2:

Neoplasia maligna del cuello uterino— Tasas de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad

(por cada 100.000 mujeres, por región, 2000 y 2002)

Región	2000		2002	
	Tasa de incidencia	Tasa de mortalidad	Tasa de incidencia	Tasa de mortalidad
África Oriental	44.3	24.2	42.7	34.6
Melanesia	43.8	23.8	38.1	21.7
Centro América	40.3	17.0	30.6	15.0
Caribe	35.8	16.8	32.6	16.0
América del Sur	30.9	12.0	28.6	12.9
América del Norte	7.9	3.2	7.7	2.3

Fuente: Ferlay et al. GLOBOCAN 2000 y 2002. Lyon: Agencia Internacional para Investigaciones en Cáncer / Internacional Agency for Cancer Research (IARC).

Este cuadro proporciona una actualización de los datos presentados en el Cuadro 26, pág. 2 de: Lewis, Merle J. [Análisis de la situación del cáncer cervicouterino en América Latina y el Caribe](#). Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 2004.

Los lectores deben observar los siguientes puntos, hechos por IARC, cuando examinen estos datos:

- ❖ Dado que las fuentes de datos están mejorando continuamente en la calidad y alcance, los cálculos quizá no sean verdaderamente comparables con el transcurso del tiempo, y debe tenerse cuidado cuando se comparen estos cálculos con aquellos publicados anteriormente. Las diferencias observadas pueden ser el resultado de un cambio en la metodología y no deben interpretarse como un efecto de la tendencia de tiempo.
- ❖ Estos cálculos se basan en los datos más reciente de incidencia, mortalidad y supervivencia disponibles en IARC, pero cifras más recientes pueden estar disponibles directamente de fuentes locales.