

Rompiendo el Silencio

Hoja de
Abogacía
No. 2:
Abril 2003



Prevención del VIH/SIDA en adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe

Nuevos Proyectos de Prevención de SIDA en Adolescentes y Jóvenes OPS/ASDI/NORAD

Sexualidad de adolescentes en América Latina y el Caribe

- Aproximadamente 50% de menores de 17 años son sexualmente activos en la Región (FNUAP, 1997).
- En muchos países de América Latina las mujeres tienen el primer acto sexual entre 15 y 16 años y los varones entre los 14 y 16. Sin embargo, aproximadamente un tercio inicia su actividad sexual sin haber cumplido los 15 años (OPS, 2002a).
- Existe un reconocimiento creciente que los jóvenes de 14-15 años constituyen un grupo importante de abordar (OMS, 2002).
- Para niñas la iniciación sexual antes de los 15 años no es siempre una elección personal. Una tasa elevada de mujeres peruanas (62%), que tienen su primera experiencia sexual siendo menores de 15 años, indican que ésta fue coercitiva (Cáceres y cols., 2000).
- Para algunos varones, la iniciación sexual temprana tampoco es una decisión personal. Presiones sociales—mensajes distorsionados en TV, adultos “machos”, a los que perciben como modelos a imitar—alientan a los adolescentes varones a asociar la masculinidad con la experiencia sexual prematura (Aguirre y Güell, 2002).
- Estimados que incluyen todas las formas de sexo no voluntario, sugieren que alrededor de 25% de las jóvenes y casi 10% de los varones han sido sexualmente victimizados antes de alcanzar los 15 años de edad (Foshee y cols., 1998).

¿Están protegiéndose los adolescentes? ¿Los estamos protegiendo?

- En general, los niveles de conocimiento de anticonceptivos y VIH/SIDA es alto en jóvenes de la Región (Schutt-Aine y Maddaleno, 2003).
- Sin embargo, sólo el 4,3% de las mujeres jóvenes de 15 a 19 años en Perú usa condón con su pareja (INEI, 2000).
- Datos de Guatemala indican que 69% de adolescentes entre 15 y 19 años dice conocer al menos un método de planificación familiar, pero solamente 4% de los jóvenes sexualmente activos señala usar condones en forma regular (PAHO, 2002a).
- Encuestas en el Caribe sugieren que 40% de mujeres y 50% de varones no acceden a contraceptivos en su primer encuentro sexual (UNICEF, 1997b).



¿Cómo afecta esto a nuestros jóvenes?

- Estimados indican que 560.000 jóvenes, entre 14 y 24 años, contrajeron SIDA en América Latina y el Caribe (Schutt-Aine y Maddaleno, 2003).
- Alrededor de la mitad de las nuevas infecciones afectan a personas de 15 a 24 años (ibid).
- Bahamas reporta un incremento de 25% en la incidencia de HIV/SIDA en adolescentes de 1999 a 2000 (OPS, 2002b).
- En República Dominicana un 44% de mujeres tuvo su primera experiencia sexual antes de los 15 años y 78% de ese grupo resultó embarazada (Calderón, 2002).



¿Cómo proteger mejor a nuestras futuras generaciones?

A esta hoja de abogacía le seguirán otras dos que explicarán programas y políticas efectivas y necesarias para empoderar a los adolescentes y protegerlos del VIH/SIDA, las cuales pueden implementarse a nivel de país.

“Debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo”
Ghandi



Diseño: Sylvia Singleton

Bibliografía



Aguirre y Güell (2002). Hacerse hombres: La construcción de la masculinidad en los adolescentes y sus riesgos. OPS/ASDI/Fundación W.K. Kellogg/FNUAP. Washington, DC.

Cáceres y cols. (2000). "Sexual Coercion among Youth and Young Adults in Lima, Peru". *Journal of Adolescent Health*. noviembre.; 27(5):361-7.

Calderón (2002). *Foro Nacional de Prevención y Atención de Embarazos en Adolescentes*. Presentación realizada en Juan Dolio, República Dominicana. Octubre.

FNUAP (1997). UNFPA and Adolescents. Nueva York.

Foshee y cols. (1998). "An Evaluation of Safe Dates, an Adolescent Dating Violence Prevention Program". *American Journal of Public Health*, enero. Vol. 88, no. 1.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2000). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: Perú. Lima.

OMS (2002). "Adolescent Health Provision on Health Services". *Briefing Notes on Selected Adolescent Health Issues*. Resumen 3, enero. Ginebra.

OPS (2002a). Health in the Americas. Vol. 1, p. 174. Washington, DC.

OPS (2002b). Health Situation of the Americas. Capítulo de Bahamas. Washington, DC.

Schutt-Aine y Maddaleno (2003). Salud sexual y desarrollo de adolescentes y jóvenes en las Américas: Implicaciones de programas y políticas. OPS/ASDI/NORAD. Washington, DC.

UNICEF (1997b). Adolescent Childbearing in Latin America and the Caribbean. Nueva York.



Un equipo, un objetivo para los adolescentes de Latinoamérica y el Caribe

Organización Panamericana de la Salud
Salud de la Familia y la Comunidad (FCH)
Salud del Niño y el Adolescente (FCH/CA)
VIH/SIDA/ITS (FCH/AI)
Escríbanos a singlets@paho.org