

Anexo estadístico

Antecedentes

Cada año, más de 100 países le envían información detallada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del número de defunciones por diversas enfermedades, afecciones o lesiones ocurridas en su territorio. Los datos de estos Estados Miembros de la OMS se recaban de los sistemas de registro civil usando los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (1, 2). Los sistemas nacionales de registro de estadísticas vitales captan cerca de 17 millones de defunciones que se registran anualmente en todo el mundo. Los datos de estos sistemas de registro, así como los de encuestas, censos y estudios epidemiológicos, son analizados por la Organización Mundial de la Salud para determinar las características de las causas de muerte en los países, las regiones y el mundo.

La OMS también ha usado estos datos, junto con otra información, para evaluar la carga mundial de morbilidad. Estos cálculos, publicados por vez primera en 1996, representan el examen más cabal jamás realizado de la mortalidad y la morbilidad mundial (3). Está en curso una nueva evaluación de la carga mundial de morbilidad para el año 2000 (4). En esta sección se presentan las estimaciones de la carga mundial de lesiones para el año 2000. Se ofrece enseguida una descripción de los cuadros incluidos en el anexo y de los datos que se usaron para calcular las defunciones relacionadas con la violencia en el año 2000.

Tipos de cuadros

- El anexo estadístico incluye tres tipos de cuadros:
- estimaciones mundiales y regionales de la mortalidad;
 - las 10 principales causas de muerte y los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) de todos los Estados Miembros de la OMS en conjunto y de cada región de la OMS;
 - las tasas de mortalidad de los distintos países.

Estimaciones mundiales y regionales de la mortalidad

El cuadro A.1 proporciona un resumen de los números de habitantes usados para calcular las tasas de

mortalidad mundiales y regionales. Los cuadros A.2 a A.5 recogen estimaciones de la mortalidad relacionada con la violencia para el año 2000. El cuadro A.2 presenta estimaciones de la mortalidad por todas las lesiones intencionales, agrupados por sexo, grupo de edad, región de la OMS e ingreso. Las estimaciones de homicidio, suicidio y guerra se dan por separado en los cuadros A.3 a A.5, desglosados por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingresos.

Causa de muerte y posiciones según los AVAD

El cuadro A.6 presenta las 10 principales causas de muerte y los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) correspondientes al año 2000, así como las posiciones respectivas de las defunciones y los AVAD relacionados con la violencia. Estas posiciones se dan para todos los Estados Miembros en conjunto y para cada una de las regiones de la OMS.

Las tasas de mortalidad de los países

En los cuadros A.7 a A.9 se presentan los números y las tasas de las defunciones causadas por lesiones intencionales, homicidio y suicidio, respectivamente, mientras que en el cuadro A.10 se proporcionan las cifras correspondientes para la mortalidad relacionada con armas de fuego, clasificadas según el modo de la muerte. En estos cuadros, los números absolutos y las tasas por 100 000 habitantes se agrupan por sexo y grupo de edad para los países que envían los datos a la OMS.

Métodos

Categorías

Las defunciones y las lesiones no mortales se clasifican según la causa subyacente, aplicando las reglas y convenciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (1, 2). La lista de causas del proyecto de Carga Mundial de Morbilidad (CMM) de 2000 tiene cuatro niveles de desglose e incluye 135 enfermedades y lesiones específicas (5). Las categorías de lesiones no intencionales e intencionales se definen teniendo en cuenta los códigos de causas

externas. Por ejemplo, los códigos para las lesiones intencionales son los siguientes:¹

- homicidio: CIE-9 E960–E969 o CIE-10 X85–Y09;
- suicidio: CIE-9 E950–E959 o CIE-10 X60–X84;
- lesiones resultantes de operaciones de guerra: CIE-9 E990–E999 o CIE-10 Y36;
- intervención legal: CIE-9 E970–E978 o CIE-10 Y35;
- todas las lesiones intencionales: CIE-9 E950–E978, E990–E999 o CIE-10 X60–Y09, Y35, Y36.

Los números absolutos y las tasas por 100 000 habitantes se presentan por sexo y región de la OMS para seis grupos de edad: 0–4 años, 5–14 años, 15–29 años, 30–44 años, 45–59 años y 60 años o más.

Regiones de la OMS

Los Estados Miembros de la OMS se agrupan en seis regiones: África, las Américas, Europa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Los países incluidos en cada región se indican en el cuadro A.1.

Los países pertenecientes a las seis regiones de la OMS en los cuadros A.1 a A.5 se subdividen por el nivel de ingresos, sobre la base de los cálculos para el año 1996 del producto nacional bruto (PNB) per cápita (actualmente denominado ingreso nacional bruto) compilados por el Banco Mundial y usados en el *Informe sobre la Salud en el Mundo 1999* (6). Usando el PNB per cápita, las economías se clasifican como de ingreso bajo (US\$ 785 o menos), de ingreso mediano (US\$ 786–9 635) o de ingreso alto (US\$ 9 636 o más).

Estimaciones mundiales de la mortalidad

El proyecto de CMM de 2000 usa los cálculos más recientes del número de habitantes de los Estados Miembros de la OMS preparados por la División de

Población de las Naciones Unidas (7). Se confeccionaron nuevas tablas de vida para el año 2000 de los 191 Estados Miembros de la OMS (8, 9). Los resultados de la primera versión del proyecto de CMM de 2000 con respecto a las lesiones que se dan a conocer aquí se basan en un análisis extenso de los datos de mortalidad para todas las regiones del mundo, junto con exámenes sistemáticos de estudios epidemiológicos y datos de servicios de salud (4). Los datos de registros de estadísticas vitales completos o incompletos, junto con los de sistemas de registro de muestras, abarcan el 72% de mortalidad mundial. Los datos de encuestas y obtenidos por técnicas demográficas indirectas proporcionan información sobre los niveles de la mortalidad de niños y adultos para el 28% restante de la mortalidad mundial calculada.

Los datos sobre la causa de defunción se han analizado para tener en cuenta la cobertura incompleta de los registros de estadísticas vitales en los países y las diferencias probables en las pautas de la causa de muerte que cabría prever en los subgrupos de población no cubiertos y a menudo más pobres (4). Por ejemplo, las características de las causas de defunción en China y la India se basaron en los sistemas existentes de registro de mortalidad. En China, se usaron el sistema de vigilancia de enfermedades por puntos y el sistema de registro de estadísticas vitales del Ministerio de Salud. En la India, los datos de mortalidad tomados del certificado médico de la causa de defunción se usaron para las zonas urbanas, y la encuesta anual de causas de muerte se empleó para las zonas rurales.

Para todos los otros países que carecían de datos de registro de estadísticas vitales, se usaron modelos de la causa de defunción para hacer un cálculo inicial de la distribución de máxima probabilidad de las defunciones en las categorías generales de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y lesiones, basándose en las tasas de mortalidad total estimadas y en los ingresos. A continuación, se elaboró un modelo regional de causas específicas de muerte basado en los datos locales del registro de estadísticas vitales y de la autopsia verbal, y esta distribución proporcional se aplicó luego dentro de cada grupo general de causas.

¹ Basados en la *Clasificación internacional de enfermedades*, novena revisión (CIE-9), y en la *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud*, décima revisión (CIE-10) (2).

Finalmente, se ajustaron los cálculos resultantes basándose en otros datos epidemiológicos procedentes de estudios de enfermedades y lesiones específicas.

Se prestó atención especial a los problemas de la atribución errónea o la mala codificación de las causas de defunción. La categoría «Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas» (E980–E989 en los códigos de tres dígitos de la CIE-9 o Y10–Y34 en la CIE-10) a menudo puede incluir una proporción considerable de defunciones por lesión. Salvo en los casos en que se cuenta con información local más detallada, estas defunciones se han asignado proporcionalmente a las otras causas de muerte por lesión.

Clasificaciones mundiales y regionales de los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD)

La medida basada en los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) se usa para cuantificar la carga de morbilidad (3, 10). El AVAD es una medida de las deficiencias de salud que combina la información sobre el número de años de vida perdidos por muerte prematura con la relativa a la pérdida de salud por discapacidad.

Los años vividos con discapacidad (AVD) son el componente de discapacidad de los AVAD. Los AVD miden los años equivalentes de vida saludable perdidos como resultado de las secuelas discapacitantes de las enfermedades y lesiones. Para calcularlos es necesario estimar la incidencia, la duración promedio de la discapacidad y las ponderaciones por discapacidad (que van de 0 a 1).

Muchas fuentes de información se usaron para calcular los AVD para las enfermedades y lesiones en el proyecto de la CMM de 2000. Entre ellas cabe mencionar datos nacionales e internacionales de vigilancia y registros de enfermedades, datos de encuestas de salud, datos de hospitales y servicios médicos, y estudios epidemiológicos internacionales y de determinados países (4).

El análisis de la carga de las lesiones efectuado por el proyecto de CMM de 2000 se basa en los métodos creados para el estudio de la CMM de 1990. Estos métodos definen un caso de lesión como el

que es lo bastante grave para necesitar atención médica o que conduce a la muerte. La estimación de los AVD secundarios a lesiones se basó en el análisis de las bases de datos de establecimientos de salud que registraron los códigos tanto del tipo como de la naturaleza de la lesión. Las bases de datos nacionales de Australia, Chile, Estados Unidos, Mauricio y Suecia se usaron para obtener las razones entre la mortalidad y la incidencia. Estas razones sirvieron luego para extrapolar los AVD de las defunciones debidas a lesiones para todas las regiones del mundo. Las razones de mortalidad a incidencia fueron muy uniformes para los países desarrollados y en desarrollo. La proporción de casos nuevos que ocasionaron secuelas discapacitantes a largo plazo se calculó para cada categoría de la naturaleza de la lesión sobre la base de un examen de estudios epidemiológicos a largo plazo de los resultados de las lesiones.

Para obtener el ordenamiento del cuadro A.6, las defunciones y las discapacidades se dividieron primero en tres grupos generales:

- enfermedades transmisibles, causas maternas y afecciones que surgen en el período perinatal, y carencias nutricionales;
- enfermedades no transmisibles;
- lesiones.

A continuación, las defunciones y las discapacidades se agruparon en categorías. Por ejemplo, las lesiones se dividieron en no intencionales e intencionales. Después de este nivel de desglose, las defunciones y las discapacidades se dividieron aún más en subcategorías. Las lesiones no intencionales, por ejemplo, se subdividieron en lesiones causadas por accidentes de tráfico, envenenamientos, caídas, incendios, ahogamiento y otras; por su parte, las lesiones intencionales se subdividieron en lesiones autoprovocadas, violencia interpersonal y lesiones relacionadas con la guerra. Las posiciones definitivas se obtuvieron ordenando las subcategorías.

Las 10 causas principales de defunción y AVAD se presentan en el cuadro A.6 para todos los Estados Miembros en conjunto y para cada una de las seis regiones de la OMS. En las regiones donde las defunciones y los AVAD relacionados con la violencia

se clasifican por debajo de las 10 causas principales, se menciona la posición real. Los AVAD que aparecen en el cuadro A.6 están basados en las tasas estándar de descuento de tiempo (3%) y en ponderaciones para la edad aceptadas (3).

Las tasas de mortalidad de los países

Los números y las tasas de mortalidad relacionada con la violencia, reunidos en los cuadros A.7 a A.10 corresponden al año más reciente entre 1990 y 2000 notificado a la OMS por los países con más de un millón de habitantes. Para los países con menos de un millón de habitantes, se da una tasa promedio basada en los tres últimos años de datos notificados a la OMS entre 1990 y 2000.

No se calcularon tasas cuando el número de defunciones en una categoría particular fue inferior a 20, aunque se presenta dicho número. Se informan las tasas específicas para la edad y estandarizadas por edades. Las tasas estandarizadas por edades se calculan aplicando las tasas específicas para la edad a la población estándar mundial (11) y permiten la comparación de las tasas en las poblaciones con diferente estructura de edades.

El número de habitantes utilizado para calcular las tasas de mortalidad para cada país en los cuadros A.7 a A.10 se pueden obtener de la Organización Mundial de la Salud en <http://www3.who.int/whosis/whsa/ftp/download.htm>.

Referencias

1. Manual de la clasificación estadística internacional de enfermedades, traumatismos y causas de defunción. Novena revisión. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1978.
2. Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Décima revisión. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1993.
3. Murray CJL, Lopez AD. The Global Burden of Disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA, Harvard School of Public Health, 1996 (Global Burden of Disease and Injury Series, Vol. I).
4. Murray CJL et al. The Global Burden of Disease 2000 project: aims, methods and data sources. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper No. 36).
5. Murray CJL, Lopez AD. Progress and directions in refining the global burden of disease approach: response to Williams. *Health Economics*, 2000, 9:69-82.
6. Informe sobre la salud en el mundo 1999: lograr el cambio. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1999.
7. Perspectivas de la población mundial. Revisión del 2000. Nueva York, NY, Naciones Unidas, 2001.
8. Lopez AD et al. Life tables for 191 countries for 2000: data, methods, results. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper No. 40).
9. Informe sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 2000.
10. Murray CJ, Lopez AD. Global health statistics. Cambridge, MA, Harvard School of Public Health, 1996 (Global Burden of Disease and Injury Series, Vol. II).
11. Ahmad OA et al. Age standardization of rates: a new WHO standard. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2000 (GPE Discussion Paper No. 31).

CUADRO A.1

Población (en miles) por sexo y grupo de edad, de todos los Estados Miembros de la OMS, 2000^a

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Total | Varones | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todos | 6 045 172 | 3 045 375 | 314 256 | 615 986 | 797 048 | 643 148 | 404 000 | 270 937 |
| Ingreso alto | 915 866 | 451 069 | 27 970 | 59 366 | 94 800 | 106 787 | 86 747 | 75 398 |
| Ingreso bajo y mediano | 5 129 306 | 2 594 306 | 286 286 | 556 619 | 702 249 | 536 361 | 317 253 | 195 539 |
| África (ingreso bajo y mediano)^c | 639 631 | 318 751 | 54 547 | 87 461 | 88 948 | 48 416 | 25 515 | 13 865 |
| Angola | 13 134 | 6 499 | 1 300 | 1 867 | 1 683 | 888 | 493 | 269 |
| Argelia | 30 291 | 15 346 | 1 798 | 3 601 | 4 724 | 2 959 | 1 425 | 839 |
| Benin | 6 272 | 3 092 | 557 | 900 | 839 | 441 | 227 | 127 |
| Botswana | 1 541 | 755 | 113 | 214 | 234 | 118 | 50 | 26 |
| Burkina Faso | 11 535 | 5 576 | 1 114 | 1 713 | 1 531 | 658 | 332 | 227 |
| Burundi | 6 356 | 3 088 | 559 | 955 | 837 | 423 | 211 | 104 |
| Cabo Verde | 427 | 199 | 31 | 54 | 62 | 38 | 5 | 9 |
| Camerún | 14 876 | 7 405 | 1 182 | 2 046 | 2 099 | 1 089 | 609 | 381 |
| Chad | 7 885 | 3 900 | 749 | 1 087 | 1 031 | 557 | 302 | 174 |
| Comoras | 706 | 354 | 59 | 95 | 104 | 55 | 27 | 13 |
| Congo | 3 018 | 1 478 | 282 | 413 | 391 | 212 | 113 | 68 |
| Côte d'Ivoire | 16 013 | 8 206 | 1 219 | 2 166 | 2 317 | 1 301 | 785 | 417 |
| Eritrea | 3 659 | 1 817 | 311 | 496 | 488 | 287 | 156 | 78 |
| Etiopía | 62 908 | 31 259 | 5 628 | 8 629 | 8 284 | 4 730 | 2 617 | 1 372 |
| Gabón | 1 230 | 609 | 98 | 150 | 147 | 95 | 69 | 49 |
| Gambia | 1 303 | 644 | 103 | 159 | 165 | 118 | 66 | 32 |
| Ghana | 19 306 | 9 613 | 1 421 | 2 555 | 2 836 | 1 526 | 823 | 452 |
| Guinea | 8 154 | 4 102 | 733 | 1 087 | 1 129 | 646 | 338 | 169 |
| Guinea Ecuatorial | 457 | 225 | 40 | 60 | 58 | 35 | 20 | 12 |
| Guinea-Bissau | 1 199 | 591 | 105 | 156 | 154 | 93 | 53 | 31 |
| Kenya | 30 669 | 15 273 | 2 367 | 4 333 | 4 697 | 2 251 | 1 023 | 602 |
| Lesotho | 2 035 | 1 009 | 148 | 256 | 281 | 167 | 99 | 59 |
| Liberia | 2 913 | 1 465 | 277 | 347 | 499 | 183 | 99 | 61 |
| Madagascar | 15 970 | 7 943 | 1 436 | 2 140 | 2 122 | 1 248 | 646 | 350 |
| Malawi | 11 308 | 5 617 | 1 038 | 1 609 | 1 534 | 783 | 420 | 233 |
| Malí | 11 351 | 5 624 | 1 081 | 1 552 | 1 531 | 778 | 394 | 287 |
| Mauricio | 1 161 | 579 | 48 | 103 | 154 | 145 | 84 | 45 |
| Mauritania | 2 665 | 1 321 | 236 | 354 | 361 | 203 | 110 | 56 |
| Mozambique | 18 292 | 9 042 | 1 589 | 2 426 | 2 475 | 1 377 | 753 | 421 |
| Namibia | 1 757 | 868 | 142 | 245 | 242 | 132 | 64 | 44 |
| Níger | 10 832 | 5 459 | 1 157 | 1 584 | 1 457 | 746 | 352 | 162 |
| Nigeria | 113 862 | 57 383 | 9 996 | 16 068 | 15 825 | 8 410 | 4 546 | 2 538 |
| República Centroafricana | 3 717 | 1 811 | 304 | 494 | 489 | 268 | 158 | 98 |
| República Democrática del Congo | 50 948 | 25 245 | 5 043 | 7 427 | 6 522 | 3 414 | 1 834 | 1 005 |
| República Unida de Tanzania | 35 119 | 17 422 | 3 015 | 4 937 | 4 960 | 2 552 | 1 319 | 639 |
| Rwanda | 7 609 | 3 765 | 642 | 1 040 | 1 137 | 540 | 267 | 140 |
| Santo Tomé y Príncipe | 138 | 64 | 10 | 17 | 20 | 12 | 2 | 3 |
| Senegal | 9 421 | 4 697 | 805 | 1 303 | 1 296 | 731 | 385 | 178 |
| Seychelles | 80 | 40 | 3 | 7 | 11 | 10 | 6 | 3 |
| Sierra Leona | 4 405 | 2 165 | 403 | 568 | 580 | 336 | 185 | 94 |
| Sudáfrica | 43 309 | 21 323 | 2 608 | 4 784 | 6 334 | 4 340 | 2 270 | 986 |
| Swazilandia | 925 | 456 | 70 | 123 | 130 | 72 | 39 | 22 |
| Togo | 4 527 | 2 248 | 386 | 620 | 628 | 335 | 178 | 100 |
| Uganda | 23 300 | 11 625 | 2 358 | 3 393 | 3 181 | 1 515 | 774 | 403 |
| Zambia | 10 421 | 5 236 | 954 | 1 497 | 1 501 | 701 | 369 | 214 |
| Zimbabwe | 12 627 | 6 315 | 1 030 | 1 831 | 1 864 | 898 | 418 | 273 |
| Américas (ingreso alto) | 314 291 | 155 035 | 11 201 | 23 350 | 32 303 | 37 526 | 28 679 | 21 977 |
| Bahamas | 304 | 150 | 15 | 30 | 42 | 35 | 17 | 11 |
| Canadá | 30 757 | 15 229 | 920 | 2 095 | 3 166 | 3 817 | 2 953 | 2 277 |
| Estados Unidos de América | 283 230 | 139 655 | 10 265 | 21 225 | 29 095 | 33 674 | 25 709 | 19 689 |

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todos | 2 999 797 | 297 863 | 582 630 | 761 707 | 621 685 | 402 225 | 333 687 |
| Ingreso alto | 464 797 | 26 478 | 56 255 | 90 803 | 103 963 | 87 204 | 100 094 |
| Ingreso bajo y mediano | 2 535 000 | 271 385 | 526 375 | 670 904 | 517 722 | 315 021 | 233 593 |
| África (ingreso bajo y mediano)^c | 320 880 | 53 609 | 86 331 | 88 370 | 48 701 | 27 079 | 16 790 |
| Angola | 6 635 | 1 292 | 1 867 | 1 700 | 919 | 534 | 324 |
| Argelia | 14 945 | 1 721 | 3 435 | 4 515 | 2 891 | 1 392 | 992 |
| Benin | 3 180 | 551 | 899 | 849 | 503 | 242 | 137 |
| Botswana | 787 | 111 | 211 | 232 | 121 | 68 | 44 |
| Burkina Faso | 5 959 | 1 096 | 1 694 | 1 642 | 779 | 417 | 331 |
| Burundi | 3 268 | 555 | 955 | 857 | 459 | 272 | 170 |
| Cabo Verde | 228 | 30 | 53 | 65 | 48 | 14 | 18 |
| Camerún | 7 471 | 1 163 | 2 021 | 2 088 | 1 097 | 652 | 451 |
| Chad | 3 985 | 743 | 1 085 | 1 043 | 574 | 328 | 212 |
| Comoras | 352 | 57 | 92 | 103 | 55 | 29 | 16 |
| Congo | 1 540 | 281 | 420 | 405 | 223 | 126 | 86 |
| Côte d'Ivoire | 7 807 | 1 202 | 2 157 | 2 279 | 1 141 | 648 | 380 |
| Eritrea | 1 842 | 306 | 494 | 490 | 293 | 165 | 94 |
| Etiopía | 31 649 | 5 568 | 8 589 | 8 287 | 4 815 | 2 787 | 1 602 |
| Gabón | 621 | 97 | 149 | 148 | 96 | 73 | 58 |
| Gambia | 658 | 103 | 159 | 169 | 123 | 69 | 36 |
| Ghana | 9 692 | 1 397 | 2 527 | 2 827 | 1 545 | 871 | 525 |
| Guinea | 4 052 | 715 | 1 057 | 1 101 | 637 | 348 | 194 |
| Guinea Ecuatorial | 231 | 40 | 60 | 58 | 36 | 22 | 15 |
| Guinea-Bissau | 608 | 105 | 156 | 156 | 96 | 57 | 37 |
| Kenya | 15 396 | 2 330 | 4 301 | 4 697 | 2 284 | 1 103 | 681 |
| Lesotho | 1 026 | 145 | 250 | 276 | 170 | 109 | 75 |
| Liberia | 1 448 | 274 | 346 | 491 | 168 | 97 | 72 |
| Madagascar | 8 028 | 1 430 | 2 137 | 2 122 | 1 258 | 675 | 406 |
| Malawi | 5 692 | 1 016 | 1 576 | 1 513 | 811 | 485 | 291 |
| Mali | 5 727 | 1 061 | 1 540 | 1 527 | 788 | 445 | 365 |
| Mauricio | 583 | 47 | 100 | 149 | 140 | 88 | 59 |
| Mauritania | 1 344 | 234 | 352 | 360 | 210 | 117 | 70 |
| Mozambique | 9 251 | 1 589 | 2 434 | 2 482 | 1 407 | 825 | 515 |
| Namibia | 889 | 140 | 242 | 238 | 136 | 77 | 56 |
| Níger | 5 373 | 1 128 | 1 532 | 1 410 | 737 | 372 | 193 |
| Nigeria | 56 479 | 9 688 | 15 549 | 15 357 | 8 304 | 4 700 | 2 881 |
| República Centroafricana | 1 907 | 304 | 497 | 511 | 286 | 181 | 128 |
| República Democrática del Congo | 25 703 | 4 984 | 7 392 | 6 532 | 3 479 | 2 012 | 1 304 |
| República Unida de Tanzania | 17 697 | 2 960 | 4 889 | 5 020 | 2 637 | 1 425 | 767 |
| Rwanda | 3 844 | 642 | 1 047 | 1 150 | 537 | 289 | 179 |
| Santo Tomé y Príncipe | 73 | 10 | 17 | 21 | 15 | 4 | 6 |
| Senegal | 4 723 | 787 | 1 281 | 1 292 | 741 | 405 | 218 |
| Seychelles | 40 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Sierra Leona | 2 239 | 403 | 575 | 591 | 350 | 203 | 116 |
| Sudáfrica | 21 986 | 2 569 | 4 773 | 6 369 | 4 356 | 2 443 | 1 476 |
| Swazilandia | 469 | 69 | 123 | 132 | 75 | 42 | 27 |
| Togo | 2 279 | 381 | 617 | 629 | 340 | 192 | 120 |
| Uganda | 11 676 | 2 333 | 3 382 | 3 171 | 1 480 | 827 | 482 |
| Zambia | 5 185 | 933 | 1 465 | 1 466 | 669 | 393 | 259 |
| Zimbabwe | 6 313 | 1 021 | 1 826 | 1 841 | 858 | 446 | 320 |
| Américas (ingreso alto) | 159 256 | 10 666 | 22 263 | 31 189 | 36 916 | 29 301 | 28 922 |
| Bahamas | 154 | 15 | 29 | 41 | 36 | 20 | 14 |
| Canadá | 15 527 | 874 | 1 993 | 3 040 | 3 773 | 2 987 | 2 860 |
| Estados Unidos de América | 143 575 | 9 777 | 20 240 | 28 108 | 33 108 | 26 294 | 26 048 |

CUADRO A.1 (continuación)

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Total ^b | Varones | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Américas (ingreso bajo y mediano) | 513 081 | 254 252 | 27 942 | 54 610 | 72 444 | 51 530 | 29 507 | 18 219 |
| Antigua y Barbuda | 65 | 32 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Argentina | 37 032 | 18 163 | 1 779 | 3 436 | 4 785 | 3 454 | 2 612 | 2 098 |
| Barbados | 267 | 130 | 9 | 19 | 33 | 35 | 19 | 14 |
| Belice | 226 | 115 | 15 | 29 | 34 | 20 | 10 | 7 |
| Bolivia | 8 329 | 4 144 | 617 | 1 063 | 1 155 | 683 | 393 | 233 |
| Brasil | 170 406 | 84 169 | 8 145 | 16 804 | 24 344 | 18 495 | 10 440 | 5 941 |
| Chile | 15 211 | 7 531 | 734 | 1 469 | 1 865 | 1 737 | 1 057 | 669 |
| Colombia | 42 105 | 20 786 | 2 429 | 4 608 | 5 758 | 4 375 | 2 318 | 1 297 |
| Costa Rica | 4 024 | 2 040 | 226 | 441 | 557 | 438 | 236 | 142 |
| Cuba | 11 199 | 5 611 | 368 | 850 | 1 310 | 1 432 | 918 | 733 |
| Dominica | 71 | 35 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Ecuador | 12 646 | 6 350 | 747 | 1 429 | 1 857 | 1 239 | 668 | 410 |
| El Salvador | 6 278 | 3 082 | 407 | 731 | 954 | 495 | 293 | 201 |
| Granada | 94 | 46 | 5 | 9 | 13 | 10 | 6 | 4 |
| Guatemala | 11 385 | 5 741 | 942 | 1 593 | 1 637 | 828 | 448 | 292 |
| Guyana | 761 | 369 | 41 | 76 | 118 | 74 | 36 | 23 |
| Haití | 8 142 | 3 989 | 578 | 1 099 | 1 179 | 601 | 326 | 206 |
| Honduras | 6 417 | 3 230 | 491 | 874 | 935 | 524 | 252 | 153 |
| Jamaica | 2 576 | 1 270 | 134 | 278 | 370 | 242 | 132 | 113 |
| México | 98 872 | 48 926 | 5 705 | 11 012 | 14 605 | 9 374 | 5 094 | 3 136 |
| Nicaragua | 5 071 | 2 523 | 408 | 691 | 741 | 389 | 189 | 105 |
| Panamá | 2 856 | 1 441 | 154 | 303 | 393 | 302 | 176 | 113 |
| Paraguay | 5 496 | 2 772 | 394 | 711 | 761 | 509 | 267 | 129 |
| Perú | 25 662 | 12 726 | 1 475 | 2 877 | 3 743 | 2 399 | 1 368 | 865 |
| República Dominicana | 8 373 | 4 254 | 479 | 950 | 1 215 | 876 | 466 | 268 |
| Saint Kitts y Nevis | 38 | 19 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| San Vicente y las Granadinas | 113 | 56 | 6 | 11 | 15 | 12 | 7 | 5 |
| Santa Lucía | 148 | 72 | 9 | 16 | 22 | 14 | 7 | 5 |
| Suriname | 417 | 207 | 20 | 44 | 65 | 45 | 17 | 15 |
| Trinidad y Tabago | 1 294 | 644 | 45 | 119 | 188 | 143 | 91 | 57 |
| Uruguay | 3 337 | 1 619 | 145 | 278 | 396 | 318 | 244 | 239 |
| Venezuela | 24 170 | 12 161 | 1 429 | 2 771 | 3 371 | 2 449 | 1 404 | 737 |
| Asia Sudoriental (ingreso bajo y mediano)^c | 1 535 634 | 786 265 | 90 144 | 172 450 | 218 856 | 160 218 | 90 548 | 54 049 |
| Bangladesh | 137 439 | 70 858 | 9 562 | 17 773 | 20 431 | 13 252 | 6 434 | 3 405 |
| Bhután | 2 085 | 1 054 | 167 | 287 | 281 | 157 | 98 | 64 |
| India | 1 008 937 | 520 312 | 60 014 | 114 668 | 142 803 | 105 142 | 60 892 | 36 792 |
| Indonesia | 212 092 | 106 379 | 11 094 | 22 082 | 31 038 | 22 647 | 12 123 | 7 394 |
| Maldivas | 291 | 149 | 24 | 41 | 41 | 23 | 12 | 8 |
| Myanmar | 47 749 | 23 729 | 2 740 | 5 246 | 6 885 | 4 655 | 2 696 | 1 507 |
| Nepal | 23 043 | 11 811 | 1 833 | 3 052 | 3 184 | 1 923 | 1 150 | 669 |
| República Democrática Popular de Corea | 22 268 | 11 179 | 987 | 2 030 | 2 789 | 2 728 | 1 644 | 1 001 |
| Sri Lanka | 18 924 | 9 718 | 794 | 1 734 | 2 629 | 2 214 | 1 449 | 898 |
| Tailandia | 62 806 | 31 078 | 2 928 | 5 536 | 8 776 | 7 476 | 4 049 | 2 312 |
| Europa (ingreso alto) | 394 607 | 193 120 | 10 797 | 23 462 | 39 208 | 46 232 | 37 098 | 36 323 |
| Alemania | 82 017 | 40 148 | 1 965 | 4 583 | 7 254 | 10 564 | 7 897 | 7 885 |
| Andorra | 86 | 45 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 7 |
| Austria | 8 080 | 3 942 | 209 | 481 | 768 | 1 046 | 759 | 680 |
| Bélgica | 10 249 | 5 020 | 282 | 624 | 978 | 1 198 | 971 | 966 |
| Dinamarca | 5 320 | 2 633 | 169 | 330 | 499 | 607 | 564 | 464 |
| España | 39 910 | 19 511 | 939 | 2 088 | 4 657 | 4 634 | 3 454 | 3 738 |
| Finlandia | 5 172 | 2 523 | 148 | 329 | 492 | 569 | 566 | 420 |
| Francia | 59 238 | 28 856 | 1 862 | 3 817 | 6 081 | 6 431 | 5 526 | 5 138 |

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Américas (ingreso bajo y mediano) | 258 829 | 26 872 | 52 717 | 71 810 | 53 591 | 31 566 | 22 273 |
| Antigua y Barbuda | 33 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| Argentina | 18 868 | 1 720 | 3 330 | 4 691 | 3 509 | 2 780 | 2 839 |
| Barbados | 138 | 8 | 19 | 33 | 35 | 21 | 22 |
| Belice | 112 | 14 | 28 | 34 | 20 | 9 | 7 |
| Bolivia | 4 185 | 593 | 1 026 | 1 149 | 711 | 426 | 280 |
| Brasil | 86 238 | 7 860 | 16 268 | 24 223 | 19 206 | 11 301 | 7 380 |
| Chile | 7 680 | 707 | 1 418 | 1 821 | 1 742 | 1 110 | 882 |
| Colombia | 21 319 | 2 331 | 4 438 | 5 727 | 4 669 | 2 555 | 1 599 |
| Costa Rica | 1 983 | 216 | 420 | 528 | 426 | 235 | 158 |
| Cuba | 5 588 | 350 | 809 | 1 258 | 1 423 | 953 | 796 |
| Dominica | 36 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| Ecuador | 6 296 | 719 | 1 383 | 1 812 | 1 231 | 684 | 466 |
| El Salvador | 3 196 | 390 | 707 | 949 | 573 | 327 | 250 |
| Granada | 47 | 4 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 |
| Guatemala | 5 645 | 903 | 1 527 | 1 593 | 852 | 460 | 310 |
| Guyana | 392 | 40 | 75 | 119 | 86 | 43 | 30 |
| Haití | 4 153 | 557 | 1 072 | 1 187 | 683 | 402 | 253 |
| Honduras | 3 187 | 472 | 844 | 910 | 526 | 261 | 173 |
| Jamaica | 1 307 | 129 | 270 | 367 | 268 | 139 | 134 |
| México | 49 946 | 5 463 | 10 590 | 14 694 | 10 008 | 5 483 | 3 707 |
| Nicaragua | 2 548 | 393 | 669 | 742 | 414 | 203 | 127 |
| Panamá | 1 415 | 147 | 290 | 384 | 302 | 174 | 118 |
| Paraguay | 2 725 | 379 | 688 | 740 | 495 | 259 | 164 |
| Perú | 12 935 | 1 421 | 2 794 | 3 727 | 2 560 | 1 442 | 992 |
| República Dominicana | 4 119 | 461 | 915 | 1 150 | 841 | 468 | 284 |
| Saint Kitts y Nevis | 19 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| San Vicente y las Granadinas | 57 | 5 | 11 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| Santa Lucía | 75 | 8 | 15 | 22 | 15 | 8 | 7 |
| Suriname | 210 | 20 | 43 | 63 | 46 | 20 | 19 |
| Trinidad y Tabago | 651 | 43 | 116 | 185 | 147 | 93 | 67 |
| Uruguay | 1 718 | 139 | 266 | 383 | 331 | 265 | 334 |
| Venezuela | 12 009 | 1 368 | 2 659 | 3 271 | 2 433 | 1 421 | 857 |
| Asia Sudoriental (ingreso bajo y mediano)^c | 749 369 | 85 306 | 162 342 | 204 600 | 149 046 | 88 487 | 59 589 |
| Bangladesh | 66 582 | 9 090 | 16 765 | 19 111 | 12 132 | 6 093 | 3 391 |
| Bhután | 1 032 | 160 | 276 | 271 | 153 | 99 | 71 |
| India | 488 626 | 56 384 | 106 854 | 131 070 | 95 662 | 58 596 | 40 060 |
| Indonesia | 105 713 | 10 688 | 21 367 | 30 239 | 22 054 | 12 615 | 8 750 |
| Maldivas | 142 | 23 | 39 | 39 | 22 | 11 | 7 |
| Myanmar | 24 020 | 2 667 | 5 154 | 6 866 | 4 752 | 2 848 | 1 734 |
| Nepal | 11 232 | 1 730 | 2 839 | 2 968 | 1 878 | 1 125 | 692 |
| República Democrática Popular de Corea | 11 090 | 945 | 1 940 | 2 675 | 2 629 | 1 665 | 1 236 |
| Sri Lanka | 9 206 | 767 | 1 681 | 2 546 | 2 113 | 1 238 | 861 |
| Tailandia | 31 728 | 2 851 | 5 426 | 8 815 | 7 650 | 4 197 | 2 788 |
| Europa (ingreso alto) | 201 490 | 10 224 | 22 287 | 37 512 | 45 016 | 37 338 | 49 109 |
| Alemania | 41 869 | 1 861 | 4 330 | 6 838 | 9 876 | 7 778 | 11 184 |
| Andorra | 41 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 7 |
| Austria | 4 138 | 198 | 456 | 739 | 992 | 758 | 996 |
| Bélgica | 5 229 | 269 | 596 | 944 | 1 159 | 959 | 1 302 |
| Dinamarca | 2 687 | 159 | 314 | 481 | 581 | 553 | 600 |
| España | 20 400 | 877 | 1 970 | 4 462 | 4 584 | 3 555 | 4 952 |
| Finlandia | 2 649 | 141 | 315 | 472 | 549 | 560 | 612 |
| Francia | 30 382 | 1 771 | 3 648 | 5 875 | 6 483 | 5 584 | 7 021 |

CUADRO A.1 (continuación)

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Total ^b | Varones | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Europa (ingreso alto) (continuación) | | | | | | | | |
| Grecia | 10 610 | 5 230 | 259 | 565 | 1 161 | 1 158 | 965 | 1 122 |
| Irlanda | 3 803 | 1 890 | 136 | 286 | 502 | 384 | 324 | 258 |
| Islandia | 279 | 140 | 11 | 23 | 32 | 31 | 24 | 19 |
| Israel | 6 040 | 2 980 | 316 | 560 | 773 | 561 | 429 | 341 |
| Italia | 57 530 | 27 902 | 1 350 | 2 870 | 5 665 | 6 676 | 5 434 | 5 908 |
| Luxemburgo | 437 | 215 | 14 | 28 | 42 | 53 | 42 | 36 |
| Mónaco | 33 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Noruega | 4 469 | 2 213 | 149 | 305 | 437 | 509 | 437 | 376 |
| Países Bajos | 15 864 | 7 862 | 480 | 1 005 | 1 520 | 1 992 | 1 616 | 1 249 |
| Portugal | 10 016 | 4 819 | 288 | 569 | 1 159 | 1 065 | 860 | 879 |
| Reino Unido | 59 415 | 29 242 | 1 804 | 3 972 | 5 733 | 6 896 | 5 529 | 5 307 |
| San Marino | 27 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suecia | 8 842 | 4 375 | 226 | 599 | 817 | 941 | 921 | 870 |
| Suiza | 7 170 | 3 546 | 187 | 424 | 619 | 896 | 764 | 655 |
| Europa (ingreso bajo y mediano) | 478 968 | 230 651 | 15 396 | 38 477 | 59 421 | 51 974 | 36 583 | 28 800 |
| Albania | 3 134 | 1 603 | 159 | 326 | 418 | 365 | 203 | 131 |
| Armenia | 3 787 | 1 834 | 106 | 356 | 496 | 433 | 231 | 212 |
| Azerbaiyán | 8 041 | 3 959 | 314 | 886 | 1 083 | 935 | 392 | 350 |
| Belarús | 10 187 | 4 746 | 241 | 732 | 1 153 | 1 150 | 793 | 677 |
| Bosnia y Herzegovina | 3 977 | 1 968 | 106 | 283 | 462 | 521 | 342 | 254 |
| Bulgaria | 7 949 | 3 864 | 162 | 479 | 890 | 813 | 773 | 747 |
| Croacia | 4 654 | 2 253 | 138 | 292 | 486 | 527 | 434 | 377 |
| Eslovaquia | 5 399 | 2 625 | 148 | 391 | 686 | 590 | 479 | 331 |
| Eslovenia | 1 988 | 966 | 46 | 116 | 222 | 230 | 201 | 151 |
| Estonia | 1 393 | 649 | 31 | 95 | 155 | 150 | 118 | 99 |
| Federación de Rusia | 145 491 | 68 130 | 3 254 | 10 103 | 16 713 | 16 737 | 11 983 | 9 339 |
| Georgia | 5 262 | 2 512 | 153 | 399 | 611 | 575 | 379 | 395 |
| Hungría | 9 968 | 4 756 | 251 | 613 | 1 149 | 1 001 | 983 | 758 |
| Kazajistán | 16 172 | 7 844 | 648 | 1 570 | 2 131 | 1 807 | 1 011 | 676 |
| Kirguistán | 4 921 | 2 413 | 265 | 579 | 676 | 486 | 230 | 177 |
| Letonia | 2 421 | 1 116 | 48 | 168 | 261 | 265 | 203 | 171 |
| Lituania | 3 696 | 1 743 | 95 | 272 | 412 | 423 | 289 | 252 |
| Macedonia, Antigua República Yugoslava | 2 034 | 1 017 | 75 | 162 | 249 | 226 | 172 | 133 |
| Malta | 390 | 193 | 12 | 28 | 44 | 40 | 40 | 28 |
| Polonia | 38 605 | 18 761 | 1 024 | 2 767 | 4 772 | 4 143 | 3 498 | 2 557 |
| República Checa | 10 272 | 4 995 | 231 | 633 | 1 229 | 1 045 | 1 096 | 761 |
| República de Moldova | 4 295 | 2 054 | 133 | 375 | 539 | 453 | 325 | 229 |
| Rumania | 22 438 | 10 977 | 584 | 1 511 | 2 760 | 2 376 | 1 930 | 1 816 |
| Tayikistán | 6 087 | 3 032 | 393 | 822 | 852 | 551 | 232 | 182 |
| Turkmenistán | 4 737 | 2 345 | 305 | 598 | 653 | 463 | 197 | 128 |
| Turquía | 66 668 | 33 676 | 3 614 | 6 581 | 10 002 | 6 843 | 4 024 | 2 612 |
| Ucrania | 49 568 | 23 019 | 1 122 | 3 397 | 5 549 | 5 281 | 4 011 | 3 659 |
| Uzbekistán | 24 881 | 12 357 | 1 407 | 3 182 | 3 538 | 2 436 | 1 045 | 749 |
| Yugoslavia | 10 552 | 5 248 | 332 | 762 | 1 226 | 1 109 | 970 | 848 |
| Mediterráneo Oriental (ingreso alto) | 5 870 | 3 594 | 230 | 597 | 783 | 1 000 | 763 | 221 |
| Chipre | 784 | 391 | 28 | 66 | 89 | 85 | 69 | 55 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 606 | 1 722 | 102 | 250 | 345 | 513 | 414 | 97 |
| Kuwait | 1 914 | 1 115 | 73 | 231 | 287 | 261 | 205 | 57 |
| Qatar | 565 | 366 | 27 | 50 | 62 | 141 | 74 | 13 |
| Mediterráneo Oriental (ingreso bajo y mediano) | 475 785 | 242 847 | 34 697 | 62 275 | 67 412 | 41 988 | 23 809 | 12 666 |
| Afganistán | 21 765 | 11 227 | 1 954 | 2 923 | 3 018 | 1 814 | 1 008 | 510 |

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Todas las edades | 0–4 años | 5–14 años | 15–29 años | 30–44 años | 45–59 años | ≥ 60 años |
| Europa (ingreso alto) (continuación) | | | | | | | |
| Grecia | 5 380 | 242 | 532 | 1 104 | 1 158 | 982 | 1 361 |
| Irlanda | 1 913 | 128 | 270 | 481 | 393 | 321 | 321 |
| Islandia | 139 | 10 | 21 | 31 | 31 | 23 | 23 |
| Israel | 3 060 | 298 | 533 | 737 | 581 | 458 | 453 |
| Italia | 29 628 | 1 271 | 2 726 | 5 460 | 6 631 | 5 603 | 7 937 |
| Luxemburgo | 222 | 13 | 26 | 41 | 52 | 40 | 49 |
| Mónaco | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Noruega | 2 256 | 141 | 289 | 420 | 487 | 422 | 498 |
| Países Bajos | 8 002 | 457 | 960 | 1 464 | 1 904 | 1 567 | 1 649 |
| Portugal | 5 197 | 272 | 542 | 1 132 | 1 098 | 943 | 1 210 |
| Reino Unido | 30 173 | 1 719 | 3 778 | 5 447 | 6 704 | 5 578 | 6 947 |
| San Marino | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Suecia | 4 467 | 214 | 569 | 781 | 898 | 896 | 1 109 |
| Suiza | 3 624 | 178 | 405 | 589 | 837 | 743 | 871 |
| Europa (ingreso bajo y mediano) | 248 317 | 14 736 | 36 869 | 57 486 | 52 418 | 40 312 | 46 495 |
| Albania | 1 531 | 150 | 305 | 391 | 346 | 189 | 150 |
| Armenia | 1 953 | 101 | 336 | 479 | 477 | 274 | 286 |
| Azerbaiyán | 4 082 | 296 | 836 | 1 024 | 996 | 437 | 493 |
| Belarús | 5 441 | 227 | 704 | 1 147 | 1 205 | 911 | 1 248 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 009 | 99 | 266 | 437 | 511 | 357 | 339 |
| Bulgaria | 4 086 | 155 | 457 | 852 | 815 | 831 | 976 |
| Croacia | 2 401 | 131 | 279 | 469 | 518 | 442 | 562 |
| Eslovaquia | 2 773 | 141 | 374 | 662 | 580 | 515 | 501 |
| Eslovenia | 1 022 | 44 | 110 | 212 | 228 | 198 | 230 |
| Estonia | 745 | 30 | 91 | 151 | 151 | 140 | 182 |
| Federación de Rusia | 77 361 | 3 108 | 9 657 | 16 269 | 16 974 | 13 768 | 17 584 |
| Georgia | 2 750 | 146 | 379 | 587 | 611 | 437 | 591 |
| Hungría | 5 212 | 239 | 586 | 1 099 | 995 | 1 084 | 1 209 |
| Kazajistán | 8 329 | 625 | 1 520 | 2 094 | 1 818 | 1 141 | 1 131 |
| Kirguistán | 2 508 | 259 | 567 | 670 | 497 | 249 | 266 |
| Letonia | 1 305 | 46 | 160 | 254 | 269 | 242 | 334 |
| Lituania | 1 953 | 91 | 261 | 400 | 427 | 341 | 434 |
| Macedonia, Antigua República Yugoslava | 1 017 | 70 | 153 | 238 | 220 | 176 | 160 |
| Malta | 197 | 12 | 26 | 41 | 39 | 40 | 38 |
| Polonia | 19 844 | 970 | 2 634 | 4 594 | 4 080 | 3 724 | 3 843 |
| República Checa | 5 276 | 220 | 602 | 1 178 | 1 015 | 1 136 | 1 125 |
| República de Moldova | 2 242 | 126 | 360 | 533 | 485 | 379 | 358 |
| Rumania | 11 461 | 553 | 1 447 | 2 659 | 2 351 | 2 044 | 2 406 |
| Tayikistán | 3 055 | 381 | 801 | 836 | 573 | 232 | 233 |
| Turkmenistán | 2 393 | 296 | 583 | 646 | 477 | 212 | 179 |
| Turquía | 32 992 | 3 494 | 6 332 | 9 528 | 6 659 | 3 960 | 3 019 |
| Ucrania | 26 549 | 1 068 | 3 254 | 5 399 | 5 527 | 4 775 | 6 526 |
| Uzbekistán | 12 524 | 1 354 | 3 079 | 3 487 | 2 506 | 1 089 | 1 009 |
| Yugoslavia | 5 305 | 308 | 710 | 1 148 | 1 068 | 988 | 1 083 |
| Mediterráneo Oriental (ingreso alto) | 2 276 | 219 | 563 | 627 | 440 | 289 | 137 |
| Chipre | 393 | 26 | 62 | 85 | 83 | 70 | 68 |
| Emiratos Árabes Unidos | 884 | 96 | 229 | 234 | 180 | 108 | 37 |
| Kuwait | 800 | 71 | 224 | 262 | 126 | 88 | 28 |
| Qatar | 199 | 26 | 48 | 46 | 51 | 23 | 5 |
| Mediterráneo Oriental (ingreso bajo y mediano) | 232 939 | 33 023 | 59 158 | 64 526 | 39 940 | 22 641 | 13 650 |
| Afganistán | 10 538 | 1 852 | 2 736 | 2 796 | 1 679 | 955 | 519 |

CUADRO A.1 (continuación)

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Total ^b | Varones | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Mediterráneo Oriental (ingreso bajo y mediano) (continuación) | | | | | | | | |
| Arabia Saudita | 20 346 | 10 872 | 1 630 | 2 835 | 2 682 | 1 731 | 1 471 | 523 |
| Bahrein | 640 | 368 | 29 | 63 | 75 | 120 | 64 | 16 |
| Djibouti | 632 | 297 | 52 | 86 | 80 | 38 | 28 | 14 |
| Egipto | 67 884 | 34 364 | 4 096 | 8 182 | 9 788 | 6 652 | 3 721 | 1 925 |
| Irán (República Islámica de) | 70 330 | 35 998 | 3 882 | 9 640 | 10 578 | 6 420 | 3 702 | 1 776 |
| Iraq | 22 946 | 11 666 | 1 817 | 3 063 | 3 329 | 1 939 | 1 018 | 501 |
| Jamahiriya Árabe Libia | 5 290 | 2 741 | 329 | 589 | 877 | 473 | 316 | 157 |
| Jordania | 4 913 | 2 554 | 390 | 618 | 780 | 459 | 194 | 113 |
| Líbano | 3 496 | 1 711 | 171 | 384 | 498 | 357 | 163 | 137 |
| Marruecos | 29 878 | 14 964 | 1 832 | 3 441 | 4 457 | 2 948 | 1 429 | 856 |
| Omán | 2 538 | 1 347 | 206 | 363 | 334 | 223 | 166 | 55 |
| Pakistán | 141 256 | 72 622 | 11 427 | 18 985 | 19 041 | 11 856 | 7 234 | 4 080 |
| República Árabe Siria | 16 189 | 8 200 | 1 146 | 2 228 | 2 488 | 1 400 | 575 | 363 |
| Somalia | 8 778 | 4 358 | 897 | 1 216 | 1 154 | 619 | 314 | 158 |
| Sudán | 31 095 | 15 639 | 2 412 | 3 943 | 4 390 | 2 645 | 1 456 | 792 |
| Túnez | 9 459 | 4 776 | 430 | 1 013 | 1 441 | 986 | 511 | 396 |
| Yemen | 18 349 | 9 142 | 1 996 | 2 703 | 2 402 | 1 308 | 439 | 294 |
| Pacífico Occidental (ingreso alto) | 201 099 | 99 320 | 5 743 | 11 957 | 22 505 | 22 029 | 20 208 | 16 878 |
| Australia | 19 138 | 9 529 | 648 | 1 368 | 2 127 | 2 176 | 1 788 | 1 421 |
| Brunei Darussalam | 328 | 173 | 18 | 36 | 41 | 44 | 25 | 9 |
| Japón | 127 096 | 62 212 | 3 159 | 6 424 | 13 293 | 12 493 | 14 004 | 12 839 |
| Nueva Zelanda | 3 778 | 1 861 | 142 | 302 | 393 | 424 | 335 | 265 |
| República de Corea | 46 740 | 23 522 | 1 631 | 3 517 | 6 239 | 6 309 | 3 679 | 2 147 |
| Singapur | 4 018 | 2 023 | 145 | 310 | 412 | 583 | 376 | 197 |
| Pacífico Occidental (ingreso bajo y mediano) | 1 486 206 | 761 540 | 63 560 | 141 345 | 195 168 | 182 236 | 111 291 | 67 940 |
| Camboya | 13 104 | 6 389 | 1 070 | 1 846 | 1 700 | 1 050 | 518 | 205 |
| China | 1 282 437 | 659 410 | 51 092 | 116 265 | 165 941 | 162 699 | 101 353 | 62 059 |
| Fiji | 814 | 414 | 50 | 90 | 118 | 85 | 49 | 22 |
| Filipinas | 75 653 | 38 092 | 5 031 | 9 474 | 10 973 | 6 925 | 3 785 | 1 903 |
| Islas Cook | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Islas Marshall | 51 | 26 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Islas Salomón | 447 | 230 | 41 | 63 | 66 | 33 | 18 | 10 |
| Kiribati | 83 | 43 | 6 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| Malasia | 22 218 | 11 255 | 1 350 | 2 541 | 3 029 | 2 286 | 1 357 | 692 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 123 | 64 | 9 | 15 | 16 | 12 | 7 | 4 |
| Mongolia | 2 533 | 1 268 | 139 | 315 | 387 | 259 | 105 | 63 |
| Nauru | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| Niue | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Palau | 19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Papua Nueva Guinea | 4 809 | 2 507 | 366 | 635 | 746 | 436 | 223 | 101 |
| República Democrática Popular Lao | 5 279 | 2 636 | 426 | 722 | 719 | 420 | 210 | 139 |
| Samoa | 159 | 83 | 11 | 23 | 27 | 12 | 6 | 5 |
| Tonga | 99 | 52 | 6 | 12 | 15 | 10 | 6 | 3 |
| Tuvalu | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| Vanuatu | 197 | 101 | 16 | 27 | 27 | 17 | 9 | 5 |
| Viet Nam | 78 137 | 38 938 | 3 939 | 9 293 | 11 379 | 7 973 | 3 633 | 2 722 |

Fuente: Naciones Unidas, 2001.

^a Los números se han redondeado al millar más cercano. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo.^b Total combinado de varones y mujeres.^c No hay países de ingresos altos en la región.

| Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Todas las edades | 0–4 años | 5–14 años | 15–29 años | 30–44 años | 45–59 años | ≥ 60 años |
| Mediterráneo Oriental | | | | | | | |
| (ingreso bajo y mediano) (continuación) | | | | | | | |
| Arabia Saudita | 9 474 | 1 556 | 2 713 | 2 590 | 1 330 | 831 | 453 |
| Bahrein | 272 | 28 | 60 | 68 | 72 | 30 | 14 |
| Djibouti | 335 | 51 | 85 | 83 | 53 | 43 | 21 |
| Egipto | 33 521 | 3 915 | 7 811 | 9 197 | 6 367 | 3 871 | 2 359 |
| Irán (República Islámica de) | 34 332 | 3 672 | 9 107 | 10 154 | 6 007 | 3 496 | 1 895 |
| Iraq | 11 280 | 1 739 | 2 935 | 3 178 | 1 875 | 1 001 | 553 |
| Jamahiriya Árabe Libia | 2 549 | 314 | 563 | 848 | 444 | 248 | 133 |
| Jordania | 2 359 | 372 | 588 | 713 | 392 | 184 | 110 |
| Líbano | 1 786 | 164 | 370 | 489 | 404 | 197 | 162 |
| Marruecos | 14 914 | 1 764 | 3 318 | 4 307 | 2 966 | 1 511 | 1 049 |
| Omán | 1 191 | 198 | 352 | 325 | 170 | 94 | 52 |
| Pakistán | 68 634 | 10 783 | 17 826 | 18 240 | 11 178 | 6 542 | 4 065 |
| República Árabe Siria | 7 988 | 1 093 | 2 144 | 2 417 | 1 340 | 593 | 401 |
| Somalia | 4 420 | 890 | 1 206 | 1 164 | 639 | 336 | 184 |
| Sudán | 15 457 | 2 316 | 3 803 | 4 284 | 2 641 | 1 507 | 905 |
| Túnez | 4 682 | 403 | 964 | 1 387 | 1 005 | 522 | 402 |
| Yemen | 9 207 | 1 914 | 2 575 | 2 285 | 1 378 | 680 | 375 |
| Pacífico Occidental | 101 778 | 5 368 | 11 142 | 21 475 | 21 591 | 20 276 | 21 926 |
| (ingreso alto) | | | | | | | |
| Australia | 9 608 | 615 | 1 296 | 2 052 | 2 179 | 1 762 | 1 705 |
| Brunei Darussalam | 156 | 17 | 34 | 38 | 39 | 19 | 8 |
| Japón | 64 884 | 2 993 | 6 118 | 12 730 | 12 229 | 14 135 | 16 679 |
| Nueva Zelandia | 1 917 | 135 | 288 | 383 | 452 | 337 | 323 |
| República de Corea | 23 218 | 1 474 | 3 118 | 5 883 | 6 107 | 3 653 | 2 984 |
| Singapur | 1 995 | 135 | 289 | 388 | 585 | 370 | 227 |
| Pacífico Occidental | 724 667 | 57 838 | 128 958 | 184 113 | 174 027 | 104 936 | 74 795 |
| (ingreso bajo y mediano) | | | | | | | |
| Camboya | 6 715 | 1 037 | 1 797 | 1 681 | 1 170 | 665 | 366 |
| China | 623 027 | 45 892 | 104 807 | 155 577 | 154 205 | 94 679 | 67 867 |
| Fiji | 400 | 47 | 85 | 112 | 82 | 50 | 25 |
| Filipinas | 37 561 | 4 800 | 9 090 | 10 641 | 6 901 | 3 837 | 2 293 |
| Islas Cook | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Islas Marshall | 25 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Islas Salomón | 217 | 38 | 59 | 61 | 34 | 17 | 9 |
| Kiribati | 40 | 6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Malasia | 10 964 | 1 280 | 2 405 | 2 925 | 2 269 | 1 314 | 771 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 59 | 8 | 15 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| Mongolia | 1 265 | 133 | 305 | 380 | 262 | 108 | 78 |
| Nauru | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
| Niue | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Palau | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Papua Nueva Guinea | 2 303 | 344 | 583 | 637 | 422 | 217 | 98 |
| República Democrática Popular Lao | 2 643 | 410 | 698 | 705 | 441 | 231 | 157 |
| Samoa | 75 | 11 | 21 | 22 | 9 | 6 | 6 |
| Tonga | 47 | 6 | 11 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| Tuvalu | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
| Vanuatu | 96 | 14 | 25 | 26 | 17 | 8 | 5 |
| Viet Nam | 39 199 | 3 804 | 9 034 | 11 295 | 8 179 | 3 782 | 3 106 |

CUADRO A.2

Mortalidad estimada causada por lesiones intencionales,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingreso, 2000

| Región de la OMS | | Nivel de ingreso | Total ^c | Varones | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 1 659 | 1 153 | 41 | 54 | 351 | 320 | 205 | 182 |
| | alto | 149 | 111 | 1 | 1 | 24 | 31 | 27 | 27 |
| África ^d | bajo y mediano | 1 510 | 1 042 | 40 | 54 | 326 | 288 | 178 | 156 |
| | bajo y mediano | 311 | 225 | 17 | 23 | 72 | 57 | 31 | 25 |
| Américas | todos | 228 | 196 | 2 | 3 | 87 | 60 | 28 | 17 |
| | alto | 56 | 44 | <1 | 1 | 13 | 14 | 9 | 7 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 171 | 152 | 1 | 2 | 74 | 46 | 19 | 10 |
| | bajo y mediano | 317 | 216 | 5 | 15 | 69 | 59 | 38 | 29 |
| Europa | todos | 303 | 239 | 2 | 5 | 53 | 78 | 58 | 44 |
| | alto | 55 | 41 | <1 | <1 | 7 | 11 | 10 | 12 |
| Mediterráneo Oriental | bajo y mediano | 248 | 198 | 2 | 5 | 46 | 67 | 48 | 31 |
| | todos | 95 | 62 | 14 | 5 | 20 | 11 | 7 | 5 |
| Pacífico Occidental | alto | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 95 | 61 | 14 | 5 | 20 | 11 | 7 | 5 |
| Pacífico Occidental | todos | 405 | 216 | 1 | 4 | 50 | 55 | 44 | 62 |
| | alto | 37 | 26 | <1 | <1 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| | bajo y mediano | 368 | 190 | 1 | 4 | 45 | 48 | 36 | 55 |

Tasa por 100 000 habitantes

| Región de la OMS | | Nivel de ingreso | Total ^{c, e} | Varones | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 28,8 | 40,5 | 13,0 | 8,8 | 44,0 | 49,7 | 50,7 | 67,4 |
| | alto | 14,4 | 22,1 | 2,2 | 1,5 | 25,7 | 29,4 | 31,3 | 35,8 |
| África ^d | bajo y mediano | 32,1 | 44,8 | 14,1 | 9,6 | 46,5 | 53,8 | 56,0 | 79,6 |
| | bajo y mediano | 60,9 | 94,6 | 31,2 | 25,9 | 80,9 | 118,0 | 119,7 | 182,5 |
| Américas | todos | 27,7 | 48,6 | 3,8 | 3,4 | 83,2 | 67,2 | 48,0 | 43,1 |
| | alto | 17,2 | 27,6 | 4,0 | 2,4 | 41,8 | 36,3 | 30,7 | 33,7 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 34,3 | 62,1 | 3,8 | 3,8 | 101,7 | 89,7 | 64,9 | 54,5 |
| | bajo y mediano | 22,8 | 31,3 | 6,0 | 8,9 | 31,7 | 36,6 | 41,8 | 54,1 |
| Europa | todos | 32,0 | 52,5 | 6,5 | 7,9 | 53,7 | 79,6 | 78,1 | 67,0 |
| | alto | 11,5 | 17,8 | 0,9 | 0,7 | 16,6 | 24,7 | 26,7 | 34,3 |
| Mediterráneo Oriental | bajo y mediano | 49,6 | 83,7 | 10,4 | 12,4 | 78,1 | 128,4 | 130,2 | 108,3 |
| | todos | 21,6 | 27,4 | 39,9 | 7,3 | 29,1 | 26,6 | 27,2 | 40,8 |
| Pacífico Occidental | alto | 10,3 | 13,9 | 3,9 | 3,3 | 19,0 | 17,6 | 12,3 | 20,2 |
| | bajo y mediano | 21,8 | 27,7 | 40,2 | 7,3 | 29,2 | 26,9 | 27,7 | 41,2 |
| Pacífico Occidental | todos | 24,3 | 26,5 | 1,9 | 2,8 | 22,7 | 26,7 | 33,6 | 72,9 |
| | alto | 15,4 | 22,3 | 1,1 | 1,2 | 18,7 | 27,9 | 41,3 | 41,8 |
| | bajo y mediano | 26,2 | 27,7 | 2,0 | 3,0 | 23,2 | 26,6 | 32,2 | 80,6 |

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

| Región de la OMS | | Nivel de ingreso | Total ^c | Varones | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 32,8 | 33,8 | 15,0 | 20,0 | 39,8 | 38,7 | 34,7 | 31,9 |
| | alto | 31,6 | 35,7 | 12,8 | 14,9 | 37,2 | 42,7 | 41,9 | 26,1 |
| África ^d | bajo y mediano | 32,9 | 33,6 | 15,1 | 20,1 | 40,0 | 38,3 | 33,8 | 33,2 |
| | bajo y mediano | 41,3 | 43,9 | 23,7 | 29,7 | 56,3 | 53,4 | 43,8 | 43,0 |
| Américas | todos | 40,6 | 44,9 | 8,7 | 17,6 | 57,7 | 50,2 | 41,2 | 26,0 |
| | alto | 33,1 | 37,9 | 19,6 | 19,6 | 46,2 | 42,8 | 39,9 | 25,7 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 43,9 | 47,5 | 7,1 | 17,1 | 60,4 | 52,9 | 41,8 | 26,3 |
| | bajo y mediano | 23,1 | 24,3 | 7,9 | 18,7 | 28,1 | 28,4 | 26,1 | 21,1 |
| Europa | todos | 37,1 | 39,3 | 16,0 | 29,7 | 41,7 | 43,2 | 39,2 | 34,6 |
| | alto | 29,4 | 33,7 | 8,1 | 10,0 | 28,9 | 44,0 | 42,8 | 27,1 |
| | bajo y mediano | 39,4 | 40,7 | 17,0 | 31,9 | 44,5 | 43,1 | 38,5 | 38,9 |

Números absolutos (miles)^b

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 506 | 23 | 37 | 153 | 119 | 77 | 97 |
| | alto | 38 | <1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 12 |
| | bajo y mediano | 468 | 23 | 37 | 147 | 109 | 68 | 85 |
| África ^d | bajo y mediano | 86 | 12 | 13 | 32 | 15 | 9 | 6 |
| Américas | todos | 31 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 |
| | alto | 12 | <1 | <1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| | bajo y mediano | 19 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 101 | 4 | 13 | 37 | 23 | 13 | 12 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 34 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| | alto | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 34 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Europa | todos | 64 | 1 | 1 | 11 | 17 | 14 | 21 |
| | alto | 15 | <1 | <1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | bajo y mediano | 50 | 1 | 1 | 9 | 13 | 11 | 15 |
| Pacífico Occidental | todos | 189 | 1 | 3 | 50 | 50 | 33 | 52 |
| | alto | 11 | <1 | <1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| | bajo y mediano | 178 | 1 | 3 | 48 | 47 | 31 | 47 |

Tasa por 100 000 habitantes

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 17,3 | 7,7 | 6,4 | 20,1 | 19,1 | 19,1 | 29,2 |
| | alto | 6,9 | 1,8 | 0,9 | 6,7 | 9,2 | 10,3 | 12,2 |
| | bajo y mediano | 19,7 | 8,3 | 7,0 | 21,9 | 21,1 | 21,5 | 36,5 |
| África ^d | bajo y mediano | 29,6 | 21,9 | 14,6 | 36,1 | 31,5 | 32,2 | 36,4 |
| Américas | todos | 7,5 | 2,7 | 1,8 | 10,5 | 10,1 | 8,4 | 7,2 |
| | alto | 7,1 | 3,2 | 1,4 | 8,2 | 10,8 | 9,3 | 6,6 |
| | bajo y mediano | 7,6 | 2,6 | 2,0 | 11,5 | 9,6 | 7,5 | 7,9 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 14,3 | 4,3 | 8,3 | 18,2 | 15,2 | 14,2 | 19,7 |
| Europa | todos | 12,5 | 3,3 | 2,1 | 11,3 | 17,2 | 18,4 | 21,6 |
| | alto | 5,7 | 0,7 | 0,5 | 4,4 | 7,5 | 9,7 | 11,7 |
| | bajo y mediano | 18,3 | 5,2 | 3,1 | 15,7 | 25,5 | 26,5 | 31,9 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 15,5 | 13,1 | 8,7 | 19,1 | 12,9 | 11,6 | 27,2 |
| | alto | 4,4 | 2,1 | 0,7 | 5,7 | 6,0 | 4,0 | 6,1 |
| | bajo y mediano | 15,7 | 13,2 | 8,8 | 19,2 | 13,0 | 11,7 | 27,4 |
| Pacífico Occidental | todos | 22,5 | 2,2 | 2,4 | 24,5 | 25,3 | 26,6 | 53,3 |
| | alto | 8,8 | 1,3 | 0,9 | 8,4 | 9,9 | 12,8 | 21,0 |
| | bajo y mediano | 25,0 | 2,3 | 2,5 | 26,3 | 27,2 | 29,2 | 62,8 |

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 30,7 | 10,3 | 18,1 | 42,9 | 42,3 | 37,3 | 26,0 |
| | alto | 24,4 | 14,8 | 17,1 | 35,2 | 45,3 | 43,1 | 13,7 |
| | bajo y mediano | 31,4 | 10,2 | 18,1 | 43,3 | 42,0 | 36,6 | 29,9 |
| África ^d | bajo y mediano | 35,8 | 19,0 | 27,2 | 60,8 | 44,3 | 36,8 | 27,4 |
| Américas | todos | 25,3 | 9,2 | 18,1 | 42,1 | 41,0 | 32,3 | 9,0 |
| | alto | 22,6 | 22,4 | 19,6 | 32,6 | 39,1 | 35,0 | 8,1 |
| | bajo y mediano | 27,3 | 7,1 | 17,7 | 46,3 | 42,6 | 29,6 | 10,3 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 20,9 | 7,9 | 14,6 | 29,1 | 26,5 | 23,8 | 14,5 |
| Europa | todos | 30,8 | 11,7 | 18,7 | 39,1 | 47,6 | 38,2 | 21,6 |
| | alto | 21,8 | 8,9 | 12,9 | 31,0 | 50,8 | 48,1 | 12,5 |
| | bajo y mediano | 35,1 | 12,1 | 19,5 | 41,0 | 46,8 | 35,7 | 30,1 |

CUADRO A.2 (continuación)

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^f | Varones | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Mediterráneo Oriental | todos | 28,2 | 28,9 | 41,0 | 17,9 | 33,1 | 28,4 | 23,2 | 21,0 |
| | alto | 19,9 | 19,5 | 15,8 | 17,2 | 21,4 | 23,0 | 15,1 | 16,6 |
| Pacífico Occidental | bajo y mediano | 28,3 | 29,0 | 41,1 | 17,9 | 33,3 | 28,5 | 23,4 | 21,1 |
| | todos | 33,1 | 28,5 | 1,9 | 7,6 | 29,3 | 31,6 | 33,5 | 39,3 |
| | alto | 33,0 | 33,5 | 5,0 | 10,5 | 32,4 | 41,5 | 43,8 | 25,1 |
| | bajo y mediano | 33,2 | 27,9 | 1,8 | 7,5 | 29,1 | 30,7 | 31,8 | 42,3 |

Proporción del total de muertes (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^f | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 3,0 | 3,9 | 0,7 | 7,4 | 18,6 | 10,6 | 4,7 | 1,3 |
| | alto | 1,9 | 2,7 | 1,4 | 7,3 | 26,4 | 15,7 | 5,2 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 3,2 | 4,1 | 0,7 | 7,4 | 18,2 | 10,2 | 4,6 | 1,4 |
| África ^d | bajo y mediano | 2,9 | 4,1 | 0,8 | 10,5 | 13,8 | 6,4 | 5,0 | 2,7 |
| Américas | todos | 3,9 | 6,2 | 0,6 | 7,4 | 40,3 | 20,3 | 6,0 | 0,9 |
| | alto | 2,1 | 3,3 | 2,2 | 11,0 | 35,3 | 16,7 | 4,7 | 0,7 |
| | bajo y mediano | 5,4 | 8,4 | 0,4 | 6,8 | 41,3 | 21,7 | 6,8 | 1,1 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 2,2 | 2,8 | 0,3 | 5,9 | 12,7 | 7,4 | 3,1 | 0,9 |
| Europa | todos | 3,1 | 4,8 | 1,2 | 16,2 | 29,5 | 19,7 | 7,0 | 1,3 |
| | alto | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 4,0 | 18,8 | 14,6 | 4,6 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 4,3 | 6,6 | 1,3 | 18,1 | 32,0 | 20,9 | 7,9 | 1,7 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 5,9 | 15,3 | 6,9 | 2,6 | 0,7 |
| | alto | 2,4 | 3,0 | 1,3 | 9,7 | 16,2 | 9,7 | 2,1 | 0,5 |
| | bajo y mediano | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 5,9 | 15,3 | 6,9 | 2,6 | 0,7 |
| Pacífico Occidental | todos | 3,6 | 3,4 | 0,2 | 3,8 | 17,3 | 11,4 | 4,5 | 1,6 |
| | alto | 2,6 | 3,3 | 0,8 | 5,2 | 22,8 | 16,4 | 7,2 | 1,2 |
| | bajo y mediano | 3,7 | 3,4 | 0,2 | 3,7 | 16,9 | 11,0 | 4,2 | 1,6 |

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a Lesiones intencionales = CIE-10 X60-Y09, Y35, Y36 (CIE-9 E950-E978, E990-E999).^b Los números absolutos se redondean al millar más cercano. Toda discrepancia de las sumas totales obedece al redondeo.^c Total combinado de varones y mujeres.^d No hay países de ingreso alto en la región.^e Estandarizado por edad.

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | ≥ 60 años |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | |
| Mediterráneo Oriental | todos | 27,1 | 12,2 | 25,3 | 44,7 | 34,5 | 27,5 | 24,7 |
| | alto | 22,3 | 13,4 | 9,3 | 34,2 | 26,1 | 18,0 | 13,8 |
| | bajo y mediano | 27,1 | 12,2 | 25,3 | 44,7 | 34,6 | 27,5 | 24,8 |
| Pacífico Occidental | todos | 40,8 | 2,3 | 10,1 | 52,3 | 56,3 | 50,4 | 43,0 |
| | alto | 32,2 | 7,4 | 17,0 | 46,2 | 52,1 | 48,1 | 22,7 |
| | bajo y mediano | 41,5 | 2,2 | 10,0 | 52,6 | 56,5 | 50,6 | 47,1 |

Proporción del total de muertes (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | ≥ 60 años |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | |
| Todas | todos | 1,9 | 0,4 | 5,2 | 8,8 | 5,8 | 2,9 | 0,7 |
| | alto | 1,0 | 1,5 | 4,8 | 18,1 | 10,0 | 3,3 | 0,3 |
| | bajo y mediano | 2,1 | 0,4 | 5,2 | 8,6 | 5,6 | 2,8 | 0,8 |
| África ^d | bajo y mediano | 1,7 | 0,6 | 5,7 | 4,1 | 1,9 | 2,0 | 0,6 |
| Américas | todos | 1,1 | 0,5 | 5,1 | 13,7 | 6,3 | 1,8 | 0,2 |
| | alto | 0,9 | 2,2 | 9,1 | 17,9 | 9,3 | 2,4 | 0,2 |
| | bajo y mediano | 1,4 | 0,4 | 4,5 | 12,7 | 5,0 | 1,3 | 0,2 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 1,6 | 0,2 | 4,8 | 7,5 | 4,2 | 1,5 | 0,4 |
| Europa | todos | 1,4 | 0,7 | 6,9 | 17,4 | 11,6 | 4,0 | 0,5 |
| | alto | 0,7 | 0,6 | 4,1 | 14,2 | 9,3 | 3,4 | 0,3 |
| | bajo y mediano | 1,8 | 0,8 | 7,4 | 18,2 | 12,4 | 4,2 | 0,7 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 1,8 | 0,6 | 6,7 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 0,6 |
| | alto | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 14,2 | 5,3 | 1,1 | 0,2 |
| | bajo y mediano | 1,8 | 0,6 | 6,7 | 9,7 | 4,0 | 1,4 | 0,6 |
| Pacífico Occidental | todos | 3,7 | 0,3 | 3,8 | 24,7 | 16,5 | 5,9 | 1,5 |
| | alto | 1,8 | 1,1 | 6,6 | 25,0 | 13,3 | 5,4 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 4,0 | 0,3 | 3,7 | 24,7 | 16,7 | 5,9 | 1,7 |

CUADRO A.3

Mortalidad estimada causada por homicidio,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingreso, 2000Números absolutos (miles)^b

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^c | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 520 | 401 | 18 | 13 | 155 | 120 | 60 | 35 |
| | alto | 26 | 19 | 1 | <1 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| África ^d | bajo y mediano | 494 | 382 | 18 | 13 | 147 | 114 | 57 | 34 |
| | bajo y mediano | 116 | 82 | 10 | 4 | 30 | 19 | 10 | 9 |
| Américas | todos | 159 | 142 | 1 | 2 | 72 | 44 | 17 | 7 |
| | alto | 19 | 15 | <1 | <1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 140 | 128 | 1 | 2 | 65 | 39 | 15 | 6 |
| | bajo y mediano | 78 | 54 | 3 | 4 | 13 | 14 | 11 | 9 |
| Europa | todos | 78 | 58 | <1 | 1 | 15 | 23 | 13 | 6 |
| | alto | 4 | 3 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
| Mediterráneo Oriental | bajo y mediano | 74 | 56 | <1 | <1 | 14 | 22 | 13 | 6 |
| | todos | 31 | 20 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| Pacífico Occidental | alto | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 30 | 19 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| Pacífico Occidental | todos | 59 | 45 | 1 | 2 | 17 | 15 | 6 | 3 |
| | alto | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Pacífico Occidental | bajo y mediano | 57 | 44 | 1 | 2 | 17 | 15 | 6 | 3 |

Tasa por 100 000 habitantes

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^{c, e} | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades ^e | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 8,8 | 13,6 | 5,8 | 2,1 | 19,4 | 18,7 | 14,8 | 13,0 |
| | alto | 2,9 | 4,3 | 2,2 | 0,7 | 8,4 | 5,5 | 3,3 | 1,9 |
| África ^d | bajo y mediano | 10,1 | 15,6 | 6,1 | 2,3 | 20,9 | 21,3 | 17,9 | 17,3 |
| | bajo y mediano | 22,2 | 33,4 | 17,9 | 4,0 | 34,1 | 39,6 | 39,6 | 63,3 |
| Américas | todos | 19,3 | 34,7 | 3,5 | 2,4 | 68,6 | 49,1 | 28,9 | 16,4 |
| | alto | 6,5 | 9,9 | 4,0 | 1,2 | 21,4 | 11,6 | 6,7 | 3,7 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 27,5 | 51,0 | 3,3 | 2,9 | 89,7 | 76,4 | 50,4 | 31,9 |
| | bajo y mediano | 5,8 | 8,1 | 3,9 | 2,2 | 6,0 | 8,8 | 11,6 | 16,9 |
| Europa | todos | 8,4 | 13,0 | 1,7 | 0,8 | 15,1 | 23,5 | 18,1 | 9,3 |
| | alto | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,1 |
| Mediterráneo Oriental | bajo y mediano | 14,8 | 23,2 | 2,2 | 1,2 | 23,9 | 42,6 | 34,8 | 19,7 |
| | todos | 7,1 | 9,4 | 5,0 | 2,0 | 11,3 | 11,1 | 9,8 | 13,6 |
| Pacífico Occidental | alto | 4,2 | 6,0 | 1,4 | 0,6 | 10,1 | 9,1 | 4,1 | 5,7 |
| | bajo y mediano | 7,2 | 9,4 | 5,1 | 2,0 | 11,3 | 11,1 | 10,0 | 13,7 |
| Pacífico Occidental | todos | 3,4 | 5,1 | 1,9 | 1,5 | 7,9 | 7,4 | 4,9 | 3,4 |
| | alto | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,1 |
| Pacífico Occidental | bajo y mediano | 3,8 | 5,6 | 2,0 | 1,5 | 8,6 | 8,0 | 5,5 | 3,9 |

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^c | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades ^e | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 10,3 | 11,7 | 6,7 | 4,8 | 17,6 | 14,5 | 10,1 | 6,2 |
| | alto | 5,5 | 6,0 | 12,7 | 6,9 | 12,2 | 8,0 | 4,4 | 1,4 |
| África ^d | bajo y mediano | 10,8 | 12,3 | 6,6 | 4,8 | 18,0 | 15,1 | 10,8 | 7,2 |
| | bajo y mediano | 15,4 | 16,0 | 13,6 | 4,6 | 23,7 | 17,9 | 14,5 | 14,9 |
| Américas | todos | 28,4 | 32,6 | 8,0 | 12,5 | 47,5 | 36,7 | 24,7 | 9,9 |
| | alto | 11,4 | 12,6 | 19,6 | 9,9 | 23,7 | 13,7 | 8,7 | 2,8 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 35,8 | 39,9 | 6,2 | 13,1 | 53,2 | 45,1 | 32,5 | 15,4 |
| | bajo y mediano | 5,7 | 6,1 | 5,1 | 4,6 | 5,3 | 6,8 | 7,3 | 6,6 |
| Europa | todos | 9,5 | 9,6 | 4,2 | 3,1 | 11,7 | 12,8 | 9,1 | 4,8 |
| | alto | 2,2 | 2,3 | 8,1 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 2,6 | 0,9 |
| Europa | bajo y mediano | 11,7 | 11,4 | 3,7 | 3,0 | 13,6 | 14,3 | 10,3 | 7,1 |

| Números absolutos (miles) ^b | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 119 | 14 | 12 | 33 | 27 | 18 | 15 |
| | alto | 7 | <1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | bajo y mediano | 112 | 14 | 11 | 32 | 25 | 17 | 14 |
| África ^d | bajo y mediano | 34 | 7 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| Américas | todos | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| | alto | 5 | <1 | <1 | 1 | 2 | 1 | <1 |
| | bajo y mediano | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Europa | todos | 20 | <1 | <1 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| | alto | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 18 | <1 | <1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | alto | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Pacífico Occidental | todos | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| | alto | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |

Tasa por 100 000 habitantes

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades ^e | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 4,0 | 4,8 | 2,0 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| | alto | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 1,0 |
| | bajo y mediano | 4,6 | 5,1 | 2,1 | 4,7 | 4,7 | 5,4 | 6,1 |
| África ^d | bajo y mediano | 11,8 | 12,7 | 2,9 | 14,1 | 13,8 | 14,6 | 11,8 |
| Américas | todos | 4,0 | 2,6 | 1,2 | 6,4 | 5,7 | 3,3 | 2,6 |
| | alto | 3,0 | 3,2 | 1,0 | 4,4 | 4,2 | 2,2 | 1,7 |
| | bajo y mediano | 4,8 | 2,3 | 1,3 | 7,3 | 6,6 | 4,3 | 3,8 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 1,6 | 2,5 | 5,7 | 7,3 |
| Europa | todos | 3,9 | 1,2 | 0,7 | 4,0 | 5,7 | 5,6 | 5,3 |
| | alto | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| | bajo y mediano | 6,8 | 1,6 | 1,0 | 6,1 | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 4,8 | 5,5 | 3,6 | 5,4 | 4,3 | 3,8 | 5,9 |
| | alto | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,6 |
| | bajo y mediano | 4,8 | 5,5 | 3,6 | 5,4 | 4,4 | 3,8 | 5,9 |
| Pacífico Occidental | todos | 1,7 | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,6 |
| | alto | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 1,8 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 1,9 |

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 9,4 | 9,5 | 8,8 | 4,1 |
| | alto | 4,4 | 14,7 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 5,2 | 1,1 |
| | bajo y mediano | 7,5 | 6,3 | 5,5 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 5,0 |
| África ^d | bajo y mediano | 14,3 | 11,0 | 5,4 | 23,7 | 19,4 | 16,7 | 8,9 |
| Américas | todos | 13,7 | 8,7 | 11,8 | 25,6 | 23,0 | 12,7 | 3,3 |
| | alto | 8,8 | 22,4 | 13,5 | 17,2 | 15,3 | 8,3 | 2,1 |
| | bajo y mediano | 17,4 | 6,5 | 11,4 | 29,3 | 29,6 | 17,0 | 5,0 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 4,9 | 6,4 | 4,6 | 2,6 | 4,3 | 9,5 | 5,4 |
| Europa | todos | 9,3 | 4,4 | 6,2 | 13,8 | 15,9 | 11,6 | 5,3 |
| | alto | 2,0 | 8,9 | 6,0 | 4,6 | 5,7 | 3,5 | 0,7 |
| | bajo y mediano | 12,8 | 3,8 | 6,2 | 16,0 | 18,2 | 13,7 | 9,7 |

CUADRO A.3 (continuación)

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^e | Varones | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Mediterráneo Oriental | todos | 9,0 | 9,2 | 5,2 | 4,9 | 12,9 | 11,8 | 8,4 | 7,0 |
| | alto | 8,3 | 8,7 | 5,6 | 3,0 | 11,4 | 11,8 | 5,0 | 4,7 |
| | bajo y mediano | 9,1 | 9,2 | 5,2 | 4,9 | 12,9 | 11,8 | 8,5 | 7,0 |
| Pacífico Occidental | todos | 4,8 | 5,9 | 1,9 | 3,9 | 10,1 | 8,7 | 4,9 | 1,8 |
| | alto | 2,0 | 1,8 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 2,9 | 1,7 | 0,7 |
| | bajo y mediano | 5,1 | 6,4 | 1,8 | 3,9 | 10,8 | 9,3 | 5,5 | 2,1 |

Proporción del total de muertes (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^e | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 1,8 | 8,2 | 4,0 | 1,4 | 0,3 |
| | alto | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 3,4 | 8,7 | 2,9 | 0,6 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 8,2 | 4,0 | 1,5 | 0,3 |
| África ^d | bajo y mediano | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | 5,8 | 2,2 | 1,7 | 0,9 |
| Américas | todos | 2,7 | 4,5 | 0,5 | 5,3 | 33,2 | 14,8 | 3,6 | 0,4 |
| | alto | 0,7 | 1,1 | 2,2 | 5,5 | 18,1 | 5,3 | 1,0 | 0,1 |
| | bajo y mediano | 4,4 | 7,0 | 0,4 | 5,2 | 36,4 | 18,5 | 5,3 | 0,7 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 0,3 |
| Europa | todos | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 8,3 | 5,8 | 1,6 | 0,2 |
| | alto | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 1,3 | 1,8 | 0,3 | 1,7 | 9,8 | 6,9 | 2,1 | 0,3 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 5,9 | 2,9 | 0,9 | 0,2 |
| | alto | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 8,6 | 5,0 | 0,7 | 0,2 |
| | bajo y mediano | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 5,9 | 2,9 | 0,9 | 0,2 |
| Pacífico Occidental | todos | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 6,0 | 3,1 | 0,7 | 0,1 |
| | alto | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 6,3 | 3,3 | 0,7 | 0,1 |

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a Homicidio = CIE-10 X85-Y09 (CIE-9 E960-E969).^b Los números absolutos se redondean al millar más cercano. Toda aparente discrepancia de las sumas totales obedece al redondeo.^c Total combinado de varones y mujeres.^d No hay países de ingreso alto en la región.^e Estandarizado por edad.

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Mediterráneo Oriental | todos | 8,8 | 5,1 | 10,5 | 12,6 | 11,6 | 9,0 | 5,4 |
| | alto | 5,9 | 2,9 | 0,2 | 9,3 | 5,5 | 6,3 | 6,0 |
| | bajo y mediano | 8,8 | 5,1 | 10,5 | 12,6 | 11,7 | 9,0 | 5,4 |
| Pacífico Occidental | todos | 3,0 | 2,3 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 2,7 | 1,3 |
| | alto | 2,4 | 7,4 | 7,6 | 4,6 | 5,6 | 3,0 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 3,0 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 2,7 | 1,4 |

Proporción del total de muertes (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,1 |
| | alto | 0,2 | 1,4 | 4,0 | 5,4 | 2,3 | 0,4 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,1 |
| África ^d | bajo y mediano | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,2 |
| Américas | todos | 0,6 | 0,5 | 3,3 | 8,3 | 3,5 | 0,7 | 0,1 |
| | alto | 0,3 | 2,2 | 6,3 | 9,5 | 3,7 | 0,6 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,9 | 0,3 | 2,9 | 8,0 | 3,5 | 0,8 | 0,1 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
| Europa | todos | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 6,1 | 3,9 | 1,2 | 0,1 |
| | alto | 0,1 | 0,6 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,7 | 0,2 | 2,4 | 7,1 | 4,8 | 1,6 | 0,2 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 0,6 | 0,2 | 2,8 | 2,7 | 1,3 | 0,5 | 0,1 |
| | alto | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 |
| | bajo y mediano | 0,6 | 0,2 | 2,8 | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 0,1 |
| Pacífico Occidental | todos | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 0,0 |
| | alto | 0,1 | 1,1 | 2,9 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 0,1 |

CUADRO A.4

Mortalidad estimada causada por suicidio,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingreso, 2000

| Números absolutos (miles) ^b | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^c | Varones | | | | | | |
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 815 | 509 | 0 | 10 | 124 | 138 | 115 | 122 |
| | alto | 122 | 91 | 0 | <1 | 16 | 25 | 24 | 25 |
| | bajo y mediano | 692 | 418 | 0 | 10 | 108 | 113 | 91 | 96 |
| África ^d | bajo y mediano | 27 | 21 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Américas | todos | 65 | 52 | 0 | 1 | 14 | 15 | 11 | 10 |
| | alto | 36 | 29 | 0 | <1 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| | bajo y mediano | 29 | 22 | 0 | <1 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 168 | 107 | 0 | 5 | 37 | 30 | 21 | 14 |
| Europa | todos | 186 | 149 | 0 | 1 | 30 | 46 | 39 | 33 |
| | alto | 51 | 38 | 0 | <1 | 6 | 10 | 9 | 12 |
| | bajo y mediano | 135 | 111 | 0 | 1 | 24 | 35 | 29 | 21 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 24 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| | alto | <1 | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 23 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Pacífico Occidental | todos | 344 | 169 | 0 | 2 | 32 | 39 | 38 | 59 |
| | alto | 35 | 24 | 0 | <1 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| | bajo y mediano | 309 | 144 | 0 | 2 | 28 | 33 | 30 | 52 |

Tasa por 100 000 habitantes

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^{c, e} | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades ^e | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 14,5 | 18,9 | 0,0 | 1,7 | 15,6 | 21,5 | 28,4 | 44,9 |
| | alto | 11,4 | 17,7 | 0,0 | 0,8 | 17,0 | 23,6 | 27,9 | 33,8 |
| | bajo y mediano | 15,5 | 19,5 | 0,0 | 1,8 | 15,4 | 21,1 | 28,6 | 49,2 |
| África ^d | bajo y mediano | 6,7 | 10,6 | 0,0 | 1,4 | 6,4 | 11,2 | 18,1 | 26,6 |
| Américas | todos | 8,1 | 13,2 | 0,0 | 0,7 | 13,7 | 17,1 | 18,7 | 26,0 |
| | alto | 10,6 | 17,4 | 0,0 | 1,2 | 19,9 | 24,1 | 23,8 | 29,9 |
| | bajo y mediano | 6,3 | 10,2 | 0,0 | 0,5 | 11,0 | 12,1 | 13,9 | 21,2 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 12,0 | 15,7 | 0,0 | 3,1 | 16,9 | 18,5 | 23,3 | 26,1 |
| Europa | todos | 19,1 | 32,2 | 0,0 | 1,8 | 30,2 | 46,7 | 52,3 | 51,3 |
| | alto | 10,5 | 16,4 | 0,0 | 0,4 | 14,8 | 22,6 | 25,1 | 33,2 |
| | bajo y mediano | 26,6 | 46,8 | 0,0 | 2,6 | 40,3 | 68,2 | 79,9 | 74,1 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 5,9 | 6,3 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 10,8 |
| | alto | 3,4 | 4,1 | 0,0 | 0,4 | 5,2 | 5,6 | 4,1 | 7,3 |
| | bajo y mediano | 5,9 | 6,4 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 7,7 | 8,6 | 10,8 |
| Pacífico Occidental | todos | 20,8 | 21,2 | 0,0 | 1,1 | 14,7 | 19,0 | 28,7 | 69,2 |
| | alto | 14,3 | 20,9 | 0,0 | 0,7 | 17,1 | 25,8 | 39,7 | 40,7 |
| | bajo y mediano | 22,3 | 21,8 | 0,0 | 1,2 | 14,4 | 18,2 | 26,7 | 76,2 |

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^f | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 16,1 | 14,9 | 0,0 | 3,8 | 14,1 | 16,7 | 19,5 | 21,3 |
| | alto | 25,9 | 28,8 | 0,0 | 7,7 | 24,7 | 34,4 | 37,2 | 24,7 |
| | bajo y mediano | 15,1 | 13,5 | 0,0 | 3,7 | 13,2 | 15,0 | 17,3 | 20,5 |
| África ^d | bajo y mediano | 3,6 | 4,0 | 0,0 | 1,6 | 4,5 | 5,1 | 6,6 | 6,3 |
| Américas | todos | 11,7 | 11,8 | 0,0 | 3,5 | 9,5 | 12,8 | 16,1 | 15,7 |
| | alto | 21,5 | 24,9 | 0,0 | 9,6 | 22,1 | 28,5 | 30,9 | 22,8 |
| | bajo y mediano | 7,4 | 7,0 | 0,0 | 2,1 | 6,5 | 7,1 | 8,9 | 10,2 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 12,3 | 12,1 | 0,0 | 6,6 | 15,0 | 14,3 | 14,6 | 10,2 |
| Europa | todos | 22,8 | 24,5 | 0,0 | 6,6 | 23,5 | 25,4 | 26,2 | 26,5 |
| | alto | 27,2 | 31,3 | 0,0 | 6,1 | 25,8 | 40,1 | 40,2 | 26,2 |
| | bajo y mediano | 21,5 | 22,8 | 0,0 | 6,7 | 23,0 | 22,9 | 23,6 | 26,6 |

| Números absolutos (miles) ^b | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 305 | 0 | 12 | 93 | 77 | 50 | 74 |
| | alto | 31 | 0 | <1 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| | bajo y mediano | 274 | 0 | 11 | 88 | 70 | 43 | 63 |
| África ^d | bajo y mediano | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Américas | todos | 14 | 0 | <1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| | alto | 7 | 0 | <1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | bajo y mediano | 7 | 0 | <1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 61 | 0 | 8 | 30 | 15 | 5 | 4 |
| Europa | todos | 37 | 0 | <1 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| | alto | 13 | 0 | <1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| | bajo y mediano | 24 | 0 | <1 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| | alto | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Pacífico Occidental | todos | 175 | 0 | 2 | 46 | 46 | 31 | 50 |
| | alto | 10 | 0 | <1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | bajo y mediano | 164 | 0 | 1 | 45 | 44 | 29 | 46 |

| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
| | | Todas las edades ^e | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 10,6 | 0,0 | 2,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 22,1 |
| | alto | 5,4 | 0,0 | 0,4 | 4,7 | 7,1 | 9,0 | 11,3 |
| | bajo y mediano | 11,9 | 0,0 | 2,1 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 26,8 |
| África ^d | bajo y mediano | 3,1 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 4,1 | 7,5 |
| Américas | todos | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,4 |
| | alto | 4,1 | 0,0 | 0,4 | 3,9 | 6,6 | 7,1 | 4,9 |
| | bajo y mediano | 2,7 | 0,0 | 0,6 | 4,1 | 2,8 | 3,1 | 3,9 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 8,3 | 0,0 | 4,7 | 14,5 | 9,9 | 5,7 | 7,2 |
| Europa | todos | 6,8 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 8,1 | 11,4 | 15,7 |
| | alto | 5,0 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 6,6 | 9,0 | 11,0 |
| | bajo y mediano | 8,4 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | 9,4 | 13,6 | 20,6 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 5,4 | 0,0 | 2,0 | 8,6 | 6,2 | 4,4 | 7,0 |
| | alto | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 3,5 | 1,7 | 2,0 |
| | bajo y mediano | 5,4 | 0,0 | 2,0 | 8,6 | 6,2 | 4,4 | 7,0 |
| Pacífico Occidental | todos | 20,7 | 0,0 | 1,1 | 22,6 | 23,3 | 25,1 | 51,7 |
| | alto | 8,0 | 0,0 | 0,5 | 7,6 | 8,9 | 12,0 | 20,2 |
| | bajo y mediano | 23,2 | 0,0 | 1,1 | 24,3 | 25,0 | 27,7 | 60,9 |

| Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 18,5 | 0,0 | 5,6 | 26,0 | 27,4 | 24,6 | 19,7 |
| | alto | 20,0 | 0,0 | 6,6 | 24,7 | 34,9 | 37,9 | 12,6 |
| | bajo y mediano | 18,4 | 0,0 | 5,6 | 26,0 | 26,8 | 23,1 | 22,0 |
| África ^d | bajo y mediano | 2,8 | 0,0 | 1,2 | 2,9 | 6,7 | 4,6 | 5,6 |
| Américas | todos | 11,2 | 0,0 | 5,6 | 16,1 | 17,6 | 19,3 | 5,6 |
| | alto | 13,8 | 0,0 | 5,9 | 15,3 | 23,8 | 26,7 | 6,0 |
| | bajo y mediano | 9,3 | 0,0 | 5,5 | 16,5 | 12,4 | 12,2 | 5,0 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 12,6 | 0,0 | 8,2 | 23,2 | 17,2 | 9,5 | 5,3 |
| Europa | todos | 17,9 | 0,0 | 3,7 | 19,9 | 22,5 | 23,6 | 15,8 |
| | alto | 19,7 | 0,0 | 6,2 | 26,4 | 45,0 | 44,4 | 11,8 |
| | bajo y mediano | 17,1 | 0,0 | 3,4 | 18,4 | 17,2 | 18,3 | 19,4 |

CUADRO A.4 (continuación)

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^e | Varones | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Mediterráneo Oriental | todos | 7,0 | 5,8 | 0,0 | 2,0 | 8,6 | 8,1 | 7,2 | 5,6 |
| | alto | 6,5 | 5,8 | 0,0 | 2,3 | 5,9 | 7,3 | 5,0 | 6,0 |
| | bajo y mediano | 7,0 | 5,8 | 0,0 | 2,0 | 8,6 | 8,1 | 7,3 | 5,5 |
| Pacífico Occidental | todos | 28,1 | 22,3 | 0,0 | 3,0 | 18,9 | 22,5 | 28,6 | 37,2 |
| | alto | 31,0 | 31,6 | 0,0 | 6,0 | 29,7 | 38,3 | 42,0 | 24,4 |
| | bajo y mediano | 27,8 | 21,2 | 0,0 | 2,9 | 18,1 | 21,0 | 26,3 | 40,0 |

Proporción del total de muertes (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Total ^e | Varones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 1,4 | 6,6 | 4,6 | 2,6 | 0,9 |
| | alto | 1,5 | 2,2 | 0,0 | 3,8 | 17,5 | 12,7 | 4,6 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 1,4 | 6,0 | 4,0 | 2,4 | 0,9 |
| África ^d | bajo y mediano | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
| Américas | todos | 1,1 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 6,6 | 5,2 | 2,3 | 0,6 |
| | alto | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 5,4 | 16,8 | 11,1 | 3,7 | 0,7 |
| | bajo y mediano | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 4,5 | 2,9 | 1,5 | 0,4 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 2,1 | 6,8 | 3,7 | 1,7 | 0,4 |
| Europa | todos | 1,9 | 3,0 | 0,0 | 3,6 | 16,6 | 11,6 | 4,7 | 1,0 |
| | alto | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 2,4 | 16,8 | 13,3 | 4,3 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 2,3 | 3,7 | 0,0 | 3,8 | 16,5 | 11,1 | 4,9 | 1,2 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 0,2 |
| | alto | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 4,5 | 3,1 | 0,7 | 0,2 |
| | bajo y mediano | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 0,2 |
| Pacífico Occidental | todos | 3,0 | 2,7 | 0,0 | 1,5 | 11,1 | 8,1 | 3,9 | 1,5 |
| | alto | 2,4 | 3,1 | 0,0 | 3,0 | 20,9 | 15,2 | 7,0 | 1,1 |
| | bajo y mediano | 3,1 | 2,6 | 0,0 | 1,5 | 10,5 | 7,5 | 3,4 | 1,5 |

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a Suicidio = CIE-10 X60-X84 (CIE-9 E950-E959).^b Los números absolutos se redondean al millar más cercano. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo.^c Total combinado de varones y mujeres.^d No hay países de ingreso alto en la región.^e Estandarizado por edad.

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Mediterráneo Oriental | todos | 9,0 | 0,0 | 5,8 | 20,0 | 16,5 | 10,4 | 6,3 |
| | alto | 10,8 | 0,0 | 0,9 | 19,3 | 15,1 | 7,7 | 4,5 |
| | bajo y mediano | 9,0 | 0,0 | 5,8 | 20,0 | 16,5 | 10,4 | 6,3 |
| Pacífico Occidental | todos | 37,7 | 0,0 | 4,6 | 48,3 | 51,7 | 47,7 | 41,7 |
| | alto | 29,7 | 0,0 | 9,4 | 41,7 | 46,5 | 45,1 | 21,9 |
| | bajo y mediano | 38,3 | 0,0 | 4,5 | 48,5 | 52,0 | 47,9 | 45,7 |

Proporción del total de muertes (%)

| Región de la OMS | Nivel de ingreso | Mujeres | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 5,3 | 3,7 | 1,9 | 0,5 |
| | alto | 0,8 | 0,0 | 2,6 | 12,7 | 7,7 | 2,9 | 0,3 |
| | bajo y mediano | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 5,1 | 3,5 | 1,8 | 0,6 |
| África ^d | bajo y mediano | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Américas | todos | 10,5 | 0,0 | 1,6 | 5,2 | 2,7 | 1,0 | 0,1 |
| | alto | 0,5 | 0,0 | 2,8 | 8,4 | 5,7 | 1,9 | 0,1 |
| | bajo y mediano | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,1 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 6,0 | 2,7 | 0,6 | 0,2 |
| Europa | todos | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 8,9 | 5,5 | 2,4 | 0,4 |
| | alto | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 12,1 | 8,3 | 3,1 | 0,3 |
| | bajo y mediano | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 8,1 | 4,6 | 2,2 | 0,4 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 4,4 | 1,9 | 0,5 | 0,2 |
| | alto | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 8,0 | 3,1 | 0,5 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 4,3 | 1,9 | 0,5 | 0,2 |
| Pacífico Occidental | todos | 3,5 | 0,0 | 1,7 | 22,7 | 15,1 | 5,5 | 1,5 |
| | alto | 1,6 | 0,0 | 3,7 | 22,5 | 11,9 | 5,0 | 0,8 |
| | bajo y mediano | 3,7 | 0,0 | 1,7 | 22,8 | 15,3 | 5,6 | 1,6 |

CUADRO A.5

Mortalidad estimada causada por lesiones vinculadas con la guerra,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingresos, 2000

| Región de la OMS | | Nivel de ingreso | Total ^c | Varones | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 310 | 233 | 22 | 30 | 69 | 58 | 29 | 25 |
| | alto | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 310 | 233 | 22 | 30 | 69 | 58 | 29 | 25 |
| África ^d | bajo y mediano | 167 | 122 | 7 | 18 | 36 | 33 | 16 | 13 |
| Américas | todos | 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | alto | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 63 | 49 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 5 |
| Europa | todos | 37 | 30 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| | alto | <1 | <1 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 37 | 30 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 39 | 29 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| | alto | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | bajo y mediano | 39 | 28 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Pacífico Occidental | todos | 2 | 1 | 0 | <1 | <1 | <1 | 0 | <1 |
| | alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bajo y mediano | 2 | 1 | 0 | <1 | <1 | <1 | 0 | <1 |

Tasa por 100 000 habitantes

| Región de la OMS | | Nivel de ingreso | Total ^{c, e} | Varones | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades ^e | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 5,2 | 7,8 | 7,1 | 4,9 | 8,6 | 9,1 | 7,1 | 9,2 |
| | alto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 6,2 | 9,4 | 7,8 | 5,4 | 9,8 | 10,9 | 9,0 | 12,7 |
| África ^d | bajo y mediano | 32,0 | 50,6 | 13,3 | 20,4 | 40,4 | 67,2 | 62,1 | 92,6 |
| Américas | todos | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
| | alto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | bajo y mediano | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,3 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 4,4 | 6,6 | 1,9 | 3,3 | 8,0 | 8,2 | 5,9 | 10,0 |
| Europa | todos | 4,2 | 7,0 | 4,2 | 5,3 | 8,0 | 8,7 | 7,2 | 6,3 |
| | alto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 7,6 | 13,0 | 7,1 | 8,5 | 13,3 | 16,5 | 14,5 | 14,3 |
| Mediterráneo Oriental | todos | 8,1 | 11,2 | 34,6 | 4,1 | 9,8 | 7,5 | 8,2 | 15,4 |
| | alto | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 2,9 | 4,1 | 7,2 |
| | bajo y mediano | 8,2 | 11,3 | 34,8 | 4,2 | 9,9 | 7,6 | 8,3 | 15,6 |
| Pacífico Occidental | todos | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| | alto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

| Región de la OMS | | Nivel de ingreso | Total ^f | Varones | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Todas las edades | 0-4 años | 5-14 años | 15-29 años | 30-44 años | 45-59 años | ≥ 60 años |
| Todas | todos | 6,1 | 6,8 | 8,2 | 11,0 | 7,8 | 7,1 | 4,9 | 4,3 |
| | alto | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 11,3 | 8,4 | 7,7 | 5,4 | 5,3 |
| África ^d | bajo y mediano | 22,3 | 23,9 | 10,1 | 23,4 | 28,1 | 30,4 | 22,7 | 21,8 |
| Américas | todos | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| | alto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
| Asia Sudoriental ^d | bajo y mediano | 4,6 | 5,5 | 2,6 | 7,0 | 7,1 | 6,3 | 3,7 | 3,9 |
| Europa | todos | 4,5 | 5,0 | 10,2 | 19,7 | 6,2 | 4,8 | 3,6 | 3,3 |
| | alto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | bajo y mediano | 5,8 | 6,2 | 11,5 | 21,8 | 7,6 | 5,5 | 4,3 | 5,1 |