

# TOS FERINA



## El dato

En 2018, hubo **MÁS DE 151 000 CASOS** de tos ferina en todo el mundo.



## La enfermedad

La Tos Ferina es una **INFECCIÓN RESPIRATORIA** altamente contagiosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis*.



## Transmisión

- > La tos ferina se propaga principalmente a través de las **GOTITAS** producidas al toser o estornudar.
- > La enfermedad es **MÁS PELIGROSA EN LOS BEBÉS**.
- > Las personas con tos ferina son **MÁS CONTAGIOSAS** hasta aproximadamente **3 SEMANAS DESPUÉS** de que comienza la tos.



## Síntomas

- > Los primeros síntomas aparecen generalmente de **7 A 10 DÍAS** después de la infección.
- > Incluyen fiebre leve, secreción nasal y tos, que en los casos típicos se convierte gradualmente en una tos seca seguida de una tos ferina.
- > La **NEUMONÍA** es una complicación relativamente común, y las convulsiones y las enfermedades cerebrales ocurren raramente.



## Calendario

- > Se recomienda se administre la **PRIMERA DOSIS** a las 6 semanas de edad; con **DOSIS SUBSIGUIENTES** administradas con 4 a 8 semanas de diferencia, a las 10 a 14 semanas de edad y a las 14 a 18 semanas.
- > Una dosis de **REFUERZO**, preferiblemente durante el segundo año de vida.



## Vacunas

- > Según la epidemiología local, es posible que se justifiquen refuerzos más adelante.
- > La vacunación de **MUJERES EMBARAZADAS** es efectiva para proteger a los bebés que son demasiado pequeños para ser vacunados.
- > La vacunación contra la tos ferina se administra normalmente con la **VACUNA DTP** (Difteria, Tétanos, Tos Ferina)
- > Además, también se administra combinada con difteria, tétanos, y Hib (cuadrivalente); combinada con difteria, tétanos, hepatitis B y Hib (pentavalente); vacuna combinada con difteria, tétanos, polio inactivada y Hib (pentavalente) y la vacuna combinada con difteria, tétanos, hepatitis B, polio inactivada y Hib (hexavalente).