

PREVENCIÓN DEL VIH

SI ERES
VIH-



HAZTE LA
PRUEBA
DEL VIH

SI ERES
VIH+

USO DE CONDONES Y LUBRICANTES



Usar condones de manera consistente y correcta, y con lubricante, reduce hasta un 94% la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

USO DE CONDONES Y LUBRICANTES



Usar condones de manera consistente y correcta, y con lubricante, reduce hasta un 94% la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

PRUEBAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



Al hacerte pruebas regularmente y tratarte reduces la posibilidad de contraer el VIH.

PRUEBAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



Al hacerte pruebas regularmente y tratarte reduces la posibilidad de transmitir el VIH.

PREP



La profilaxis preexposición (PrEP) usada diariamente por una persona con alto riesgo de contraer el VIH previene la infección.

PEP



La profilaxis posterior a la exposición (PEP) al VIH se utiliza en emergencia para prevenir la infección hasta 72 horas después de tener relaciones sexuales consentidas de alto riesgo u otra exposición potencial.

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL



Una persona que vive con el VIH y que toma correctamente los medicamentos antirretrovirales no transmite el virus a otras personas.

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL



Mantenerse en tratamiento es la clave para una vida saludable y duradera y para no transmitir el VIH a otras personas.



Es necesario que los gobiernos faciliten las condiciones para que todas las personas tengan acceso a todos los servicios de prevención y tratamiento del VIH recomendados por la OMS, libres de **estigma** y **discriminación**.