

APPENDICE 2.1

LEISHAMANIOSE VISCÉRALE ANTHROPONOTIQUE		
	SOUS-CONTINENT INDIEN	AFRIQUE ORIENTALE
MALADIE CLINIQUE		
<ul style="list-style-type: none"> • Incubation • Répartition selon l'âge • Sexe • LDPKA • Flambées 	<p style="text-align: center;">2 semaines à 6 mois enfants, adolescents, jeunes adultes (70 % entre 5 et 30 ans) ♂ > ♀ fréquente fréquentes, taux de mortalité élevé</p>	<p style="text-align: center;">de quelques semaines à quelques mois enfants, adolescents, jeunes adultes (70 % entre 5 et 30 ans) ♂ > ♀ fréquente fréquentes, taux de mortalité élevé</p>
LEISHMANIES		
Espèces :	<i>L. donovani</i>	<i>L. donovani</i>
Localisations :	SRE/sang/peau saine	SRE/sang/muqueuse nasale/peau saine
VECTEUR		
Espèces :	♂ <i>argentinae</i>	<i>P. orientalis/P. martini/P. celiae</i>
Localisation :	intra et péri-domiciliaire (maisons et étables)	forêts d'acacias + termitières
RÉSERVOIR	Homme	Homme
BIOTOPE	rural (villages)	forêts d'acacia maisons près des termitières

APPENDICE 2.2

LEISHAMANIOSE VISCÉRALE ZOONOTIQUE		
	EUROPE MÉRIDIONALE	MAGHREB/ MÉDITERRANÉE ORIENTALE
MALADIE CLINIQUE		
• Répartition selon l'âge	> 50 % d'adultes	95 % d'enfants en dessous de 5 ans
• Sexe	♂ > ♀	♂ > ♀
• Flambées	non	non
LEISHMANIES		
Espèces :	<i>L. infantum</i>	<i>L. infantum</i>
VECTEUR Espèces :	<i>P. ariasi</i> <i>P. perniciosus</i> <i>P. perfiliewi</i> <i>P. neglectus</i>	<i>P. langeroni</i> <i>P. longiductus</i> <i>P. major</i> <i>P. syriacus</i> <i>P. smirnovi</i> <i>P. tobbi</i> <i>P. chinensis</i> <i>P. perniciosus</i> <i>P. longicuspis</i>
RÉSERVOIR Espèces :	chien/renard	chien/renard/chacal/rat noir ?
BIOTOPE	petits villages (rural) péri-urbain	petits villages (rural)

APPENDICE 2.3

LEISHMANIOSE VISCÉRALE ZOONOTIQUE		
	CHINE	AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD
MALADIE CLINIQUE		
• Répartition selon l'âge	95 % d'enfants en dessous de 10 ans	70 % d'enfants en dessous de 5 ans
• $\text{♂} > \text{♀}$	$\text{♂} > \text{♀}$	$\text{♂} > \text{♀}$
• Flambées	non	petites flambées en zones suburbaines
LEISHMANIES		
Espèces :	<i>L. infantum</i>	<i>L. infantum (L. chagasi)</i>
VECTEUR Espèces :	<i>P. chinensis</i> <i>P. longiductus</i> (péridomestique) <i>P. major wui</i>	<i>Lu. longipalpis</i> (péridomestique) <i>Lu. evansi</i>
RÉSERVOIR Espèces :	chien/chien viverin	chien/renard/marsupiaux
BIOTOPE	petits villages (rural)	petits villages (rural) zones suburbaines (conditions sanitaires précaires)

Figures A et B

Formes de deux moustiquaires du commerce (pour des lits). La moustiquaire rectangulaire (A) a quatre points d'attache, et la moustiquaire conique (B) seulement un. Sont également indiquées les mesures à prendre pour calculer la surface de tissu pour chacune d'elles.

