Pan American Health Organization
Regional Office of the World Health Organization

Para distribución pública
Viernes 1 de mayo del 2009

INFORME DE SITUACIÓN NÚM. 8
DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

Nueva Influenza A/H1N1

Resumen

- La transmisión sostenida de persona a persona se ha confirmado solo en México y Estados Unidos de América. En total, 11 países han notificado oficialmente 331 casos de nueva influenza A/H1N1.
- Los siguientes países en otras regiones han notificado casos confirmados por laboratorio, sin defunciones: Austria, 1; Alemania, 3; Israel, 2; Países Bajos, 1; Nueva Zelandia, 3; España, 13; Suiza, 1, y Reino Unido, 8.
- El sitio web de la OPS[1] se actualiza constantemente con nuevos materiales, incluidos informes de situación emitidos por la OMS, recomendaciones y preguntas frecuentes sobre el brote epidémico.
- La OMS decidió referirse a este nuevo virus como "Nueva Influenza A/H1N1"

La situación en las Américas

- México: 156 casos confirmados de nueva influenza A/H1N1, incluidas 9 defunciones.
- Estados Unidos: 141 casos confirmados de nueva influenza A/H1N1, incluida 1 defunción.
- Canadá: 34 casos confirmados de nueva influenza A/H1N1; algunos con antecedentes de viaje reciente a México.
- El informe epidemiológico diario de la OPS se publica en el sitio web de la OPS [2]; los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud de México pueden encontrarse en www.dgepi.salud.gob.mx

Información sobre la vacuna

- La vacuna contra la influenza estacional, a pesar de tener un componente de A/H1N1, puede tener pocas probabilidades de ser eficaz contra el brote actual.
- Una vacuna nueva podría obtenerse en un período relativamente corto (de 4 a 6 meses).
- La producción de esta vacuna nueva también afectará a la producción de la vacuna contra la influenza estacional.
- En el plazo de un año se tendrían listas entre mil millones y dos mil millones de dosis de la vacuna nueva.

[1] http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es
[2] http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=1091

- La inquietud principal es garantizar el acceso a la vacuna nueva a todos los países.
- Para más información sobre vacunas y nueva influenza A/H1N1, visite el sitio web de la OPS[3].

Recomendaciones generales

- En este momento, se recomienda acrecentar la vigilancia. La OPS ha publicado directrices para el aumento de las actividades de vigilancia (véase el sitio web).
- Se recomienda que los centros nacionales de influenza en los países de América Latina y el Caribe envíen al centro colaborador de la OMS para la influenza (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos) todas las muestras positivas del virus de la nueva influenza A que no se hayan podido subtipificar.
- La vacuna contra la influenza estacional no se recomienda para todos los países.
- No se recomienda la restricción de los viajes ni el cierre regular de las fronteras. Se recomienda que las personas que están enfermas aplacen cualquier viaje.
- El consumo de carne de cerdo y sus derivados bien cocidos no entraña ningún riesgo de contraer la infección por este virus.
- Se aconseja a la población que periódicamente se lave bien las manos con agua y jabón y que busque atención médica ante la aparición de cualquier síntoma de influenza.

Guía de la OMS de preparación y respuesta ante una pandemia (2009): Definición de las distintas fases

Fase 1	No se ha notificado que un virus de la influenza que circula entre los animales cause infección en los seres humanos.
Fase 2	Un virus de la influenza que circula entre los animales domésticos o silvestres ha causado infección comprobada en seres humanos y, por lo tanto, se considera una amenaza específica que puede causar una pandemia.
Fase 3	Un virus reagrupado de la influenza animal o humana ha causado casos esporádicos o pequeños conglomerados de enfermedad en personas, pero no ha tenido una transmisión de persona a persona suficiente para sostener brotes en la comunidad.
Fase 4	Se ha comprobado la transmisión de persona a persona de un virus reagrupado de la influenza animal o humana capaz de sostener la existencia de brotes en la comunidad.
Fase 5	**El mismo virus identificado ha causado niveles sostenidos de brotes comunitarios en dos o más países de una región de la OMS.**
Fase 6	Además de los criterios de la fase 5, el mismo virus ha causado brotes comunitarios sostenidos en, por lo menos, otro país de otra región de la OMS.
Período posterior al de máxima actividad	Los niveles de influenza pandémica en la mayoría de los países con una vigilancia apropiada han disminuido por debajo del nivel máximo.
Una posible nueva oleada	Aumenta de nuevo el nivel de actividad de la influenza pandémica en la mayoría de los países con una vigilancia apropiada.
Período pospandémico	Los niveles de actividad de la influenza pandémica han regresado a los niveles que presenta la influenza estacional en la mayoría de los países con una vigilancia apropiada.

[3] http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569&lang=es

Recursos

- Esta sección del sitio web del Centro Regional de Información de Desastres (CRID) tiene información útil para el público en general y los profesionales de la salud que se ha recabado de diferentes fuentes (ministerios de salud, defensa y protección civil, la OPS y otros. Véase el sitio web del CRID[4].
- La OMS ha publicado directrices para la vigilancia de la infección en seres humanos destinadas a los centros nacionales de enlace del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Incluye una definición de caso[5] para los fines de la vigilancia.
- La información de la OMS acerca del uso del tratamiento de la influenza con antivíricos, incluido el Tamiflu, se puede consultar en línea[6].

Conclusiones

- Todos los países deben consultar sus planes contra la pandemia de influenza y aplicar las medidas descritas en ellas para la fase 5.

Para más información

- Alerta preventiva por brote de influenza[7] (Secretaría de Salud de México).
- Human Influenza Investigation[8] (CDC).
- Cuestiones de salud ocupacional relacionadas con la influenza A/H1N1[9].
- Information on Influenza[10] (Organismo de Salud Pública del Canadá).
- Sitio de la OPS sobre la influenza[11].
- Organización Mundial de la Salud [12].

[4] http://www.crid.or.cr/crid/index.shtml
[5] http://www.who.int/csr/disease/swineflu/WHO_case_definitions.pdf
[6] http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/useofoseltamivir2006_03_17A.pdf
[7] http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html
[8] http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm
[9] http://www.cdc.gov/niosh/topics/swineflu/
[10] http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php
[11] http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569
[12] http://www.who.int

Área en riesgo (véase el mapa)



Country	Probable cases	Confirmed cases	Confirmed deaths
Canada	...	34	0
USA	...	141	1
Mexico	528	156	9
Total	528	331	10

... no available data

Para ponerse en contacto con el EOC de la OPS, puede llamar al teléfono +1 202 974 3399 o escribir a: eoc@paho.org