

# VACINE SUAS CRIANÇAS CONTRA O SARAMPO

## A VACINA SALVA VIDAS

### O SARAMPO PODE CAUSAR:

- PNEUMONIA
- DANO CEREBRAL PERMANENTE
- SURDEZ
- PARTO PREMATURO
- BEBÊS COM BAIXO PESO AO NASCER
- MORTE

### SINTOMAS DO SARAMPO





- FEBRE ALTA
- CORRIMENTO NASAL
- TOSSE
- OLHOS VERMELHOS
- ERUPÇÕES NA PELE

Os sintomas podem aparecer entre 7 e 14 dias após a infecção.

### O SARAMPO É MUITO CONTAGIOSO


A DOENÇA É TRANSMITIDA QUANDO UMA PESSOA INFECTADA RESPIRA, TOSSE OU ESPIRRA




O VÍRUS PODE FICAR NO AMBIENTE E NAS SUPERFÍCIES POR DUAS HORAS.



A PESSOA INFECTADA PODE CONTAGIAR OUTRAS ENTRE QUATRO DIAS ANTES E QUATRO DIAS DEPOIS DO SURGIMENTO DAS ERUPÇÕES NA PELE.



UMA PESSOA COM SARAMPO PODE INFECTAR NOVE DE CADA 10 PESSOAS NÃO VACINADAS AO SEU REDOR.



### QUANDO DEVEMOS VACINAR AS CRIANÇAS?



**PRIMEIRA DOSE**

[12 a 15 meses]

**SEGUNDA DOSE**

[18 meses\*]

*Durante surtos ou campanhas de atualização, a vacina pode ser aplicada a outros grupos de pessoas*

**A ÚNICA FORMA DE PREVENIR O SARAMPO É A VACINAÇÃO. A VACINA É SEGURA E EFICAZ.**

*Ou 4-6 anos de acordo com o esquema nacional*

### VACINE-SE ANTES DE VIAJAR!



### HÁ SARAMPO EM MUITOS LUGARES DO MUNDO

*Os viajantes, crianças ou adultos, que não sabem se estão vacinados, devem receber uma dose ao menos duas semanas antes de viajar.*

### SE VOCÊ ESTÁ COM SARAMPO



- Fique em casa ou no quarto do hotel, caso esteja em viagem
- Consulte um profissional de saúde
- Evite circular em locais públicos

**PROTEJA-SE E PROTEJA QUEM VOCÊ AMA.**

**PARA EVITAR O SARAMPO,**

**#VACINE-SE**