



VACINE SUAS CRIANÇAS CONTRA O SARAMPO

A Vacina Salva Vidas

O SARAMPO PODE CAUSAR

- PNEUMONIA
- DANO CEREBRAL PERMANENTE
- SURDEZ
- PARTO PREMATURO
- BEBÊS COM BAIXO PESO AO NASCER
- MORTE



SINTOMAS DO SARAMPO

- FEBRE ALTA
- CORRIMENTO NASAL
- TOSSE
- OLHOS VERMELHOS
- ERUPÇÕES NA PELE

Os sintomas podem aparecer entre 7 e 14 dias após a infecção.

A DOENÇA É TRANSMITIDA QUANDO UMA PESSOA INFECTADA RESPIRA, TOSSE OU ESPIRRA

A PESSOA INFECTADA PODE CONTAGIAR OUTRAS ENTRE QUATRO DIAS ANTES E QUATRO DIAS DEPOIS DO SURGIMENTO DAS ERUPÇÕES NA PELE.

¿QUANDO DEVEMOS VACINAR AS CRIANÇAS?



PRIMEIRA DOSE
[12 a 15 meses]

SEGUNDA DOSE
[18 meses*]

**Ou 4-6 anos de acordo com o esquema nacional*

A ÚNICA FORMA DE PREVENIR O SARAMPO É A VACINAÇÃO. A VACINA É SEGURA E EFICAZ.



A VACINA É SEGURA E EFICAZ.

PROTEJA-SE E PROTEJA QUEM VOCÊ AMA. PARA EVITAR O SARAMPO, #VACINE-SE

OPAS



paho.org/bra