



Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, Región de las Américas

Vol. 1, No. 23—11 diciembre 2003

Brote de enfermedad respiratoria grave de curso rápido en Colombia

Entre el 25 de septiembre y el 28 de noviembre 2003 se han notificado al Instituto Nacional de Salud (INS) 38 casos de una enfermedad respiratoria grave, de curso rápido, que oscila entre 10 horas y 7 días de evolución. La enfermedad comienza con un cuadro de vías respiratorias altas, e incluye fiebre, tos con o sin expectoración, disnea, cefalea, astenia, adinamia y puede acompañarse de diarrea, vómito o intenso dolor torácico. Las radiografías de tórax muestran infiltrados intersticiales ó con infiltrados alveolares. Cuatro pacientes tenían antecedentes patológicos de importancia, entre ellos, EPOC, síndrome de hipercoagulabilidad e hiperreactividad bronquial. Se han notificado 13 muertes.

La información obtenida de los pacientes que consultan a las instituciones prestadoras de salud (IPS) evidencia un incremento de los casos de infección respiratoria. El análisis de las historias clínicas y los datos de laboratorio informados al INS muestra que la edad promedio de los pacientes es de 22 años (6 meses a 72 años) y el 58% (22) son mujeres. La procedencia de los casos es: Antioquia, 19 casos (50%); Norte de Santander, 14 (37%) y Bogotá, 7 (13%).

En 16/38 casos se han aislado los siguientes virus respiratorios: 2 con Influenza A, 2 con parainfluenza y 2 coinfecciones (una con Virus Sincitial Respiratorio y parainfluenza 1, y la otra con Virus Sincitial Respiratorio e influenza A).

Se han tomado las medidas de prevención y control adecuadas, incluyendo mensajes de educación para la población, sensibilización de los trabajadores de salud y recomendaciones para la vacunación de influenza.

Fuente: [Instituto Nacional de Salud de Colombia](#)