

Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, Región de las Américas

Vol. 1, No. 1—10 julio 2003


***Colombia:* Actualización sobre el brote de fiebre amarilla selvática en el departamento del Norte de Santander**

Hasta la semana epidemiológica 28 del 2003, Colombia ha notificado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 27 casos de fiebre amarilla selvática, con una tasa de letalidad del 63%. Nueve casos han sido notificados en las siete primeras semanas epidemiológicas en los departamentos de Guaviare (1), Casanare (2), Meta (1) y Norte de Santander (5). Los casos notificados por el departamento del Norte de Santander pertenecen al mismo brote registrado en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela a principio de este año, y que fue controlado luego de una vacunación masiva llevada a cabo por los dos países.

Casos humanos de fiebre amarilla selvática reaparecieron en el departamento Norte de Santander desde la semana epidemiológica 23 en las ciudades de Convención, Tibu, El carmen y El Tara. En este brote, hasta la semana epidemiológica 28 un total de 18 casos confirmados fueron notificados. Todos, excepto un único caso, ocurrieron en hombres adultos entre 13 a 43 años. La tasa de letalidad fue del 61% en este brote.

El Ministerio de Salud de Colombia se encuentra implementando las medidas necesarias para evitar otro brote, tales como la inmunización y el fortalecimiento de la vigilancia en las áreas afectadas y en ciudades circunvecinas. Las autoridades de Venezuela están tomando las precauciones necesarias e implementando acciones similares para prevenir la aparición de casos. Las oficinas de la OPS en estos países se encuentra proporcionando el apoyo necesario.

YF Cases by Epidemiological Weeks America Region, 2002 - 2003



07/09/2003

Epidemiological Weeks

