

Metas y Estrategias-Cono Sur y Región Andina

País	Población Objetivo	Criterios de Riesgo	Tipo de Campaña	Vacunas	Meta Poblacional	Tot. Pop.	Estrategias	Otros Comentarios
Argentina	Niños de 6-23 meses		Grupos de riesgo	Influenza estacional trivalente	276,444 (78%)	276,444	Vacunación institucional	
	Recién nacidos y Adultos	Departamentos endémicos de Hepatitis B	Grupos de riesgo	Hepatitis B	20,000 recién nacidos y 400,000 adultos	420,000	Vacunación institucional y por concentración en municipios endémicos	
	Niños menores de 1 año	Bajas coberturas Rotavirus	Intensificación nacional	Rotavirus	21,815		Todas las estrategias de vacunación	
	Niños menores de 1 año	Bajas coberturas contra tos ferina, Hib, difteria, tétanos y hepatitis B	Intensificación nacional	Pentavalente	21,815		Todas las estrategias de vacunación	
	Niños menores de 1 año	Bajas coberturas Poliomieltis	Intensificación nacional	VOP	21,815	21,815	Todas las estrategias de vacunación	
	Niños de 12-23 meses	Bajas coberturas contra Sarampión, Rubéola, Parotiditis, SRC	Intensificación nacional	SRP	21,771	21,771	Todas las estrategias de vacunación	
	Niños de 18 meses	Inicio de refuerzos contra Polio, tos ferina, tétanos y difteria	Intensificación nacional	Refuerzos de VOP y DPT	10,886	10,886	Todas las estrategias de vacunación	
	Adultos susceptibles viajeros al Mundial	Riesgo de importaciones de virus de Sarampión y Rubéola desde Sud Africa	Puestos de vacunación en puertos internacionales	SR	500	500	Todas las estrategias de vacunación	
	Mujeres en edad fértil 10-49 años	Recien Nacidos Susceptibles de contraer Tétanos neonatal	Intensificación nacional	Td	5369 (10% Meta mensual)	5,369		
Bolivia	Personas entre 6 meses y 44 años	Enfermedades crónicas, embarazadas y trabajadores de salud	Grupos de riesgo	Influenza A(H1N1)	1178000.00	1,178,000		
	Adultos mayores de 60 años	Personas mayores de 60 años y sanos (vacuna bi-valente), y personas mayores de 60 años con comorbidades (vacuna bi-valente y vacuna contra Influenza A (H1N1)	Los esfuerzos durante la SVA será la cuarta etapa del plan nacional para la vacunación contra la influenza (pandémica y estacional), de 24 abril al 7 mayo 2010.	Vacuna contra la Influenza bi-valente (H3N2) y Influenza B y Vacuna contra la Influenza A (H1N1)		19,000,000		
	Niños 0-5 años (todo el territorio nacional, pero principalmente a los residentes en municip de fronteras, con altos índices de NBI, en situación de desplazamiento por el conflicto armado, bajas coberturas (<50%) y munic con población indígena y afro-colombiana; así mismos los niños de 1 año de los municipios de riesgo para F.A), mujeres embarazadas, mujeres de edad fértil (10 a 49 años)	Niños menores de 1 año con bajas coberturas, niños de 1 año en municipios de riesgo de FA, población en frontera, población indígena	Campaña masiva para iniciar y completar esquemas (1 de abril al 31 de mayo de 2010) y movilización social (lema "llegando a todos"). Durante la SVA (25 abril al 1 de mayo) una intensificación de la programación de actividades extramurales, a nivel urbano y rural.	BCG, HB, Rotavirus, VOP, Pentavalente, TV, FA, Td	Vacunar 143,023 con BCG y HB; 143,023 con 1a y 2a de Rotavirus, 143,023 con 1a, 2a, 3a de VOP y Pentavalente, 142,678 con TV y FA; vacunar 100% gestantes y MEF con Td	428,724	"Vacunación sin barreras"- vacunación intramural o institucional y vacunación extramural. Comunicación social (incluyendo TV, radio, medios escritos, y conferencia de prensa. Marchas desfiles, pancartas, afiches en las escuelas y los colegios).	
Brasil	Mujeres embarazadas, trabajadores de salud	Embarazo, aumento de morbilidad/mortalidad, para mantener funcionado los servicios de salud	Nacional	Influenza A(H1N1)	85% de la población	875,000	Vacunación en puestos fijos.	
	Grupo en riesgo para Influenza A H1N1: mujeres embarazadas, enfermos crónicos, personal de salud.	Reducir la morbilidad severa por influenza y la mortalidad en grupos de riesgo, y mantener la integridad y adecuado funcionamiento de los servicios de salud.	Nacional	Influenza A(H1N1)	Grupos de riesgo de acuerdo al Plan Nacional de vacunación contra la influenza A(H1N1).	900,000		
	Grupo en riesgo para Influenza A H1N1: mujeres embarazadas, enfermos crónicos, personal de salud.	Reducir la morbilidad severa por influenza y la mortalidad en grupos de riesgo, y mantener la integridad y adecuado funcionamiento de los servicios de salud.	Nacional	Influenza A(H1N1)		2,959,391		
	Antigripal pandémica: niños entre 6 meses y 5 años, embarazadas, personal de salud, personal perteneciente a servicios esenciales, enfermedades crónicas (cualquier edad)							
	Antineumocócica 13 Valente: niños menores de 5 (por lo menos, una dosis)							
	Antineumocócica 23 Valente: personas mayores de 5 años que tienen asplenia congénita y adquirida/defunción esplénica, inmunodeprimidos, drepanocitosis, implantes cocleares, enfermedades crónicas, filtraciones líquido céfalo-raquídeo por malformaciones congénitas, fractura de cráneo o procedimientos neuroquirúrgicas, antecedentes de haber padecido una enfermedad neumocócica invasiva, fumadores, mayores de 65 años.	Actividades de promoción de vacunación (esp./ en las campañas de vacuna antigripal y antineumocócica 23 Valente para las poblaciones susceptibles, y en al captación de los menores de 5 años para vacunarlos con la vacuna antineumocócica 13 Valente) y puesta al día de los esquemas individuales.	Antigripal pandémica, antineumocócica conjugada 13 Valente, antineumocócica 23 Valente, DT					
Paraguay	Niños mayores de 1 año y de 2 años sin SRP en 2009. Niños mayores de 6 meses, sin OPV y pentavalente en 2009	Susceptibilidad a Sarampión, rubéola, parotiditis, difteria, tos ferina, tétanos, meningitis y neumonías por haemophilus influenzae tipo b en niños que no fueron vacunados en 2009.	Campaña focalizada a municipios seleccionados por bajas coberturas en menores de un año y de año en 2009. Se realizara durante 4 semanas del 23 de abril al 23 de mayo de 2010 personas encontradas con esquemas incompletos.	SRP, OPV, Pentavalente, Rotavirus, Td	40% de los niños mayores de un año y de dos años que no recibieron la vacunas SRP en 2009 y 40% de niños de un años que recibieron la vacunas con OPV y Penta. Estos niños son residentes de municipios con cobertura 2009 menor de 70% para estas vacunas. (Se esta terminando de identificar el numero de municipios con coberturas menores de 70% y numero de niños que viven en ellos que no fueron vacunados con SRP y con OPV y Pentavalente lo que constituye la meta real para estas dos vacunas)	TBD años.	Administración de otras vacunas a niños de 1 a 4 años con esquemas incompletos de vacunación. Búsqueda activas de casos sospechosos de sarampión, rubéolas, PFA, SRC. Aplicación de vacuna Td a población de MEF según esquema y a mayores de 60 años.	
Sub Regional Total						26,097,900		