



## Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, Región de las Américas

Vol. 1, No. 17—30 octubre 2003

### Actualización sobre Influenza en las Américas

**Estados Unidos de América (EUA):** Durante Semana Epidemiológica (SE) 42 (12 al 18 de octubre, 2003), el 1,9% de las visitas de pacientes a médicos centinela fue debida a síndromes pseudogripales o 'enfermedades similar a influenza' (ESI), encontrándose por debajo valor nacional de referencia para esta semana (2,5%). El 6,3% del total de defunciones ocurridas en el país fueron atribuidas a neumonías e influenza. En el estado de Texas un departamento de salud notificó actividad generalizada de influenza. En otros cinco estados y la ciudad de Nueva York hubo casos esporádicos, y en los 40 estados restantes y el Distrito de Columbia no se detectó actividad.

En esta semana, la Oficina en los EUA de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los laboratorios colaboradores de OMS del Sistema Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios y Entéricos (SNVVRE) examinaron 520 muestras para la detección del virus de la influenza. Se identificó el virus en 15 (2,9%) de las muestras (once con virus influenza tipo A subtipo H3N2 y cuatro con virus tipo A sin subtipo identificado). Desde el 28 de septiembre, se han examinado un total de 1.980 muestras y 70 (3,5%) fueron positivas. De estas 70 en 69 (99%) se identificó virus tipo A y en una (1%) virus tipo B. De las 69 con virus tipo A catorce (20%) correspondían al subtipo H3N2. Hasta el 18 de octubre seis estados han notificado casos de influenza confirmados. En Arkansas, Louisiana, Nueva York, Texas y Washington está circulando el tipo A, y en Hawai se ha identificado un caso con virus tipo B.

*Fuente:* [Influenza: Reports and Surveillance Methods in the United States](#) (Influenza: Informes y métodos de vigilancia en los Estados Unidos). Centers for Disease Control and Prevention of the United States (CDC), National Center for Infectious Diseases (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EUA / CDC, Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas) (en inglés).

**Canada:** Durante la semana epidemiológica que concluye el 18 de octubre de 2003 (SE 42), los médicos centinelas notificaron 15 casos de Síndrome Pseudogripal o 'enfermedad similar a influenza' (ESI) por 1.000 visitas de pacientes, que está por debajo del valor de referencia de para esta semana. En esta semana, Health Canada recibió 1.023 informes de laboratorio sobre pruebas realizadas para influenza. En 87 de ellos

(8,50%) se identificó virus tipo A (en Saskatchewan y Alberta). Se notificaron también tres brotes de influenza en Alberta (en dos escuelas y en una residencia de ancianos) y otros tres brotes en Saskatchewan (dos residencias de ancianos y otro en una escuela). En total en el año 2003, se han realizado 6.285 pruebas, de las cuales 175 resultaron positivas (174 con virus tipo A y una con tipo B).

*Fuente:* *FluWatch, October 12 to October 18, 2003 (Week 42)* (12–18 octubre 2003 / semana 42), en línea en [English edition](#) and [Édition française](#). Health Canada.

**Chile:** Se detectó un aumento en las notificaciones desde la SE 12 (del 16 al 22 de marzo de 2003), llegando a un máximo de 285 casos en la semana del 20 al 26 de julio de 2003 (tasa 28,6 por cada 100.000 habitantes). A partir del 2 de agosto 2003, se observó una tendencia descendente. Esta disminución se observó en casi todas las regiones, excepto en Maule, donde las notificaciones de influenza aumentaron a finales de septiembre. Durante el 2003, se han detectado casos de influenza en Antofagasta, La Serena, Viña, Valparaíso, San Fernando, Linares, Concepción, Talcahuano, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Aysén y Punta Arenas. Se han tipificado casos de Influenza A similares a la Cepa A/Panamá/2007/99 (H3N2), incluida en la vacuna de la temporada 2003, de Influenza A (H1) y del Tipo B (un caso por el momento). En la semana del 19 al 25 de octubre de 2003, se ha detectado actividad esporádica, con dos casos de Influenza A en Talcahuano y uno en Concepción.

*Fuentes*

- [Informe de la Situación de Influenza al 2 de octubre de 2003](#), Ministerio de Salud de Chile.
- [Country Reports for the 2003–2004 Season](#) (Informes de país para la estación de 2003–2004). *FluNet*. Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés).

**Argentina:** Las notificaciones recibidas hasta el 24 de octubre de 2003 indican que en el país se han notificado 848.232 casos de influenza. Las provincias con mayor número de casos son Buenos Aires (con 243.736 casos) y Córdoba (100.104 casos).

*Fuente:* [Boletín semanal de notificaciones \(24 de octubre de 2003, semana epidemiológica N° 42\)](#). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de Argentina.

**México:** Hasta el 18 de octubre de 2003, se han notificado 130 casos de influenza. Las entidades federativas con mayor número de casos son Distrito Federal (88) y Yucatán (16 casos). Se ha detectado actividad en otras entidades (Campache, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Sonora). En la semana del 12 al 18 de octubre de 2003, se notificó un solo caso.

*Fuente:* [Boletín Epidemiológico de México, Semana 42, del 12 al 18 de octubre del 2003 \(Estadísticas en salud\)](#).

**Guyana Francesa y Uruguay:** También se ha detectado actividad viral en la Guyana Francesa (SE 40 y 41) y en Uruguay (SE 40).

*Fuente:* [Country Reports for the 2003–2004 Season](#) (Informes de país para la estación de 2003–2004). *FluNet*. Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés).

