

**Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes,
Región de las Américas**

Vol. 1, No. 2—17 julio 2003

Fiebre amarilla selvática (FAS)

1. *Fiebre amarilla selvática en las Américas*

A la semana epidemiológica 29, que finalizó el un total de 109 casos de fiebre amarilla selvática, con 50 defunciones han sido notificados a la OPS por Bolivia (4), Brasil (62), Colombia (33), Perú (7) y Venezuela (3). La distribución de los casos por semana epidemiológica se presenta en la grafica a la derecha.

2. *Actualización del brote de fiebre amarilla selvática en Colombia*

Desde la última actualización del 9 de julio de 2003, el Ministerio de Salud de Colombia ha notificado la ocurrencia de 6 nuevos casos de fiebre amarilla selvática en el departamento del Norte de Santander. A la fecha, el número total de casos notificados en el presente brote es de 24 casos con 12 defunciones. Los municipios afectados son Convención (6), El Carmen (5), El Tara (1), Teorema (3) y Tibu (9). Una campaña de vacunación se esta llevando a cabo en las áreas afectadas a fin de vacunar a todos los residentes; asimismo se recomienda la vacunación de todos los viajeros a los municipios afectados y aledaños.

