

LA SALUD DE NUESTROS NIÑOS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS ¡PROTEJÁMOSLOS CONTRA LA MALARIA!

“Proteja a los niños en las zonas donde la malaria es endémica, asegurándose de que duerman con mosquiteros tratados con insecticidas”



Organización Panamericana de la Salud

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Salud Familiar y Comunitaria / Proyecto de la Salud del Recién Nacido, Niño y Joven (FCH/CH)
Vigilancia Sanitaria y Prevención y Control de Enfermedades / Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (HSD/CD)



“Proteja a los niños en las zonas donde la malaria es endémica, asegurándose de que duerman con mosquiteros tratados con insecticidas”

LA SALUD DE NUESTROS NIÑOS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

¡PROTEJÁMOSLOS CONTRA LA MALARIA!

La Organización Panamericana de la Salud estima que un millón de personas sufren de malaria en las Américas cada año. De estos casos, 100,000 son niños menores de cinco años. Muchas veces sus madres también están afectadas por la malaria.

Estos niños pueden sufrir de bajo peso al nacer, anemia, epilepsia, dificultades en el aprendizaje, y podrían morir si no reciben tratamiento médico oportuno.

Ningún niño ni sus familias deben experimentar esta tragedia dado que la malaria es prevenible y se puede tratar.



Organización Panamericana de la Salud

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Salud Familiar y Comunitaria / Proyecto de la Salud del Recién Nacido, Niño y Joven (FCH/CH)

Vigilancia Sanitaria y Prevención y Control de Enfermedades / Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (HSD/CD)


525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037

www.paho.org



Organización Panamericana de la Salud

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud





Casos de malaria en niños en países endémicos de las Américas, 2006 (en porcentajes)

Uno de cada cinco pacientes sintomáticos de malaria en la Región son niños de menos de cinco años. Muchas veces la madre también está infectada. Entre los países que reportan mayores proporciones de malaria entre niños están Belize, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, y Surinam.

Mortalidad por malaria entre niños menores de cinco años en los países de las Américas donde la malaria es endémica, 2006

A pesar de los avances en el tratamiento y la disponibilidad de medidas preventivas efectivas, las personas aún mueren por causa de la malaria en las Américas. Las muertes entre los niños fueron reportadas en Belize, Brasil, Guyana Francesa, y Guyana.

Estos son los países (también incluyen Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Perú, Surinam, y Venezuela) donde *Plasmodium falciparum*, es el parásito de malaria más patógeno que se encuentra.




Distribución de mosquitos tratados con insecticida (MTI) vs. un estimado de la población total en riesgo en las Américas (al 2006)

Aproximadamente 28 millones de personas están en riesgo de la malaria en la Región, y se les recomienda como una prioridad que usen mosquiteros tratados para la prevención de la malaria. Hasta ahora, los reportes indican que solo 863,234 mosquiteros han sido distribuidos desde 2004 lo que significa una cobertura de solo 3%.

Resistencia a medicamentos antipalúdicos en las Américas

La Resistencia del *Plasmodium falciparum* a varios medicamentos antipalúdicos ha sido confirmada en ocho países de Sudamérica. Las políticas de tratamiento en estos países han sido revisadas hacia el uso del tratamiento antimalárico combinado basado en la artemisinina (TCA). La Organización Mundial de la Salud recomienda seguir estrictamente el nuevo tratamiento para ayudar a prevenir la resistencia a estos nuevos medicamentos.



AIEPI Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia en el contexto del continuo materno-recién nacido-salud infantil

Todos tenemos un papel en la prevención y control de la malaria

Para todos los que viven en zonas de riesgo:

- ❖ Asegurarse que toda la familia, especialmente los niños de menores de cinco años, estén protegidos de las picaduras de mosquitos, al dormir bajo mosquiteros tratados con insecticidas (MTI)
- ❖ Un niño que tiene fiebre y se sospecha que tiene malaria debe buscar diagnóstico correcto y oportuno del centro de salud más cercano; y debe completar el tratamiento apropiado si está enfermo.
- ❖ Usar otras medidas de prevención:
- ❖ Spray intradomiciliar residual (SIR) por personal entrenado puede ser usado para matar mosquitos. Sin embargo, la limpieza de las paredes hace del spray intradomiciliar residual (SIR) una medida ineficaz dado que la sustancia activa se disuelve.

- ❖ Repelentes de mosquitos de buena calidad y ropa de protección (camisas de mangas largas, pantalones, y calcetines); uso de pantallas metálicas entre las puertas y ventanas; y drenar los lugares infestados con mosquitos (estanque, contenedores de agua, etc.) también proveen de protección.

Para la gente que trabaja en salud:

- ❖ Asegurar disponibilidad y accesibilidad de intervenciones de malaria apropiadas, oportunas, y de buena calidad, diagnóstico y tratamiento a las comunidades en todo momento.
- ❖ Esto incluye, entre otros:
- ❖ Asegurar que los suministros esenciales para la prevención de la malaria, diagnóstico y tratamiento oportuno lleguen a las comunidades, y sean usados apropiadamente por las personas en riesgo.

- ❖ Asegurar que las pautas de diagnóstico y tratamiento sean cumplidos estrictamente por los pacientes y los proveedores de salud.

Para todos:

- ❖ Ser un defensor en la lucha contra la malaria
- ❖ Compartir este mensaje con tu familia y amigos, y comprometerse activamente con la comunidad y los líderes hacia una mejor salud para los niños, mujeres y todos.

