Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

Keith H. Carter
OPS/OMS

Administración Masiva de Drogas (MDA)

“Una estrategia recomendado en época de la Erradicación de la Malaria”

- Transmisión alta y moderada.
- Ha sido usada como intervención de control, eliminación y respuesta a brotes.
- Todas en población o área geográfica definida toma de tratamiento de manera coordinada incluyendo no enfermos y no infectados (excepción contraindicación de antimaláricos - embarazadas, niños u otros).
- No evidencia de beneficios a largo plazo en grupos poblacionales grandes.

Administración Masiva de Drogas (MDA)

- MDA y Profilaxis en masa exitosa en reducción de prevalencia parasitemia pero cuando discontinuado tendencia a volver a niveles previos.
- MDA usado para *P. falciparum* y *P. vivax* (Europa, Asia, Américas) – temporada de transmisión
- Transmisión alta y moderada integración de control vectorial intensivo y continuar por años.
- Uso en escala pequeña en lugares aislados – puertos de entrada controlados y población monitoreada (Islas Solomon, Vanuatu)

Administración Masiva de Drogas (MDA)

- Componentes de sistema de distribución:
Tratamiento Directamente Observado; Monitoreo de Seguridad; Cobertura y (importación) monitoreo; Participación Comunitaria

Brechas en el conocimiento

- Esquema mas eficaz; Tamaño de población diana; Combinación de Intervenciones; Temporalidad de MDA (transmisión mas baja)

Agenda de Investigación para enfocar en lecciones aprendidas

- Estudios de escala pequeña de eficacia de estrategia de MDA (eg. Combinación de medicamentos); Modelaje de impacto de eficacia de MDA e implementación de MDA; Estudios de escala grande para probar estrategia de implementación (combinación de control vectorial y MDA) y diseñado para éxito (intervención durante largo tiempo y con plan post MDA) ;
- Estrategia puede ser factor mas importante para obtener impacto,
- Estudio actual sobre resistencia a artemisinina (Asia)

Casos Graves de Malaria

...

Nuevas líneas de tratamiento

Caso Grave de la Malaria

- **Uno o más de los siguientes características clínicas:**
 - Deterioro de la consciencia (incluyendo el coma)
 - Prostración, o debilidad generalizada (sentar, parar, caminar)
 - Convulsiones múltiples: más de 2 episodios en 24h
 - Respiración profunda y dificultosa (acidótica)
 - Edema pulmonar agudo y síndrome de distrés respiratorio
 - Colapso circulatorio o choque
 - Tensión arterial sistólica <80 mm Hg en adultos y <50 en niños
 - Lesiones renales agudas
 - Ictericia clínica y signos de disfunción de otros órganos vitales
 - Sangrado anormal

Caso grave de malaria

- **Datos de laboratorio**

- Hipoglucemia (<40 mg/dL)
- Acidosis metabólica (bicarbonato plasmático < 15 mmol/L)
- Anemia normocítica grave (<5g/dl en adultos y <7 en niños)
- Hemoglobinuria
- Hiperlactacidemia (lactato > 5 mmol/L)
- Trombocitopenia <100,000 plaquetas / μ L
- Disfunción renal (creatinina sérica > 265 μ mol/L)
- Parasitemia elevada
 - >100,000/ μ L en zonas de baja transmisión
 - Pacientes pueden tolerar más en zonas de alta transmisión

Caso grave de malaria

- **Riesgo**

- Mayor probabilidad con *P. falciparum*
- Mayor ninos en transmision alta.
- Aumenta en segundo y tercer trimestres del embarazo
- Aumenta en pacientes con VIH/SIDA;
Esplenectomizados

P. vivax

- Ocorre en zonas con transmision relativamente alta y donde hay resistencia a CQ

Tratamiento de caso grave

- **Artesunato** - tratamiento de primer línea para casos graves de malaria
 - 2,4 mg/kg de peso corporal IV o IM
 - Hora 0 – al ingreso
 - Hora 12
 - Hora 24
 - Una vez al día hasta que el paciente pueda tomar la medicación vía oral
 - Continuar con TCA completando el dosis total, usando
 - Artemeter más lumefantrina
 - Artesunato más amodiaquina
 - Artesunato más mefloquina*
 - Artesunato más sulfadoxina-pirimetamina, o
 - Dihidroartemisinina más piperaquina

**No tras la recuperación de la malaria cerebral*

¿No Artesunato parentral?

Si no hay artesunato parentral:

- **Artemeter:** 3.2 mg/kg de peso corporal vía IM en hora 0 y luego 1.6mg/kg/día, o
- **Dihidrocloruro de quinina, IV**
 - 20 mg de sal/kg de peso corporal en hora 0
 - 10 mg/kg cada 8 horas
 - Cada dosis en infusión vía durante 2 a 4 horas diluida en 10ml/kg de líquido isotónico a una velocidad no más de 5mg/kg/hora
 - Continuar IV hasta que puede tolerar quinina vía oral, luego completar tratamiento de 7 días con 10mg de sal/kg, cada 8 horas
- Intramuscular
 - misma dosis en parte anterior del muslo y no en la nalga
 - Diluida en salina normal a 60 – 100 mg de sal/ml
- En caso de quinina:
 - monitorear niveles de glucemia- su efecto en las páncreas puede llevar a hipoglucemia
 - especialmente en mujeres embarazadas

Cambios propósitos

Anteriormente

- Tratamiento parenteral hasta que el paciente puede tolerar medicación oral
- Parásitos resistentes a la cloroquina:
 - Primera línea: Quinina
 - Alternativas: Artesunato o artemeter
- Parásitos sensibles a la cloroquina
 - Primera línea: Cloroquina
 - Alternativas: Quinina o artemisinina

Actualmente

- Tratamiento parenteral por los menos 24 horas y luego hasta que el paciente puede tolerar medicación oral
- Parásitos resistentes o sensibles a cloroquina
 - Primera línea: Artesunato
 - Alternativas: Artemeter o quinina

Gracias

Publicación disponible desde:

[http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6964&Itemid=2258&lang=es,](http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6964&Itemid=2258&lang=es)

o

Español: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/101443/1/9789243548524_spa.pdf

English: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79317/1/9789241548526_eng.pdf