

Eliminación de las enfermedades desatendidas y otras enfermedades transmisibles relacionadas con la pobreza

Énfasis en Tracoma




Trachoma



Presencia a nivel subnacional, 1998–2007

Situación epidemiológica

- 3 países con evidencia
- 29 unidades subnacionales
- Cerca de 7 mil casos notificados anualmente (la mayoría en el Brasil)



Prevalência de Tracoma em Municípios. Inquérito de Prevalência. Brasil, 2002-2007.



Fonte: MS/SVS-DEVEP/CGDT/CDTV

Tracoma en Brasil


Distribuição dos municípios segundo prevalência por regiões, Inquérito de tracoma. Brasil, 2002-2007.

Prevalência de Tracoma por Município	Norte N°	Nordeste N°	Sudeste N°	Sul N°	Centro Oeste	Total Brasil N°	Brasil %
Zero	32	149	16	37	8	242	21,5
> Zero a < 5%	112	223	40	53	47	475	42,0
5% a < 10%	50	109	18	53	18	248	22,0
≥ a 10%	38	82	8	31	6	165	14,5
Total	232	563	82	174	79	1130	100,0



Tracoma

Presencia a nivel subnacional, 1998–2007




Meta

Eliminar nuevos casos de ceguera causadas por tracoma en A. Latina



Tracoma

Presencia a nivel subnacional, 1998–2007




Estrategia

Estrategia "SAFE":

- Prevenir la ceguera mediante la cirugía
- Reducir la transmisión en zonas endémicas por lavar la cara, el uso de antibióticos y mejoras ambientales

Tracoma

Presencia a nivel subnacional, 1998–2007



Resolución

WHA 51.11 (1998)

Buenas Practicas en los Países

México

- Programa SAFE del CENAVESE y el Estado de Chiapas
- Intervención exitosa, cerca de la eliminación en Chiapas

Brasil

- Programa nacional para control de tracoma
- Estudios epidemiológicos de tracoma en casi todo el país

Guatemala

- Identificación de casos en 92 comunidades en 2 departamentos
- Inicio del programa SAFE

