CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS (EID)

SITUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EID

Geohelmintiasis o lombrices intestinales:

12 millones de niños menores de 15 años están en riesgo de infección (2012).

Esquistosomiasis: Aproximadamente 1,5 millones de personas requieren tratamiento.

Filariasis Linfática: Alrededor de 1,7 millones de personas están en riesgo de infección.

Oncocercosis: 14 mil personas viven en áreas de riesgo de infección.

Ceguera por tracoma: 50 millones de personas están en riesgo de sufrir infección.

Leishmaniasis: 21.306 casos notificados de leishmaniasis cutánea y mucosa y 3.840 de leishmaniasis visceral (2011).

Lepra (Hanseniasis): 33.955 casos nuevos registrados en el último año (2011).

Enfermedad de Chagas: se estima que 1,2 millones de personas están infectadas y ocurren alrededor de 46 casos de transmisión vectorial cada año (2010).

Enfermedades Infecciosas Desatendidas (EID)

📍 Geohelmintiasis	📍 Ceguera por Tracoma	Número de EID que se presentan a 1er nivel administrativo subnacional
📍 Lepra (Hanseniasis)	📍 Filariasis Linfática	
📍 Leishmaniasis	📍 Esquistosomiasis	🟡 5 EID
📍 Enfermedad de Chagas	📍 Oncocercosis	🟢 6 EID
		🟩 7 EID
		— Límites del país

"Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la OPS / OMS sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto a las cuales puede que no haya pleno acuerdo".

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población Total..... 198.361.000
 Población Urbana..... 84,9%
 Índice de desarrollo humano..... 85
 (Puesto en el ranking mundial de un total de 187 países)

Esperanza de vida..... 73,5 años
 Educación (media de años escolarizados)..... 7,2 años
 Ingreso nacional bruto per cápita..... US\$10.720
 Población con acceso a agua potable..... 98%
 Urbana: 100% y Rural: 85%

Población con acceso a saneamiento..... 79%
 Urbana: 100% y Rural: 44%

Fuente: Situación de Salud en las Américas. Indicadores Básicos 2012. Organización Panamericana de la Salud.

Fuente: Galería fotográfica de OPS

NUESTRO COMPROMISO

- Brasil junto con los Estados Miembro de la OPS / OMS aprobó en 2009 la [Resolución CD49.R19](#) para luchar contra las EID.
- Desde el 2009, Brasil con apoyo de la OPS/OMS y el Banco Inter-Americano de Desarrollo-BID, implementa un proyecto demostrativo que aborda los determinantes sociales de la salud para combatir las EID en varios municipios del estado de Pernambuco.
- En julio del 2012 el país lanzó el Plan Integrado de Acciones Estratégicas para Acelerar la Prevención, el Control y la Eliminación de seis EID 2011-2015, en el marco del plan nacional "Brasil Sin Miseria".

Fuente: Galería fotográfica de OPS

En marzo del 2013 el país lanzó la campaña integrada de desparasitación para geohelmintiasis (en 9 millones de escolares) y detección de casos de lepra (Hanseniasis) en 800 municipios priorizados.

HACIA DÓNDE VAMOS

La hoja de ruta para controlar y eliminar las EID.

ACTIVIDADES

para lograr el control y la eliminación de las EID en Brasil, 2012-2020.

En lepra (Hanseniasis) y leishmaniasis se quiere:

- Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica.
- Detectar y tratar precozmente los casos.

Adicionalmente en la enfermedad de Chagas, se quiere llegar a:

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica en la Amazonía y en las áreas extra amazónicas con control ya establecido, tomando en cuenta los brotes de intoxicación alimentaria por *T. Cruzi*.
- Fortalecer la atención médica integrada ya existente a través del Sistema de Salud (SUS).

LOGROS ALCANZADOS

Desde 1995 implementa acciones para eliminar la oncocercosis en su único foco en la región amazónica (población Yanomami). Se han alcanzado coberturas mayores al 85% del 2001 al 2012 con ivermectina. Está cerca de interrumpir la transmisión de la oncocercosis en este foco.

Completó el mapeo nacional de ceguera por tracoma, esquistosomiasis y geohelmintiasis, y ha incorporado estas EID en un plan nacional.

Eliminó la filariasis linfática en siete estados, quedando solamente el área metropolitana de Recife, estado de Pernambuco, como foco activo en el país.

En 13 estados se interrumpió la transmisión de *T. cruzi* por *T. infestans*.