

CO-EPIDEMIA TB/VIH EN LAS AMÉRICAS


Países con mayor número de casos nuevos estimados de TB infectados con VIH Las Américas 2013



Fuente: Informe Regional TB 2014

Países con mayor tasa de incidencia estimada de TB/VIH - Las Américas 2013

(Países con al menos 100 casos nuevos)



Fuente: Informe Regional TB 2014

Para el 2013:


En el mundo:

- La OMS estimó que de 9.0 millones de personas que desarrollaron TB, 1.1 millones estaban infectadas con VIH (12%).

En las Américas:

- La OMS estimó 31.800 casos nuevos de TB infectados con VIH.
- Los países notificaron, entre los casos nuevos y previamente tratados de TB, 21.361 co-infectados con VIH, cifra ligeramente superior a la del 2012.
- La incidencia estimada de TB/VIH de 3.3 por 100.000 habitantes, es la tercera más alta después de África y el sureste asiático.
- El 91% los casos esperados de TB/VIH estarían en 10 países.
- 69% de los 233.000 casos nuevos y previamente tratados de TB notificados conocían el resultado de la prueba de VIH y de ellos el 13% estaban infectados con el virus.
- La proporción de pacientes de TB a quienes se les realiza la prueba de VIH aumentó de 44% en 2008 a 68% en 2013. Persiste una brecha en la detección del VIH entre casos con TB. Suramérica tiene la brecha más grande comparativamente con las otras subregiones.
- 15 países realizan pruebas de VIH a más del 80% de sus casos de TB. Solo 4 de ellos están entre los 10 con más alto número estimado de casos nuevos de TB con VIH.
- 14 países adicionales informaron haber realizado tamizaje para TB en personas con VIH, alcanzando 22 países y cerca de 77.000 personas con VIH.
- Los resultados de tratamiento de TB para pacientes coinfectados de 20 países que informaron en el 2012 mostraron 54% de éxito de tratamiento, 19% de muertes, 14% de pérdida de seguimiento y 12% no evaluados.

Cobertura y situación de prueba de VIH entre los casos de TB en las Américas - 2008 a 2013




Fuente: Informe Regional TB 2014

- 14 países de la Región estaban implementando el Xpert MTB-Rif como método diagnóstico de TB en personas con VIH.
- 18 países informaron el número de personas con VIH que recibían terapia preventiva con Isoniacida – TPI en el 2013, alcanzando 62.500 personas, tres veces más que en el 2012.
- 23 de 36 países informaron sobre el suministro de terapia preventiva con cotrimoxazol – TPC* a pacientes coinfectados. En estos países el porcentaje varió de 0 a 100%.

Porcentaje de casos de TB/VIH con TPC* notificados, 2013

(Países con información**)




* Terapia preventiva con cotrimoxazol (Trimetropin sulfá)

** Barbados, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Uruguay reportaron cero casos (información a ser confirmada)

Fuente: Informe Regional TB 2014

Cobertura de prueba de VIH y resultado positivo por subregiones en las Américas 2013




Fuente: Informe Regional TB 2014

- 25 de 36 países informaron sobre el suministro de terapia antirretroviral – TAR, con porcentajes que varían entre el 5.4 y 100%. La mayoría de los países deben aún incrementar sus esfuerzos para lograr alcanzar la recomendación internacional del 100%.

Porcentaje de casos de TB/VIH con TAR* notificados, 2013

(Países con información**)



* Terapia antirretroviral

** Brasil que en años anteriores había reportado el mayor número de casos TB/VIH con TAR, no suministró ésta información en el 2013

Fuente: Informe Regional TB 2014