


Coinfección TB/VIH en las Américas

Países con mayor carga de incidencia estimada de TB/VIH, 2014

#	País	Casos incidentes TB/VIH	%	% Acumulado
1	Brasil	13,000	36%	36%
2	Haití	4,400	12%	48%
3	México	2,300	6.4%	55%
4	Perú	2,300	6.4%	61%
5	República Dominicana	1,600	4.4%	65%
6	Colombia	1,500	4.2%	70%
7	Ecuador	1,200	3.3%	73%
8	Venezuela (República Bolivariana de)	1,100	3.1%	76%
9	Guatemala	910	2.5%	79%
10	Estados Unidos	710	2.0%	81%
11	Honduras	450	1.2%	82%
12	Bolivia (Estado Plurinacional de)	390	1.1%	83%
	Otros	6,176	17.1%	100%
	Total	36,036	100%	

Países con mayor número de casos notificados de co-infección TB/VIH, 2014



Para el 2014:


En el mundo:

- 9.6 millones de personas enfermaron de TB
- 1.2 millones de personas con VIH desarrollaron TB.
- 0.4 millones murieron con TB/VIH.

En las Américas:


- 36 000 personas con VIH desarrollaron TB, con una tasa de 2.7 por 100 000 habitantes.
- 21 978 casos de TB/VIH fueron notificados, casi el 50% en Brasil y Haití.
- 74% de los casos de TB notificados conocían el resultado de la prueba de VIH y de ellos el 13% estaban infectados con el virus.
- La proporción de pacientes de TB con prueba de VIH aumentó de 53% en 2009 a 74% en 2014, sin embargo persiste una brecha para alcanzar la meta del 100%.
- Solo 5 países realizan pruebas de VIH a más del 90% de sus casos de TB.
- De 39 países, solo 14 reportaron datos sobre tratamiento de la infección latente de TB en personas con VIH, alcanzando 28 556, que evidencia un leve incremento respecto al año anterior.

Prueba de VIH en pacientes con TB, 2009-2014




- Con respecto al 2013 hubo un incremento importante en el número de personas con VIH a quienes se les realizó tamizaje para TB, pasando de 9280 a 56 856 personas. Solo 11 países informaron.
- El 52% de los casos TB/VIH recibieron Terapia Preventiva con Cotrimoxazol.

Resultados de la cohorte de casos de TB/VIH, 2013




- 31 países informaron los resultados de la cohorte de tratamiento de TB/VIH del 2013. El éxito alcanzado fue de 53% en pacientes coinfectados, frente a 77% en pacientes con TB sin VIH. Los porcentajes de mortalidad, pérdida en seguimiento y no evaluados fueron superiores en pacientes coinfectados.

Cobertura de prueba de VIH y resultado positivo por subregiones en las Américas 2014



- El 64% de los casos de co-infección TB/VIH ingresaron a tratamiento antirretroviral (TAR), 29 países informaron.

Porcentaje de casos de TB/VIH con TAR* notificados, 2014 (Países con información*)



* Brasil que en años anteriores había reportado el mayor número de casos TB/VIH con TAR, no suministró esta información en el 2014