


ESTRATEGIA FIN DE LA TB: PRINCIPALES INDICADORES EN LAS AMERICAS

INDICADORES DE ALTO NIVEL


Reducción en número de muertes por TB en 35% para 2020 .	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
Datos estimados	23.786	15.461	2.378

Muertes por TB en las Américas, 2000 - 2016



Reducción de la tasa de incidencia por TB en 20% para 2020.	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
Estimados x 100.000 hab.	27,5	22	5,5

Incidencia de TB en Las Américas: Tendencia, Hitos y Metas



Familias afectadas por TB que enfrentan gastos catastróficos por la TB (%)	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
	ND**	Cero	Cero

** No Disponible

Numero de muertes notificadas por TB, Estadísticas Vitales 2015

País	Muertes 2015*
Brasil	6.202
México	2.496
Perú	1.482
Colombia	1.246
Argentina	691
Ecuador	570
Estados Unidos de América	496
Guatemala	349
Chile	279
Panamá	279
Nicaragua	152
Uruguay	86
Cuba	49
Belice	13
Puerto Rico	7
Aruba	2
Granada	2
San Vicente y las Granadinas	1
Total	14.402

* Incluye casos TB-VIH

- **18** países notificaron **14.402** defunciones por TB, a través de sus estadísticas vitales en 2015. Muchas de estas muertes pudieron ser evitadas.
- En 2016 la brecha en la detección de casos por TB en la Región fue de **50.824**.
- Desde el año 2000 la disminución de la tasa de incidencia ha sido 1,7% por año. Para lograr las metas de la Estrategia Fin de la TB se requiere un descenso de **5,3%** anual.
- Es necesario que los países realicen encuestas sobre los **gastos catastróficos** que las familias afectadas deben afrontar.

ESTRATEGIA FIN DE LA TB - INDICADORES PRIORITARIOS

INDICADOR	VALORES 2016	META 2025
Cobertura de tratamiento anti-TB*	81%	≥ 90%
Tasa de éxito de tratamiento	72**	≥ 90%
Porcentaje de familias afectadas por TB que enfrentan gastos catastróficos por la TB	ND***	0%
Porcentaje de pacientes nuevos de TB que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas por la OMS	15%	≥ 90%
Cobertura de tratamiento de infección latente por TB: - (menores de 5 años) - (VIH)	68% 30%	≥ 90% ≥ 90%
Cobertura de investigación de contactos	5%	≥ 90%
Cobertura de pacientes de TB con resultados de pruebas de sensibilidad a drogas (PSD)	36%	100%
Cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos anti-TB	ND***	≥ 90%
Porcentaje de pacientes con TB que conocen su estado de VIH	81%	100%
Tasa de letalidad por TB	6,5****	≤ 5%

*Calculado sobre el número estimado de casos incidentes

** Incluye cohorte de casos de TB nuevos, recaídas, previamente tratados (2015) y RR/MDR/XDR (2014)

*** No disponible

****Valor correspondiente a 2015

- Existen brechas para alcanzar las metas de los indicadores prioritarios para el 2025.
- Las cifras de 2016 reflejan limitaciones en los sistemas de información y en la calidad del dato.
- Existen bajas coberturas de investigación de contactos y tratamiento de infección latente, lo que perpetua la cadena de transmisión en la comunidad y limita avanzar en el control de la enfermedad hacia la eliminación.
- Aun no se dispone de información de la cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos anti-TB debido a los procesos de introducción en las guías y su inclusión en la lista de medicamentos esenciales de los países.
- No se dispone de información de letalidad debido al retraso en la recolección de registros vitales.
- El porcentaje de pacientes con TB que conoce su estado de VIH ha detenido su avance en los últimos años.
- Se espera que con la introducción de los métodos rápidos moleculares, la cobertura de PSD aumente.
- Para alcanzar las metas al 2025 de estos indicadores, se requiere priorizar las intervenciones de prevención y control de TB en todos los países de la Región.
- La tasa de éxito de tratamiento es baja, debido a la alta proporción de pacientes fallecidos y perdidos durante el seguimiento.
- Se requiere identificar más líderes comprometidos en la implementación de la Estrategia Fin de la TB.
- La OPS continúa apoyando los esfuerzos e iniciativas de los países.