

Colaboración TB/VIH:

Guyana



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

V Reunión Regional de Actividades de Colaboración TB/VIH
(San José, Costa Rica, 6–7 noviembre 2008)






Avances en actividades de colaboración TB/VIH




Ministerio de Salud, Programas de VIH/SIDA y TB

Tuberculosis en Guyana: Casos notificados 1980–2007



Selected HIV/AIDS Estimates, Guyana, 2005




Assumes non-significant numbers of PLWHA receiving ART
 Asume números no significantes de PVA que reciben TARV

PVA = Personas que viven con VIH/SIDA
 TARV = Terapia antirretroviral



VIH/SIDA en Guyana.

1987–2006 (1er cuartal): Casos notificados e incidencia





Detección intensificada de casos de PVA

- Hay tamizaje rutinaria para TB de todos los pacientes con VIH
 - Historia clínica
 - PPD
 - Radiografía del tórax
 - Si producen esputo y si tienen una historia que sugiere la TB, se toman muestras de esputo (“Spot-Home-Spot”)
 - Una vez que estén recopilados todos los resultados, el paciente será referido al programa de TB para evaluación y manejo.



Prevención y control de TB para PVA

- Se brindan a todos los pacientes con TB servicios de VCT en las clínica de TB (16 clínicas de TB y 16 instalaciones de atención y tratamiento de VIH/SIDA)
 - Asesoría antes y después de la prueba
 - Asesoría sobre ITS
 - Motivación para comportamientos de reducción de riesgos
 - Provisión de condones
- Todos los pacientes con TB tienen acceso fácil a las instalaciones de atención y tratamiento de VIH/SIDA/ITS, pues ambas clínicas están en el mismo complejo.




Guías para coinfección TB/VIH

Elegibilidad para TARV

- Etapa de OMS 3 o 4
- Todas las personas coinfectadas con VIH/TB:
 - $CD4+ < 350$ = Tratamiento de TB para por lo menos 2 meses, e inicio de HAART.
 - $CD4+ > 350$ = Tratamiento de TB primero y luego reevaluar para HAART.
 - **Cotrimoxazol para todas las personas coinfectadas por VIH/TB, no importa el CD4.**

Tratamiento de VIH y TB





Guías para coinfección

- Se manejan todos los pacientes coinfectados a través del programa de TB, hasta que estén curados de TB; luego se les refiere a los servicios de atención de VIH/SIDA.
- Se administra el tratamiento antirretroviral según las normas; el programa de TB está encargado del monitoreo de los pacientes.
- Si se necesita atención en el hogar, se informan a los servicios de VIH/SIDA.



Tratamiento Preventivo con Isoniazida

- Brindar TPI cuando el resultado del PPD es positivo ($\geq 5\text{mm}$), con radiografía del tórax y/o esputo negativo, no importa el recuento de CD4.
- Isoniazida 10–15 mg/kg (max 300 mg) una vez al día x 6–9 meses + piridoxina 50 mg una vez al día.

Actividades VIH/TB, 2007

- 198 de 701 (28%) nuevos casos coinfectados detectados
- 562 de 701 (80%) de los pacientes con TB sujetos a prueba para VIH
- 69 de 71 de los pacientes elegibles para ARV empezaron con TARV
- 744 pacientes con VIH tratados para LTBI



Tratamiento y atención de VIH

- Empezó en 2002 en la clínica del GUM.
- ARV de fabricación local.
- Expansión a 16 instalaciones de tratamiento en todo el país.
- A fines de septiembre de 2008, 2350 pacientes (157 de éstos niños) tomaban ARV y 1259 recibieron atención (primera y segunda línea, formulaciones adultas y pediátricas)
- Equipo móvil para regiones remotas
- Sistema nacional de seguimiento de pacientes
- Normas nacionales para el tratamiento de adultos y niños con ARV, 1^{era} revisión, inicio de CD 4
- Normas nacionales para el tratamiento de infecciones oportunistas, incluyendo la tuberculosis, 1^{era} revisión, Manejo de la TB.
- Apoyo a laboratorios, pruebas de CD4



Resumen

- Tamizaje de todos los pacientes con TB para VIH
 - CT rutinaria o voluntaria
- Tamizaje de todos los pacientes con VIH para TB
 - Historia
 - PPD
 - CXR
- Brindar profilaxis con cotrimoxazol a pacientes coinfectados con TB/VIH (no importa el CD4)
- Tratar a pacientes coinfectados según las normas
 - Considerar DOTS HAART
 - Asesoría para adherencia
 - Revisar al paciente para SE posible



Gracias

Guyana

