

A

Abogacía	Alcanzar el compromiso político de líderes y de las autoridades de salud, así como el de los individuos y/o grupos organizados.
Aborto	La expulsión o extracción de un feto o embrión que pesa menos de 500 gramos o cualquier otro producto de la gestación de cualquier peso o designación específica, independiente de su edad gestacional, tenga o no evidencia de vida y sea o no espontáneo o inducido.
Aborto habitual	tres o más abortos consecutivos.
Abruptio placentae	desprendimiento prematuro de la pared uterina de una placenta en posición normal, que se produce durante el embarazo en lugar de después del parto.
Absceso	acumulación de pus en una parte del organismo.
Absceso estéril	absceso que no contiene ninguna bacteria.
Abuso sexual	consiste en la participación de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar un consentimiento, o para la que por su desarrollo no está preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringe las leyes o los tabúes sociales. El abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad tiene lugar entre un niño/niña y un adulto/adulta, o bien entre niños/niñas y adolescentes, que por su edad o desarrollo tienen con él una relación de responsabilidad, confianza o poder. La actividad tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de la otra persona.
Acceso	vivir dentro de una distancia razonable (a menudo definido como 5 kilómetros). Tener acceso a un establecimiento de salud: estar viviendo dentro de una distancia razonable de un establecimiento de salud.
Aceptabilidad	relación entre las actitudes de los clientes hacia las características personales y profesionales de los que brindan la atención y respecto a la forma en que se les atiende.
Ácido desoxirribonucleico (ADN)	constituye el principal componente del material genético de la inmensa mayoría de los organismos, junto con el ARN. Es el componente químico primario de los cromosomas y el material en el que los genes están codificados. En las bacterias, el ADN se encuentra en el citoplasma mientras que en organismos más complejos, tales como plantas, animales y otros organismos multicelulares, la mayoría del ADN reside en el núcleo celular.

Ácido fólico	es una vitamina del complejo B que puede ayudar a prevenir defectos de nacimiento en el cerebro y la médula espinal denominados defectos del tubo neural.
Ácido ribonucleico (ARN)	es un ácido nucleico, polímero lineal de nucleótidos formando una larga cadena. El eje de la cadena lo forman grupos fosfato y azúcares ribosa de forma alternativa del que toma su nombre. Los nucleótidos del ARN contienen el azúcar ribosa y entre sus bases nitrogenadas al uracilo, a diferencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) cuyo azúcar es una desoxirribosa y contiene a la timina en vez del uracilo. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína final codificada por esos genes.
Acidosis	aumento de la acidez con disminución de la reserva alcalina en la sangre y los tejidos; estado metabólico donde hay aumento anormal de los cuerpos cetónicos.
Acrocianosis	coloración azulada únicamente de boca y/o extremidades.
Actividades	un grupo de tareas que tienen que hacerse para ejecutar las intervenciones de salud. Las actividades pueden estar en el hogar, la comunidad, establecimiento del primer nivel, los niveles de referencia. Las actividades pueden estar en una gama de áreas técnicas incluidas el desarrollo de recursos humanos (incluida capacitación); y el desarrollo de sistemas de salud.
Actores sociales	colectividades o sujetos con intereses, condiciones y características particulares que los identifican como tales, capaces de construir y llevar a cabo en forma conjunta, un proyecto de transformación social para el bienestar de una comunidad o territorio.
Adrenalina	es una hormona vasoactiva secretada en situaciones de alerta por las glándulas suprarrenales. Es una monoamina catecolamina, simpatomimética derivada de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Se utiliza para aumentar la tensión arterial y el ritmo cardíaco entre otras cosas.
Aerobios	Bacterias que requieren específicamente de oxígeno como aceptor de hidrógeno.
Aerosol	suspensión de partículas de polvo seco o líquido en el aire, para ser inhaladas en el interior de la vía respiratoria aprovechando el mecanismo de la respiración.
Aftas	úlceras de la boca.
Agente patógeno	un organismo o microorganismo que causa enfermedad.
AIEPI	Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.

Alergias	reacción inmunológica del organismo hacia ciertos alérgenos inhalados, tocados o deglutidos y se caracteriza por rinorrea, estornudos, erupción cutánea o dificultad respiratoria.
Aleteo nasal	movimiento de aleteo de las fosas nasales al respirar.
Algodoncillo	ver candidiasis bucal.
Alimentación activa	consiste en estimular a un niño a que coma, por ejemplo, sentándose con él y ayudándole a que lleve la cuchara a la boca.
Alimentación artificial	alimentación con sucedáneos de la leche materna.
Alimentación complementaria	el niño recibe leche materna o sucedáneos de la leche materna y comida sólida o semisólida.
Alimentación inadecuada	se refiere al porcentaje de la población cuyo consumo de alimentos cae por debajo del nivel mínimo de consumo de energía necesaria.
Alimentación suplementaria	cuando la alimentación materna ha sido substituida por otros alimentos o bebidas.
Alimentos semisólidos	alimentos que son en parte sólidos y en parte líquidos. Los alimentos blandos y húmedos como el atole espeso o la mazamorra son semisólidos.
Alojamiento conjunto	práctica ideal recomendada de tener al niño o niña junto con la madre después del parto, preferiblemente en la misma cama.
Ambiente térmico adecuado	ambiente ideal en que debe permanecer un recién nacido. Se considera adecuado entre 24 y 26° C sin corrientes de aire.
Analgésico	conjunto de fármacos, de familias químicas diferentes que calman o eliminan el dolor por diferentes mecanismos.
Análisis	se refiere a la descomposición de un todo en sus distintos elementos constituyentes, con el fin de estudiar éstos de manera separada, para luego, en un proceso de síntesis, llegar a un cabal conocimiento integral.
Anabolismo	proceso por medio del cual las sustancias simples se convierten en compuestos más complejos por acción de células vivientes.
Anamnesis	parte del examen clínico que reúne todos los datos personales y familiares del enfermo anterior a la enfermedad, así como la sintomatología actual que presenta.

Anemia	disminución de los niveles de hemoglobina en sangre. En los menores de 6 años de edad se considera anemia cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 9.3 g/dl. (hematocrito < 27%)
Anencefalia	ausencia de una gran parte del cerebro y el cráneo.
Anorexia	trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición.
Antibiótico	droga que mata bacterias o inhibe su crecimiento.
Antidiarreico	medicamentos que presuntamente detienen o aminoran la diarrea, como los medicamentos antimotilidad. Estos medicamentos no son útiles para los niños con diarrea. Algunos son peligrosos.
Antiemético	medicamento para controlar los vómitos.
Antiespasmódico	agente que cura o alivia el espasmo intestinal.
Antifolatos	medicamentos que actúan contra el folato. El cotrimoxazol (trimetoprima-sulfametoxazol) y la asociación antimalárica sulfadoxina-pirimetamina son antifolatos.
Antimalárico	cualquier droga que mata los parásitos de la malaria.
Antirretroviral	fármaco que se prescriben para tratar la infección por VIH. Otro nombre que se utiliza con frecuencia es TARGA, que significa Terapia Antirretroviral de Gran Actividad, y que implica tomar tres o más fármacos ARV combinados y constituye la forma habitual de tratar el VIH para la mayoría de personas.
Antropometría	es la medida del peso, talla y proporciones del cuerpo humano; se utiliza para determinar su estado nutricional.
Antropometrista	encuestador especializado en realizar las mediciones antropométricas de la niña o niño.
Anuria	supresión o disminución de la secreción de orina.
Apego	relación única entre dos personas, la cual es específica y duradera a pesar de una separación a través del tiempo.
Apgar familiar	instrumento ideado para proporcionar datos que indiquen la integridad de componentes importantes de la función familiar. Sus parámetros están delineados sobre la premisa que los miembros de la familia perciben el funcionamiento familiar y pueden manifestar el grado de satisfacción en el cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar: 1. Adaptación, 2. Participación, 3. Ganancia o crecimiento, 4. Afecto y 5. Recursos,

APGAR , puntaje de	método para cuantificar y resumir la respuesta del recién nacido al ambiente extrauterino y a la reanimación. Cada uno de los 5 signos es calificado con un valor de 0, 1 ó 2. Los 5 valores se suman y el total se convierte en el puntaje de APGAR.
Apnea	se considera apnea cuando en el recién nacido existe ausencia de la respiración espontánea por más de 20 segundos, acompañada de cianosis y bradicardia.
Aptitudes de comunicación	las aptitudes que se usan para enseñar y aconsejar a las madres, es decir: PREGUNTAR, ESCUCHAR, ELOGIAR, INFORMAR Y COMPROBAR LA COMPRESIÓN.
Artritis séptica	inflamación de una articulación ocasionada por invasión bacteriana.
Asma	enfermedad crónica de las vías respiratorias caracterizada por una obstrucción del flujo aéreo, reversible espontáneamente o con tratamiento. Ocurre inflamación y aumento de la reactividad de las vías aéreas a una variedad de estímulos (hiperreactividad bronquial). Clínicamente se expresa por episodios recurrentes de sibilancia, disnea, opresión en el pecho y tos.
Aspiración de meconio	inhalaación de líquido amniótico con meconio.
Asfixia perinatal	alteraciones metabólicas (acidosis) secundarias a la disminución del oxígeno en sangre y que produce secuelas neurológicas clínicas en el período neonatal inmediato.
Atención ambulatoria en el año	número de atenciones de salud, de todo tipo, realizadas en los establecimientos de atención ambulatoria, de toda afiliación institucional, en dicho año. Incluye la atención ambulatoria en los servicios de emergencia, consulta externa de hospitales, sanatorios, centros de salud, puestos de salud y consultorios médicos.
Atención de salud de calidad	el grado en que la atención de salud proporcionada satisface las expectativas o las necesidades de las personas.
Atención integrada	conjunto de acciones simultáneas que se proporcionan al menor de cinco años de edad en la unidad de salud, independientemente del motivo de consulta.
Atole	alimento hecho al hervir harina de cereal o leguminosas en leche o agua. El atole puede hacerse espeso, como una mazamorra o papilla, o líquido, como una bebida. Para la alimentación complementaria, el atole debe ser espeso.
Auditoría médica	es el análisis crítico sistemático de la calidad de la atención médica, incluyendo procedimientos diagnósticos y decisiones terapéuticas, el uso de recursos y los resultados de los mismos que repercuten en los desenlaces clínicos y en la calidad de vida del paciente.

AZT Zidovudina; medicamento utilizado para el tratamiento del paciente VIH positivo o con SIDA.

B

Bagaje conjunto de conocimientos o noticias de que dispone una persona: bagaje artístico, cultural.

Bajo peso al nacer (BPN) peso al nacer menor de 2.500 g independiente de su edad gestacional.

Bajo peso para la edad el peso del niño es menor que el promedio de peso que le corresponde para su edad.

BCG vacuna antituberculosa obtenida del Bacilo de Calmette-Guérin.

Bednets mallas de nailon, poliéster o algodón impregnados con, permethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Etofenprox, lambda cyhalothrin o Alpha cypermethrin que se utilizan para evitar la picadura de mosquitos o insectos transmisores de la malaria, dengue y otras enfermedades.

Biodisponibilidad que se digieren, absorben y utilizan por el organismo.

Bitot, manchas de signo de xeroftalmia por carencia de vitamina A; generalmente están presentes en ambos ojos y son de forma triangular en placas blancuzcas elevadas. Cuando se examinan de cerca se ven como una espuma fina con muchas burbujas pequeñas. Este material espumoso, pegajoso se puede retirar.

Bolsa auto inflable bolsa de reanimación para ventilar a recién nacidos que se llena espontáneamente después de que es comprimida, propulsando oxígeno o aire hacia la bolsa.

Bolsa inflada por flujo bolsa de reanimación para ventilar a recién nacidos (también llamada bolsa de anestesia) se llena sólo cuando recibe el oxígeno comprimido de una fuente.

Bradycardia disminución de la frecuencia cardiaca por debajo de la normalidad. Para un recién nacido < 120 por minuto; para un niño mayor <100 por minuto.

Braxton Hicks, contracciones de contracciones que comienzan a partir del quinto o sexto mes del embarazo o incluso antes, y se caracterizan porque abarcan todo el útero, tienen un gradiente descendente (van del fondo del útero hacia la vagina). No son dolorosas y sólo se siente que el abdomen se endurece y da una sensación de tensión abdominal cuando aparecen. Duran aproximadamente entre 30 y 60 segundos. Corresponden a un ejercicio del músculo uterino para prepararse para el día del parto.

Broncodilatador sustancias farmacológicamente activas que promueven la

	dilatación de los bronquios, son utilizados en crisis asmáticas.
Bronquiectasia	destrucción y ensanchamiento de las vías respiratorias mayores. Una persona puede nacer con esta afección (bronquiectasia congénita) o la puede desarrollar posteriormente en la vida.
Bronquiolitis	infección vírica de las vías respiratorias inferiores que por lo general es sumamente grave en los lactantes menores y se caracteriza por obstrucción de las vías respiratorias y sibilancias. La causa más importante es el <i>virus sincitial respiratorio</i> .
Bronquitis	inflamación de las principales vías aéreas hacia los pulmones. La bronquitis aguda generalmente sigue a una infección respiratoria, y afecta inicialmente la nariz, los senos paranasales y la garganta y luego se propaga hacia los pulmones.
Brucelosis	enfermedad causada por el contacto con animales de granja portadores de la bacteria <i>Brucella</i> .

C

Calidad	el grado en que el servicio prestado satisface las expectativas o las necesidades de los que usan o desean usarlo.
Calostro	primera leche de la madre que está amamantando, secretada en pequeñas cantidades. El calostro proporciona al bebé inmunidad para muchas infecciones.
Candidiasis oral	afección caracterizada por la presencia de úlceras o placas blancas por dentro de la boca y la lengua, causadas por una infección por levadura (<i>Cándida albicans</i>); también se conoce como algodoncillo.
Candidiasis cutánea	lesiones del área del pañal por <i>Cándida albicans</i> , con pústulas y vesículas que comienzan típicamente en la zona perineal y progresan hacia pliegues cutáneos con lesiones satélites que se diseminan al periné, genitales, zonas suprapúbicas, nalgas y cara interna del muslo.
Cánula nasal	tubos plásticos flexibles para la administración de oxígeno, que se adaptan a las fosas nasales y pueden ser fijadas por una banda elástica o en los pabellones auriculares.
Capacidad	la capacidad para cumplir una función dada en un entorno dado; el término puede aplicarse a los individuos pero se aplica más a las instituciones o las organizaciones. Capacidad puede aplicarse a una variedad de funciones (ej. técnica, logística).

Capurro, método de	método para determinar la edad gestacional de los recién nacidos. Utiliza cinco características físicas, cada una de las cuales tiene varias opciones y cada opción un puntaje, la suma de estos puntajes al final será lo que determina la edad gestacional.
Caput succedaneum	hinchazón edematosa de los tejidos blandos del cráneo que afecta a la porción presentada en el parto, puede acompañarse de una coloración equimótica general o localizada.
Casco cefálico	técnica para brindar oxígeno en una pequeña cámara que cubre toda la cabeza. Es el modo más eficiente y simple para brindar atmósfera enriquecida de oxígeno para un neonato que respira espontáneamente y quien cursa con insuficiencia respiratoria leve. Con este método se pueden ofrecer concentraciones de oxígeno que pueden llegar hasta el 100%.
Catéter nasal	dispositivo que se coloca a través del orificio nasal, para la administración de concentraciones bajas o moderadas de oxígeno.
Cefalea	dolor de cabeza.
Cefalohematoma	hemorragia subperióstica, limitada siempre a la superficie del hueso craneal, no se acompaña de cambios de coloración en la epidermis y suele mostrarse en las primeras horas después del nacimiento.
Celulitis	es una infección que compromete la dermis y el tejido celular subcutáneo. Habitualmente la epidermis no se altera. La celulitis habitualmente tiene una puerta de entrada que puede ser una herida, una erosión, una mordedura o una picadura de insecto, o bien lesiones de varicela o piodermitis.
Cetoacidosis	complicación de la diabetes causada por la acumulación de subproductos del metabolismo de las grasas, llamados cetonas. Esto ocurre cuando no hay glucosa disponible como fuente de energía para el organismo y en su lugar se utiliza la grasa.
Choque	incapacidad del aparato circulatorio para mantener el riego sanguíneo adecuado de los órganos vitales. Es una afección potencialmente mortal que requiere tratamiento inmediato e intensivo.
Cianosis	coloración azulada de la piel.
Cianosis central	color azulada en todo el cuerpo y principalmente en la lengua y el interior de la boca.

Citotóxico	medicamentos que poseen la acción de una citotoxina y que tienen una acción tóxica específica sobre las células de órganos especiales.
Clasificación de grave	significa una enfermedad muy grave que requiere atención urgente y generalmente referencia o internación en un hospital. Las clasificaciones de grave se enumeran en las hileras de color rojo en el cuadro de <i>EVALUAR</i> y <i>CLASIFICAR</i> .
Clasificar	significa seleccionar una categoría de enfermedad y su gravedad (llamada clasificación) sobre la base de los signos y síntomas de un niño o niña.
Cobertura	es el factor que vincula la capacidad potencial de producción de servicios con la utilización efectiva de los servicios producidos, es decir que en este concepto se combinan el acceso y la utilización. Extensión geográfica que abarcan ciertos servicios.
Código	cuerpo de leyes que forman un sistema completo de legislación sobre alguna materia (ej. Código de Comercialización de la Leche materna).
Coma, estado de	es un trastorno en el cual la persona parece dormida, es incapaz de despertarse, sin reacción y sólo es capaz de responder a estímulos enérgicos con algunos reflejos de evitación. Cuando el coma es muy profundo no aparece ninguna respuesta al dolor.
Comité	es un conjunto de personas que con arreglo a las leyes o reglas de una organización, institución o entidad tienen establecidas determinadas competencias.
Competencia	conjunto de concepción y de acción que han de adquirir las personas formadas para poder tratar de manera adecuada situaciones sencillas y complejas que ellas mismas han de resolver en su profesión, es decir que las competencias reflejan las habilidades para tomar decisiones oportunas y demostrar eficacia, eficiencia y equidad para un alto nivel de rendimiento.
Complementariedad	cada miembro domina un tema determinado del proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante.
Comunicación	el proceso de intercambio o intercambio de la información entre dos o más personas por interacción interpersonal (cara a cara) o a través de los medios, como periódicos, radio o transmisiones de televisión, folletos o carteles, utilizando palabra o imágenes.
Comunicación social	se entiende generalmente al campo de estudio, principalmente, de las Ciencias de la Comunicación;

	también de la Psicología_social, Sociología, Semiótica, Lingüística, entre otras. En un principio, el concepto sólo se refería a la acción y efecto de los medios masivos de comunicación (o mass media). De este modo, su estudio se abocaba al análisis de la Radio_(medio_de_comunicación) y la television. Actualmente, como campo de estudio, implica los modos de construcción, transmisión, y percepción de la información como objeto cultural, y sus reglas de interacción y retroalimentación.
Comunidad	es el medio ambiente físico y social en el que se desenvuelven las actividades vitales de la población en medio de procesos de socialización y relaciones interpersonales.
Comunicación para el cambio social (CCS)	proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos.
Consenso	acuerdo, armonía, compromiso. Una decisión de grupo que todos los miembros acuerdan respaldar, a pesar de que pueda no reflejar totalmente las preferencias individuales. El consenso es posible cuando se han escuchado y examinado detallada y abiertamente distintos puntos de vista.
Conducción, pérdida calórica por	depende de la superficie corporal expuesta y el contacto directo con una superficie fría (mesas metálicas) o al sumergirlo en agua fría.
Confiabilidad	que sea estable y poco sensible a las imperfecciones; que varíe en relación con el fenómeno y no al azar.
Congestionamiento mamario	plétora. Congestión sanguínea fisiológica secundaria a la gran cantidad de sangre y de leche que está circulando por el pecho y que por falta de una succión temprana y continua, no es extraída.
Conjuntivitis	es la infección de uno o ambos ojos, generalmente con secreción purulenta debida a una infección o inflamación. Los agentes causante más comunes son bacterias, virus y clamidia.
Consejería	es el arte de establecer una relación entre la persona que orienta y otra que recibe, en la que no se trata de dar consejos o decirle a la persona lo que debe hacer, sino brindarle información y alternativas necesarias para que ella tome la mejor decisión.
Consenso	un acuerdo para apoyar una decisión tomada por el equipo; implica una voluntad de apoyar las medidas tomadas por el equipo.
Continuum	idea relacionada al desarrollo humano para el logro de un desarrollo emocional, físico y mental óptimos a través de su

	ciclo de vida.
Contracciones	endurecimiento del abdomen como consecuencia de la actividad del músculo uterino. Puedes percibir las si su intensidad supera los 10 mmHg, que es el tono que normalmente tiene el útero.
Contraindicación	situación, trastorno o enfermedad en la cual no debe usarse un tratamiento, procedimiento o medicamento determinado.
Contramedida	una solución propuesta al problema.
Contrareferencia	es el informe del médico especialista al que se requirió su opinión por medio de una referencia emitida por el personal de salud de un nivel inferior.
Control de calidad	metodología que utilizando diferentes instrumentos permite monitorizar la estabilidad (calidad) de un proceso o de suministro de un servicio, de forma que se detecte, cuanto antes, cualquier situación inadecuada; lo que permitirá eliminar las causas especiales de variabilidad en la obtención del resultado final.
Control prenatal	conjunto de actividades que se ejercen sobre la embarazada con la finalidad de obtener el mejor grado de salud y resultado de ésta y de su hijo.
Convección, pérdida calórica por	se produce cuando hay diferencia de temperatura entre la superficie corporal y el aire que la rodea.
Convulsiones	cambio súbito en el comportamiento con movimientos anormales del cuerpo y/o extremidades, provocado por una excesiva actividad eléctrica en el cerebro.
Cooperación	la ayuda, auxilio o socorro que se presta para el logro de algún proyecto.
Coordinación intersectorial	mecanismos de coordinación entre sectores e instituciones para la definición conjunta de políticas de salud y para la solución concertada e integral de las mismas
Corioamnioitis	infección de la cavidad amniótica, que puede ir acompañada de una Ruptura Prematura de Membranas o con el saco amniótico completo.
Coriza (resfriado)	infección vírica común, de curación espontánea que requiere sólo atención de sostén.

CPAP	ver presión positiva continua.
Crecimiento	desarrollo del ser vivo, que comprende, en el caso del hombre, el desarrollo somático y psíquico. No es un proceso uniforme, sino que en determinadas épocas lleva un curso más acelerado que en otras.
Crecimiento fetal intrauterino	patrón de crecimiento fetal desde la concepción hasta el nacimiento.
Crisis	episodio agudo de sibilancia.
Cromosoma	en citología, nombre que recibe una diminuta estructura filiforme formada por ácidos nucleicos y proteínas presente en todas las células vegetales y animales. El cromosoma contiene el ácido nucleico, ADN, que se divide en pequeñas unidades llamadas genes. Éstos determinan las características hereditarias de la célula u organismo. Las células de los individuos de una especie determinada suelen tener un número fijo de cromosomas, que en las plantas y animales superiores se presentan por pares. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas.
Crónico	que dura mucho tiempo o reaparece con frecuencia.
Crup	obstrucción de las vías respiratorias superiores producido por virus y que se caracteriza por fiebre, voz ronca, tos perruna y estridor.
Cuidados esenciales neonatales	atención preventiva básica a todos los recién nacidos, especialmente la atención de calor, aseo, lactancia materna, cuidado de cordón y ojos y las inmunizaciones.
Cuidados paliativos	conjunto de omisiones terapéuticas que buscan poner término a un sufrimiento y por ningún motivo debe confundirse con la muerte asistida o la eutanasia. Es una filosofía que encierra el concepto de morir con dignidad, que debe ocurrir en su momento, sin acelerarla, pero tampoco alargarla inútilmente y de una forma cruel.
Cuidado prenatal	Cuidado durante el embarazo que provee cuidado preventivo esencial o tamizaje de complicaciones.

D

Daño	es el resultado no deseado en función del cual se mide un riesgo.
Dengue	es una enfermedad febril de comienzo súbito, epidémica de origen vírico y transmitida por el mosquito <i>Aedes aegypti</i> .
Depleción	disminución de la cantidad de líquidos y/o electrolitos o del depósito de vitaminas liposolubles.

Desarrollo	serie de cambios que experimenta el ser vivo desde su concepción hasta su madurez.
Desempeño	considera lo que la persona tiene que hacer en su lugar de trabajo; las condiciones en que ocurre éste trabajo o desempeño, y el nivel de desempeño o calidad aceptable. Utiliza soluciones múltiples, de las cuales la capacitación es solo una de las posibilidades.
Descentralización	consiste en el traspaso del poder y toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización. Supone transferir el poder de un gobierno central a autoridades no jerárquicamente subordinadas.
Deshidratación	disminución de la concentración de agua en los espacios intra y extracelular.
Desnutrición	conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y antropométricas causadas por la deficiente ingesta y/o aprovechamiento biológico de macro y micronutrientes ocasionando la insatisfacción de requerimientos nutricionales.
Destete	proceso gradual de agregar a la leche materna otros alimentos y se conoce como destete total cuando el niño o niña ya no recibe leche de la madre.
Desviación estandar	medida de dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la <u>estadística descriptiva</u> . Es una medida (cuadrática) de lo que se apartan los datos de su media, y por tanto, se mide en las mismas unidades que la variable.
De término	expresión que se usa para describir a un bebé nacido después de 37 semanas de embarazo.
Diarrea	tres o más deposiciones sueltas o acuosas en un período de 24 horas.
Diarrea aguda	pérdida diaria de tres o más deposiciones líquidas o semilíquidas que puede prolongarse por varios días, generalmente menos de catorce.
Diarrea crónica	enfermedad diarreica que ha persistido por 14 días o más que no se origina de un proceso agudo.
Diarrea persistente	enfermedad diarreica que ha persistido por 14 días o más después del comienzo agudo.
Dificultad respiratoria	malestar que experimenta un niño o niña debido a que no recibe suficiente aire en los pulmones; comprende toda forma inusual de respirar.
Difteria	enfermedad bacteriana aguda de las amígdalas, faringe, laringe y de otras membranas mucosas de la piel. La lesión causada por la liberación de una citotoxina específica se caracteriza por una o varias placas de membranas grisáceas adherentes, con inflamación a su alrededor.

Disentería	enfermedad diarreica aguda caracterizada anatómicamente por lesiones inflamatorias, ulcerosas y gangrenosas del intestino grueso y porción distal del íleon. Sintomáticamente se caracteriza por evacuaciones frecuentes de materias acuosas y sanguinolentas, dolor abdominal y tenesmo.
Disfunción	alteración cualitativa de la función de un órgano.
Disnea	es la sensación subjetiva de dificultad respiratoria o falta de aire.
DPT	vacuna contra difteria, tos ferina y tétano.
E	
Eclampsia	consiste en la aparición de convulsiones y/o coma en una embarazada o púérpera con signos de preeclampsia.
Edad gestacional	número de semanas completas de embarazo partiendo desde el último período menstrual de la madre. La edad gestacional también puede ser evaluada por examen de las características físicas del recién nacido.
Edema	hinchazón debida a la acumulación excesiva de líquido bajo la piel. El edema ocurre generalmente en las piernas y los pies, a veces en otros sitios.
Efectividad	capacidad de emprender las intervenciones correctas para producir un resultado deseado.
Eficiencia	capacidad de hacer las intervenciones de la manera correcta, dando lugar a servicios de alta calidad.
Egresos hospitalarios	es la salida formal de un paciente hospitalizado por terminación del período de hospitalización, sea por defunción, regreso a su domicilio o transferencia a otra institución.
Electrolitos	sustancias químicas disueltas en el líquido celular que proporcionan elementos químicos inorgánicos para las reacciones celulares.
Embarazo de alto riesgo	es aquel en que la madre, el feto y/o neonato tienen una mayor probabilidad de enfermar, morir o padecer secuelas antes o después del parto.
Embarazo ectópico	embarazo anormal que ocurre por fuera del útero. El bebé no puede sobrevivir en estos casos.
Empatía	sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra: la empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás.
Empiema	es una acumulación de pus en el espacio pleural (la cavidad

	entre el pulmón y la membrana que lo rodea).
Empoderamiento	un proceso mediante el cual las personas asumen más control de su propio bienestar, incluyendo las prácticas de salud y servicios.
Encefalocele	anomalía en la cual una porción del cerebro prolapsa a través de un agujero en la línea media del cráneo (generalmente occipital), pero también puede encontrarse en la región nasal.
Endemia	enfermedad, generalmente infecciosa, que predomina constantemente en épocas fijas en ciertos países por influencia de una causa local especial.
Enfermedad bronco obstructiva	enfermedad crónica con obstrucción del flujo aéreo; puede ocurrir broncoespasmo asociado a inflamación, pero es resultante de una causa no alérgica. Presenta un cuadro clínico muy similar al asma.
Enfermedad de membrana hialina	función respiratoria inadecuada debido a la falta de producción y liberación de surfactante al interior de los alvéolos y como consecuencia dificultad respiratoria grave.
Enteropatógeno	gérmenes con la capacidad de causar infección en el sistema gastrointestinal.
Enterorragia	evacuación de sangre rutilante en abundante cantidad.
Enterotoxina	sustancia secretada por bacterias patógenas que producen efectos tóxicos al sistema gastrointestinal que da origen a diarrea de tipo secretoria.
Enzima	sustancia orgánica soluble que actúa como catalizador en los procesos de metabolismo.
Epidemia	enfermedad, generalmente infecciosa, accidental y transitoria que ataca al mismo tiempo y en el mismo país o región a gran número de personas.
Epidemiología	es el estudio de la distribución, la frecuencia y los factores determinantes de los problemas de salud en las poblaciones definidas. La aplicación de las herramientas epidemiológicas y los conceptos puede usarse para ayudar a los directores del programa a la comprensión y el abordaje de importantes problemas de salud.
Epidermólisis bulosa (ampollar)	grupo de enfermedades hereditarias en las que se desarrollan ampollas en la piel como respuesta a un trauma menor.
Epinefrina	ver adrenalina.
Epistaxis	hemorragia originada en las fosas nasales o en los senos paranasales, o de ambos simultáneamente.

Equidad	tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es lo justo en plenitud; acceso igualitario a los medios de producción y distribución de los servicios de salud.
Equimosis	coloración azulada de una parte del cuerpo, secundaria a traumatismo o problemas de coagulación sanguínea; un área de sangrado muy grande.
Equipo	un grupo de estudio con alto desempeño cuyos miembros son interdependientes y comparten los objetivos de desempeño comunes y cuya finalidad es mejorar la calidad de los productos y servicios.
Eritema tóxico	condición benigna del recién nacido caracterizada por una pápula de color blanquizca a amarillenta en el centro circundada de piel enrojecida. Dicha pápula aparece temporalmente durante varias horas o días y luego desaparece.
Erradicar	arrancar de raíz, eliminar completamente algo, que se considera perjudicial o peligroso: erradicar una plaga, un mal social, una enfermedad.
Escarlatina	enfermedad causada por una infección de la garganta con bacterias estreptocócicas beta hemolíticas del grupo A.
Esencial	necesario. Las vitaminas y los minerales esenciales (como la vitamina A y el hierro) son los que se necesitan para la buena salud.
Espaciador	artefacto diseñado para favorecer la penetración del fármaco en las vías respiratorias y disminuir los efectos colaterales locales, principalmente los atribuidos a los corticosteroides inhalatorios.
Especificidad	mide la proporción de aquellos que no padecen la enfermedad denominados correctamente sin la enfermedad con el empleo del signo.
Esplenomegalia	crecimiento anormal del bazo.
Estable	que está igual, sin empeorar ni mejorar.
Establecimiento de salud de primer nivel	establecimiento, como un centro de salud, consultorio, puesto de salud rural, dispensario o departamento de consulta externa de un hospital, que se considera el primer establecimiento del sistema de salud adonde las personas acuden a buscar atención.
Estado de vacunas	comparación de las vacunas que un niño o niña ha recibido con el calendario de vacunación recomendado. El estado de vacunación describe si un niño ha recibido todas las vacunas recomendadas para su edad y, en caso contrario, cuáles son las que se necesitan en el momento de la consulta.

Estímulo	todo aquello que provoca una reacción funcional.
Estrategia	es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para lograr un determinado fin.
Estridor	sonido áspero que se produce cuando el niño inspira; se produce ante la inflamación de la laringe, traquea o epiglotis.
Etnicidad	categoría social, no biológica, referida a grupos sociales, a menudo con ascendencia y herencia cultural compartidas, que se forman como consecuencia de sistemas opresores de las relaciones entre las razas, justificados por la ideología, en los que un grupo se beneficia del dominio que ejerce sobre otros grupos, y se define a sí mismo y a los otros a través de esa dominación y de la posesión de características físicas selectivas y arbitrarias.
ETS	enfermedad de transmisión sexual.
Evaluación	la comparación de un indicador de resultado a un objetivo prefijado; medir el resultado de las intervenciones en la salud de la población (ej. índice de mortalidad neonatal) según los objetivos fijados anteriormente.
Evaluación de la alimentación	proceso consistente en hacer preguntas para informarse de la alimentación usual de un niño y de la alimentación durante una enfermedad.
Evaporación, pérdida calórica por	al nacimiento el agua de la piel del recién nacido se evapora y como resultado su cuerpo pierde calor.
Explotación	utilización de menores en el trabajo o en otras actividades en beneficio de otras personas. Esto incluye, aunque no se limite a ello, el trabajo infantil y la prostitución infantil. Estas actividades van en detrimento de la salud física y mental del niño o niña, de su educación o de su desarrollo espiritual, moral o socio-emocional.
Exudado	conjunto de elementos extravasados en el proceso inflamatorio, que se depositan en el intersticio de los tejidos o cavidades del organismo. Provoca el edema inflamatorio, diferenciándose del trasudado por la mayor riqueza de proteínas y células.

F

Facilitador	persona que ayuda a los participantes a aprender las aptitudes que se requieren y que se presentan en un curso o taller.
Factibilidad	que se cuente con el registro de los datos necesarios para confeccionarlos; que los datos sean fáciles de transformar en el indicador.

Factor de riesgo	es toda característica asociada a una probabilidad mayor de sufrir un daño.
Fecha probable de parto (FPP)	al primer día de la última menstruación se le agregan 7 días y se retroceden 3 meses, lo que nos proporciona la FPP.
Feminismo	es un conjunto de teorías sociales y políticas prácticas en abierta crítica de relaciones sociales pasadas y presentes, motivadas principalmente por la experiencia femenina. En general, el feminismo invoca una crítica a la desigualdad entre mujeres y hombres, y proclama la promoción de los derechos e intereses de la mujer.
Fenilcetonuria	enfermedad hereditaria, lo cual significa que se transmite de padres a hijos. Ambos padres deben pasarle al niño el gen defectuoso para que resulte afectado con la enfermedad, lo que se denomina un rasgo autosómico recesivo. La fenilcetonuria ocurre cuando una persona carece de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer la fenilalanina, uno de los ocho aminoácidos esenciales encontrados en los alimentos que contienen proteína.
Fibrosis quística	enfermedad genética que se caracteriza por mucosidad espesa de las glándulas exocrinas, cursando con neumonías a repetición. En el lactante es causa de tos crónica y sibilancias.
Fiebre	temperatura axilar igual o mayor 37,5 °C o temperatura rectal de 38 °C o más.
Fiebre reumática	enfermedad inflamatoria que se puede desarrollar después de una infección con bacterias estreptococos (como infección de garganta por estreptococos y escarlatina) y que puede comprometer al corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro.
Fiebre tifoidea	enfermedad producida por <i>Salmonella thypi</i> , que se presenta con fiebre aguda, choque e hipotermia.
Flaccidez	disminución del tono muscular.
Folato	vitamina hidrosoluble del complejo B.
Fontanela	es una zona del cráneo de un recién nacido que no está cerrada completamente por el hueso y en la que se nota el latido del bebé al tacto. Existen cuatro fontanelas en el cráneo: la <i>fontanela anterior o Bregmática</i> que normalmente se cierra antes del año y medio, la <i>fontanela posterior o lambda</i> (tiene forma de la letra lambda) es más pequeña y suele cerrarse antes de los 4 meses, la <i>fontanela esfenoidea</i> que cierra aproximadamente en 3 meses y la <i>mastoidea</i> que cierra en 2

	meses aproximadamente.
Frankfort, plano de	Línea imaginaria que sale del orificio del oído hacia la base de la órbita (hueso) del ojo. Indica la dirección de la línea de visión y la posición de la cabeza de la niña o niño durante los procedimientos para medir la talla (de pie) y la longitud (acostado)
G	
Garantía de calidad	es la medida de la provisión frente a las expectativas, con la clara intención de corregir cualquier punto débil demostrado.
Gastrosquisis	es un tipo de hernia. Los recién nacidos con esta condición presentan un agujero en la pared abdominal, usualmente en el lado derecho del cordón umbilical, y los intestinos se pueden observar con facilidad.
Genograma familiar	es una representación gráfica de una constelación familiar multi generacional (por lo menos tres generaciones), que registra información sobre los miembros de esa familia y sus relaciones. Su estructura en forma de árbol proporciona una rápida información de las complejas relaciones familiares y es una rica fuente de hipótesis sobre cómo un problema clínico puede estar relacionado con el contexto familiar y su evolución a través del tiempo.
Gestión	conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto.
Gingivorragia	sangramiento por las encías.
Globalización	es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.
Glucosuria	presencia de glucosa en la orina.
Gota gruesa	examen para detectar los Plasmodios en sangre. Se coloca una gota de sangre en un portaobjetos limpio y con la esquina de otro, se disemina la sangre hasta llegar a un diámetro de más o menos 1 cm. El espesor debe ser tal que permita leer a través de la preparación.
Graffar modificado, método de	consiste en un índice sumativo simple, conformado por cuatro indicadores, a saber: profesión del jefe(a) de la familia, grado de instrucción de la madre, fuente principal de ingresos de la familia y condiciones de alojamiento. Cada uno de estos indicadores posee cinco opciones de respuestas y a partir de

	las puntuaciones obtenidas con ellas, se clasifica a las familias en cinco estratos: I, II, III, IV y V.
Gram , coloración de	carácter taxonómico importante de las bacterias. Se correlaciona con muchas propiedades morfológicas y filogenéticas. Los microorganismos pueden ser grampositivos o gramnegativos. La base de la diferencia en la reacción de la coloración Gram radica en la estructura de la pared celular de la bacteria.
H	
Heimlich , maniobra de	maniobra utilizada para tratar a un niño o niña mayor que se atraganta. Consiste en situarse detrás del niño y colocar los brazos alrededor de su cuerpo; cerrar la mano formando un puño y ubicarla inmediatamente debajo del esternón del niño; poner la otra mano encima del puño y empujar hacia arriba en el abdomen.
Helminto	gusanos que atacan a los niños y niñas a través de varias especies parásitas de los nemátodos, tales como áscarides, oxiuros y tricocéfalos.
Hematemesis	expulsión de sangre por la boca, en forma de vómito, procedente del aparato digestivo.
Hematocrito	es el porcentaje del volumen total de sangre compuesto de glóbulos rojos.
Hematoma	es un área de decoloración de la piel que se presenta cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos y filtran sus contenidos dentro del tejido blando que se encuentra debajo de la piel.
Hematoma subgaleal	hemorragia masiva de los planos fasciales del cuero cabelludo. Se extiende por los espacios subaponeuróticos y diseca los mismos produciendo edema y equimosis de los párpados.
Hematuria	presencia de sangre en la orina.
Hemoglobina	proteína que contiene hierro; transporta el oxígeno y hace que la sangre sea roja.
Hepatomegalia	aumento del tamaño normal de hígado.
Hernia umbilical	saco de tejido abdominal que sobresale a través del ombligo.
Hidrocefalia	exceso de líquido del sistema ventricular, acompañado frecuentemente por hipertensión. Su etiología puede ser por producción excesiva de líquido o por interrupción de la circulación normal del líquido en cualquier lugar de su

	trayecto.
Hidrops fetalis	anemia severa, ascitis y edema generalizado en el feto, secundario a enfermedad hemolítica.
Hipercalcemia	calcio sérico total > 11 mg/dL.
Hiperglicemia	niveles de glucosa en sangre > 125 mg/dL o glucosa en plasma > 150 mg/dL.
Hiperkalemia	aumento de la concentración sanguínea de potasio (> 6 mEq/L), debido al déficit de agua corporal en relación con la concentración total de potasio.
Hipermagnesemia	elevación de la concentración de magnesio en sangre (> 2.8 mg/dL).
Hipernatremia	concentración elevada de sodio en la sangre (>145 mEq/L), debido al déficit de agua corporal en relación con la concentración de sodio.
Hiperosmolar	solución cuya concentración es mayor a la osmolaridad del plasma (> 300 mOs/L).
Hipertonicidad	solución cuya concentración de sodio es mayor a la de la sangre (>150 mEq/L).
Hipertónico	tono muscular aumentado.
Hipertrófico	recién nacido grande para su edad gestacional, es decir, por encima del percentilo 90o de las curvas de crecimiento intrauterino.
Hipocalcemia	disminución de la concentración de calcio en sangre (< 7.3 mg/dL).
Hipokalemia	disminución de la concentración sanguínea del portasio (< 4.5 mEq/L).
Hipotónico	sin tono muscular, flácido.
Hipoglicemia	disminución de la concentración de azúcar en la sangre (< 40 mg/dL), por debajo del valor normal; también llamada hipoglucemia.
Hipomagnesemia	disminución de la concentración de magnesio en sangre (< 1.5 mg/dL).
Hipotermia	temperatura corporal baja (temperatura axilar por debajo de 36,5°C).
Hipotonica	solución cuya concentración de sodio es menor a la de la sangre (< 130 mEq/L).

Hipovolemia	disminución del volumen sanguíneo debido generalmente a pérdida de líquidos o sangre.
Hipoxemia	disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre (PaO ₂).
Hipoxia	disminución de la presión parcial de oxígeno en el espacio pulmonar (PAO ₂), es decir, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso.
Hospital	es cualquier establecimiento de salud con personal médico organizado y camas disponibles para hospitalización continua de pacientes formalmente admitidos para observación, cuidado, diagnóstico o tratamiento médico, quirúrgico y no quirúrgico.

I

Iatrogenia	efecto secundario producido por el médico o el medicamento.
Ictericia	se refiere al color amarillento de la piel y la esclerótica (el blanco del ojo) provocado por un exceso de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es el producto resultante de la descomposición normal de los glóbulos rojos.
Ictericia fisiológica	se produce principalmente debido a inmadurez hepática del recién nacido, que retarda la formación de cantidades suficientes de la enzima glucoronil transferasa, que convierte la bilirrubina de reacción indirecta y difícil de eliminar, a la forma directa por glucoronización y fácil de ser eliminada.
IgA secretoria	inmunoglobulina A secretoria. Muy abundante en la leche materna y mucosas de órganos que confiere defensas contra infecciones.
Íleo paralítico	obstrucción intestinal que tiene como causa la parálisis de la túnica muscular del intestino.
Impacto	efecto sobre la población para reducir el resultado indeseable (ej. muerte).
Impétigo	es la infección de piel más común en niños cuya lesión típica se inicia con una pápula eritematosa en un área lesionada o una lesión producida por un insecto. La lesión puede evolucionar rápidamente de una pequeña vesícula hasta alcanzar 1 o 2 centímetros de diámetro y consiste en una placa de costras central rodeada de un eritema marginal discreto.
Impétigo buloso	se caracteriza por la presencia de bulas superficiales con paredes delgadas, de un diámetro que van desde 0.5 a 3 centímetros. Puede existir un halo de eritema alrededor de la base de las lesiones individuales. Las toxinas epidermolíticas estafilocócicas son las responsables del mecanismo de

	producción de las bulas.
Incidencia	el número de nuevos casos de una enfermedad o una persona que está enferma en un período dado.
Incompatibilidad ABO	la ictericia por enfermedad hemolítica debida a incompatibilidad ABO se produce sin sensibilización previa, porque las madres del grupo sanguíneo "O" poseen ya aglutininas "A" y "B" , las cuales pueden atravesar la barrera placentaria y ponerse en contacto con los eritrocitos A ó B del recién nacido.
Incompatibilidad Rh	la ictericia por enfermedad hemolítica debida a incompatibilidad del factor Rh, se produce por transmisión de sangre incompatible desde la circulación fetal a la materna. Los anticuerpos producidos por la madre pasan a través de la placenta y llegan al feto, en el que se inicia el proceso hemolítico. En este caso la madre es del grupo Rh negativo y el recién nacido Rh positivo.
Indicador	número, proporción, porcentaje o tasa que sugiere o indica los logros del programa.
Índice de Desarrollo Humano (IDH)	es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer), educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria) y nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita en USD)
Infección aguda de oído	un oído que haya supurado por menos de dos semanas.
Infección crónica de oído	un oído que ha supurado por dos semanas o más.
Infección respiratoria aguda	infección aguda de oído, nariz, garganta, laringe, traquea, bronquios, bronquiolos o pulmones.
Infección respiratoria aguda inferior	infección aguda de la epiglotis, laringe, traquea, bronquios, bronquiolos o pulmones.
Infección respiratoria aguda superior	infección aguda de nariz, faringe (garganta) u oído medio.
Infecciones locales	infecciones que están ubicadas solamente en un lugar determinado del organismo, por ejemplo, en el ojo o en la boca.

Infecciones oportunistas	infecciones causadas por microorganismos contra las cuales el sistema inmunitario del organismo normalmente es capaz de luchar. Cuando se debilita el sistema inmunitario, como en el SIDA, pueden presentarse infecciones oportunistas. Por ejemplo, en una persona sana hay microorganismos en la boca que normalmente no causan infección; sin embargo, en una persona con un sistema inmunitario debilitado, estos mismos microorganismos pueden causar candidiasis bucal.
Infusión	introducción terapéutica de un líquido, por ejemplo una solución salina fisiológica, en una vena.
Ingurgitación	trastorno en el cual las mamas de la mujer que amamanta se hinchan, se endurecen y duelen porque están demasiado llenas de leche.
Inhaladores presurizados (IP)	cristales del fármaco en fase líquida, disueltos en un medio que contiene generalmente un propelente fluorocarbonado (freon) a una presión de 2 a 3 atmósferas. La liberación del propelente, que se convierte en aerosol al entrar en contacto con la atmósfera, arrastra las partículas disueltas del principio activo y alcanza la vía aérea.
Inmunodepresión	depresión inmunitaria
Inmunoglobulinas	son proteínas anticuerpo altamente específicas que son producidas en respuesta a antígenos específicos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son producidos por los linfocitos B en su forma unida a la membrana. Este anticuerpo unido a la membrana constituye el receptor de antígenos de la célula B. Los linfocitos B secretan anticuerpos sólo tras su diferenciación, inducida por la interacción del antígeno con el anticuerpo de membrana de este tipo celular. Esta interacción constituye la fase de reconocimiento de la inmunidad. Se han identificado nueve clases químicamente distintas de inmunoglobulinas humanas: cuatro tipos de IgG y dos tipos de IgA, además de IgM, IgE e IgD.
Instrumento	material diseñado para ser empleado en una actividad concreta.
Insumo	el financiamiento, materiales o recursos humanos que deben movilizarse y aplicar apropiadamente para llevar a cabo las actividades esenciales. Estos recursos deben usarse de la manera propuesta y según lo previsto.
Integrabilidad	que sea capaz de satisfacer la diversidad de necesidades de salud que tiene la población en general.
Intervalo intergenésico	Es el período comprendido entre la finalización del último embarazo (parto o aborto) y el inicio del actual.
Intervención	enfoque técnico que se requiere para implementar una actividad a nivel de campo. (ej. inmunizaciones).

Investigación	es la recolección sistemática, análisis e interpretación de los datos para responder a una pregunta o solucionar un problema.
Involucramiento	Proceso por medio del cual, tanto la gente como los grupos ejercen su derecho a jugar un papel activo, asegurando condiciones para mantener mejor su salud y apoyar el empoderamiento.
Isoosmolaridad	sustancias cuyas presiones osmóticas son iguales.
Isotonicidad	solución cuya concentración de sodio es igual a la de la sangre, por lo que no produce hemólisis (130-150 mEq/L).
Isquemia	cese de la circulación arterial y por consiguiente de la perfusión de los tejidos irrigados por ésta.

K

Kaposi, sarcoma de	tumor canceroso del tejido conectivo, a menudo asociado con el SIDA.
Kramer, zonas de ictericia	método para determinar la gravedad de la ictericia en recién nacidos, utilizando 5 zonas de referencia que van de la cabeza (zona 1) a las plantas y palmas (zona 5). Un recién nacido en zona 3 tendrá aproximadamente 12 mg/dl de bilirrubinas.
Kwashiorkor	desnutrición severa caracterizada por edema importante como consecuencia de alimentación deficiente de proteínas.

L

Lactancia materna exclusiva	consiste en dar a un niño solo la leche materna y ningún otro alimento, ni tampoco agua u otros líquidos (con excepción de medicinas y vitaminas, si es necesario).
Lactante	niña o niño de 0 a 12 meses de edad.
Lactosa	azúcar presente en la leche.
Leche madura	leche menos espesa, rala y azulada que aparece a lo largo de la segunda semana de lactancia y que contiene todos los nutrientes que el niño o niña necesita para crecer.
Leches para alimentación del lactante	productos concentrados de leche de vaca o soya (que se combinan con agua) y se venden como sucedáneo o sustituto de la leche materna.
Letargia	es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de cansancio.

Liderazgo	capacidad o habilidad de dirigir.
Local	que se presenta o encuentra en la zona geográfica correspondiente. Por ejemplo, los alimentos locales son los que se encuentran en la zona donde vive el paciente.
Longitud	medida desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones) cuando la niña o niño se mide en posición supina.
Longitudinalidad	es el seguimiento de los distintos problemas de salud de un paciente por el mismo personal.
M	
Madre canguro	modalidad en el egreso temprano del niño prematuro o de bajo peso al nacer, convirtiendo a la madre en una incubadora humana al cuidado integral de su hijo en el hogar.
Mal llenado capilar	si la piel presionada tarda más de 2 segundos en recuperar su color.
Malaria	enfermedad parasitaria que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos <i>anofeles</i> infectados. En los humanos, los parásitos (llamados esporozoítos) migran hacia el hígado, donde maduran y se convierten en merozoítos, los cuales penetran el torrente sanguíneo e infectan los glóbulos rojos. Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos que, al cabo de 48 a 72 horas, se rompen e infectan más glóbulos rojos. Los primeros síntomas se presentan por lo general de 10 días a 4 semanas después de la infección, aunque en ocasiones se pueden presentar en un lapso de 8 días hasta 1 año después. Los síntomas de la enfermedad ocurren en ciclos de 48 a 72 horas.
Maligno	adjetivo que se aplica a las enfermedades o afecciones que muestran tendencia a difundirse y dar lugar a la muerte.
Maltrato	toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o niña en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
Maltrato físico	toda forma de agresión no accidental infligida al niño o niña producida por el uso de la fuerza física.
Maltrato psicológico o emocional	daño que de manera intencional se hace contra las actitudes y habilidades de un niño o niña; afecta su autoestima, su capacidad de relacionarse, la habilidad para expresarse y

	sentir, deteriora su personalidad, su socialización y, en general afecta al desarrollo armónico de sus emociones y habilidades.
Manejo	proceso por el cual se planifica, ejecuta y evalúa una respuesta organizada a un problema de salud.
Marasmo	desnutrición grave caracterizada por emaciación de tejidos magros y ausencia de tejido muscular que le da la apariencia de anciano.
Mastitis	inflamación de la glándula mamaria.
Mastoiditis	inflamación o infección del hueso mastoides.
Maternidad segura	significa crear las circunstancias en las que una mujer pueda elegir si se va a embarazar y, en todo caso, garantizar que reciba atención para la prevención y el tratamiento de las complicaciones del embarazo, tenga acceso a la atención calificada del parto, tenga acceso a la atención obstétrica de emergencias, si la necesita, y la atención después del nacimiento, a fin de evitar la muerte o las discapacidades por las complicaciones del embarazo y el parto.
Matriz germinal	sitio de formación de precursores neuronales y gliales , desde donde migran a la corteza cerebral. La matriz germinal es irrigada por un lecho vascular inmaduro, formado por vasos delgados e irregulares, el cual cambia y madura con el avance de la edad gestacional. La ruptura de estos vasos produce hemorragia intraventricular muchas veces fatal.
Meconio	líquido formado por una acumulación de desechos (células epiteliales cutáneas y gastrointestinales, lanugo, vórnix, líquido amniótico), tragados durante la vida fetal. Su cantidad varía entre 60 a 200 g., su color negro-verduzco oscuro lo obtiene de las sales biliares y es libre de bacterias.
Media aritmética	la media aritmética o promedio, de una cantidad finita de números, es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de sumandos.
Mediana	el valor que deja a cada lado (por encima y por debajo) la mitad de los valores de la muestra.
Medicamentos antimotilidad	medicamentos que disminuyen el avance del contenido intestinal mediante la reducción de la actividad muscular del intestino.
Medios masivos de comunicación	sistemas o instrumentos de comunicación como radio, televisión o periódicos, propuestos para llegar a la audiencia anónima, heterogénea y geográficamente dispersa a través de mensajes uniformes.
Mejoramiento de la	aumentando la capacidad de una institución local de prestar

capacidad	servicios de calidad asignados al entorno local; incluye la evaluación del desempeño y estrategias proyectadas para mejorar la competencia del personal, las logísticas de suministro y otros factores determinantes de la atención de calidad.
Melena	evacuación de heces mezcladas con sangre o meconio, generalmente secundaria a hemorragia superior o aspiración de sangre materna durante el parto. Las heces son oscuras o negras.
Meningitis	afección grave en la cual el líquido cefalorraquídeo y las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal se infectan.
Meningocele	lesión de la médula espinal cuyas protuberancias se hallan cubiertas únicamente de meninges y líquido cefalorraquídeo, en otros tejido nervioso heterotópico y en la mayoría hernias de la médula espinal subyacente.
Meta	una afirmación generalmente amplia que guía la visión general para un programa.
Metas del milenio	ocho metas básicas de desarrollo que todos los países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordaron en septiembre de 2000, con la aspiración de alcanzarlas en 2015.
Microcefalia	tamaño de la cabeza (distancia alrededor de la parte superior de la cabeza) significativamente inferior a la media normal para la edad y el sexo de un niño o niña, sobre la base de tablas estandarizadas.
Micronutriente	nutriente esencial que debe ser provisto por la dieta debido a que no son sintetizados por el organismo.
Mielomeningocele	lesión de la médula espinal que involucra tejido nervioso.
Milium	manchas blanquecinas del tamaño de una cabeza de alfiler y son realmente diminutos quistes de retención sebáceos los cuales pueden ser palpados con el dedo. Generalmente se encuentran alrededor de la nariz y de la barbilla; desaparecen alrededor de la primera semana de vida.
Mineral	es un cuerpo producido por procesos de naturaleza inorgánica, generalmente con una composición química definida y, si se forma en condiciones favorables (espacio, tiempo y reposo adecuados), una estructura atómica definida que se expresa en su forma cristalina y otras propiedades físicas características. Suele presentarse en estado sólido y cristalino a la temperatura media de la Tierra, aunque algunos, como el agua y el mercurio, se presentan en estado líquido.
Módulo	cursos individuales que constan de varias horas de aprendizaje y que se espera sean aprendidos por un

	estudiante.
Mola hidatiforme	resulta de la sobreproducción de tejido que se supone forma la placenta, la cual normalmente le brinda alimento al feto durante el embarazo. En esta afección, los tejidos se desarrollan formando un tumor anormal, llamado masa, y con frecuencia no existe un feto en absoluto. La causa de este trastorno no se ha comprendido completamente, pero existen algunas causas potenciales como anomalías en el óvulo, problemas dentro del útero o deficiencias nutricionales.
Moniliasis	ver candidiasis.
Monitoreo	sistema en curso de la recopilación de datos y seguimiento que proporciona a un director del programa la información para el manejo de la toma de decisiones.
Morbilidad	estudio de los efectos de una enfermedad en una población en el sentido de la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Mortalidad	término demográfico que designa un número proporcional de muertes en una población y tiempo determinados.
Mortinato	es el nacimiento de un feto que pesa más de 500 gramos y que no tiene evidencia de vida después de nacer.
Mucoviscidosis	ver fibrosis quística.
Muerte materna	es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual fuera la duración y sitio del embarazo, debida a complicaciones del embarazo, parto y puerperio, pero no por causas accidentales o incidentales.
Muerte neonatal	un recién nacido vivo que fallece antes de los 28 días de vida
Multidisciplinario	que comprende varias disciplinas o materias
Multigesta	mujer que ya tuvo otras gestaciones.
Muy bajo peso al Nacer (MBPN)	corresponde a los recién nacidos con peso al nacimiento menor de 1,500 gramos independiente de su edad gestacional.

N

Nabarro, metodología de	clasificación del estado nutricional a través de la utilización de un gráfico coloreado en el cual se coloca a la niña o niño de espaldas y dependiendo de su localización en el gráfico puede calcularse el porcentaje de adecuación nutricional y posteriormente la gravedad de su estado nutricional.
-----------------------------------	--

Nacimiento	es la extracción o expulsión completa de un feto, independientemente de que el cordón esté o no pinzado y de que la placenta esté o no adherida.
Nacimiento vivo	el nacimiento de un bebé con cualquier signo de vida independiente de su peso o edad gestacional.
Naegele, regla de	para calcular la fecha probable de parto, al primer día de la última menstruación se le agregan 7 días y se retrocede 3 meses.
Nebulizador	dispositivo que por diferentes sistemas genera aerosol al fragmentar el líquido en partículas.
Nebulizador de impacto	dispositivo que actúa basado en el principio de Ventura por el cual una corriente de aire o de oxígeno, cuando es proyectada a gran velocidad sobre una solución nebulizante, se rompe en pequeñas moléculas formando un aerosol. Cuanto mayor es el flujo, menor es el tamaño de las partículas generadas.
Neumonía	infección de los pulmones, acompañado de signos graves de dificultad respiratoria.
Neumotórax	acumulación de aire o gas en el espacio pleural que rodea a los pulmones.
Norma	un nivel acordado de desempeño para lograr un resultado particular.
Nosocomial	enfermedad adquirida dentro del hospital o una institución.
Numerador	el número absoluto de sucesos; la parte superior de una fracción.
Nutriente	sustancia presente en los alimentos que ayuda a que uno crezca y esté sano, como proteínas, minerales y vitaminas.
Nutritivo	se dice de los alimentos que son ricos en nutrientes esenciales, entre ellos proteínas, vitaminas y minerales.

O

Objetivos	las afirmaciones acerca de los resultados a corto plazo esperados (3-5 años) de una intervención; los objetivos deben contribuir a la meta general y ser específicos, cuantificables, realizables, realistas y restringidos por el tiempo.
Oligodramnios	disminución de la cantidad de líquido amniótico.
Oliguria	disminución de la excreción urinaria.
Onfalitis	es una infección bacteriana aguda que rodea el anillo

	<p>umbilical y se caracteriza por presentar signos de enrojecimiento alrededor del muñón y tejido periumbilical, con o sin secreción purulenta. Puede ser el punto de origen de diseminación hematológica y finalmente septicemia.</p>
Onfalocele	<p>es un defecto congénito en el cual los intestinos del recién nacido u otros órganos abdominales sobresalen por fuera del cordón umbilical (área del ombligo).</p>
ONG	<p>organización no gubernamental.</p>
Opistótonos	<p>forma de espasmo tetánico de los músculos de la nuca y el dorso en el cual el cuerpo forma un arco apoyado por el occipucio y los talones.</p>
Ortolani, método de	<p>forma de establecer clínicamente el diagnóstico de luxación congénita de la cadera en el período neonatal, determinando la presencia de inestabilidad de las articulaciones.</p>
Osmolaridad	<p>medida usada para expresar la concentración total (medida en ósmoles/litro) de sustancias en disoluciones usadas en medicina. El prefijo "osmo-" indica la posible variación de la presión osmótica en las células, que se producirá al introducir la disolución en el organismo. En un organismo normal la concentración está alrededor de 300 mOs (miliósmoles).</p>
Osteomielitis	<p>es una infección del hueso, causada generalmente por la propagación de bacterias a través de la sangre. Sin embargo, algunas infecciones de hueso o articulaciones se originan en un foco de infección adyacente o en una lesión penetrante. Ocasionalmente, puede haber afectación de varios huesos o articulaciones. En los niños menores las causas más comunes son <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, <i>Streptococcus pneumoniae</i> o <i>Streptococcus pyogenes</i> grupo A; en los niños mayores de 3 años <i>Staphylococcus aureus</i> es la causa más habitual.</p>
Otitis	<p>infección aguda del oído, acompañada generalmente de dolor y fiebre. Los agentes causantes más frecuentes son <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Haemophilus influenzae</i> y <i>Moraxilla catarrhalis</i>.</p>
Otitis media aguda	<p>inflamación de la cavidad del oído medio detrás del tímpano, que dura menos de 14 días. El líquido se acumula y causa dolor por el aumento de la presión dentro de la cavidad. Cuando el tímpano se rompe, se elimina pus por el oído.</p>
Otitis media crónica	<p>si ha drenado pus del oído durante dos semanas o más.</p>
Otoscopía	<p>evaluación del oído utilizando un instrumento denominado otoscopio. Este procedimiento permite visualizar el conducto auditivo externo y en su fondo, la membrana del tímpano y con ello efectuar el diagnóstico por visión directa de distintas patologías.</p>

Oxigenoterapia	consiste en la administración de oxígeno a una presión de concentración superior a la que se encuentra en la atmósfera ambiental (21 torr) para corregir o atenuar la deficiencia de oxigenación o hipoxia.
Oxitócico	sustancias que producen la contracción del músculo uterino; se utilizan para provocar el parto, acelerar la involución uterina posparto y de esta manera disminuir la hemorragia.
Oxitocina	hormona encargada de las pequeñas células musculares (mioepiteliales) situadas alrededor de la glándulas del seno se contraigan y expriman la leche causando eyección.

P

Paciente ambulatorio	paciente que es atendido en forma externa y no se hospitaliza.
Palidez	disminución o ausencia de color en la piel. La palidez palmar es signo de anemia.
Paludismo	ver malaria.
Pandemia	epidemia extendida a muchos países, o que ataca a casi todos los individuos de una región.
Papilla	alimento que se da en forma de atole.
Partera	trabajadora de salud que ayuda a las mujeres en el parto y también puede proporcionar otras formas de asistencia sanitaria.
Partera Profesional	persona que, habiendo ingresado de manera regular a un programa de educación en partería debidamente reconocido en el país en que está ubicado,, ha terminado con éxito el curso prescrito de estudios en partería y ha adquirido las calificaciones que se exigen para obtener legalmente el registro y/o certificación para ejercer la partería.
Participación social	toda acción orientada directa o indirectamente a influir sobre las tomas de decisiones en asuntos sociales.
Parto prolongado	trabajo de parto por más de 12 horas.
Parto vertical	parto atendido en posición de pie.
Patógeno	productor o causante de enfermedad.
Pequeño para su edad gestacional	cuando el peso al nacimiento se encuentra por debajo del percentilo 10 de las curvas de crecimiento intrauterino.
Percentilo	cantidad que indica el porcentaje de una distribución que es menor que o igual a esa cifra. Por ejemplo el percentilo 25 indica el 25%.

Período neonatal	los primeros 28 días de vida; se divide en período neonatal temprano (< 7 días) y período neonatal tardío (de 7 a 28 días).
Peso al nacer	es la primera medida de peso de los fetos o recién nacidos obtenida dentro de la primera 48 horas después del nacimiento.
Peso para edad (P/E)	es un indicador de desnutrición global que se utiliza para monitorear el crecimiento. El bajo peso para la edad refleja dietas inadecuadas, períodos prolongados de enfermedad, entre otros.
Peso para talla (P/T)	refleja el estado nutricional actual; cuando es bajo indica que la masa muscular y la grasa corporal se encuentran disminuidos en relación a la talla.
Petequia	pequeña mancha en la piel formada por la efusión de sangre, que no desaparece por la presión del dedo.
Pinard, regla de	para calcular la fecha probable de parto, se le agregan 10 días y restan 3 meses al último día de la menstruación.
Plan A	tratamiento de la diarrea en el hogar, aumentando la ingesta de líquidos y seguir dando lactancia materna y alimentos.
Plan B	tratar la deshidratación leve con sales de rehidratación oral (SRO).
Plan C	tratar la deshidratación grave rápidamente con líquidos intravenosos.
Plan de acción	un plan para la ejecución de las actividades que indica quién, cuando, donde y con qué frecuencia se toman las medidas.
Planeación	el proceso de planeación, que en muchos países se utiliza como sinónimo de planificación, consiste básicamente en tomar decisiones por adelantado. El proceso de planeación es equivalente al proceso de toma de decisiones.
Policitemia	aumento en número de los valores normales de glóbulos rojos circulantes, con aumento de la hemoglobina y el hematocrito > 65%.
Porcentaje de embarazadas atendidas por personal capacitado	para un determinado año, número de mujeres gestantes que han recibido, por personal capacitado, al menos una atención de salud durante el embarazo expresado como proporción porcentual del total de nacidos vivos en dicho año.
Polhidramnios	aumento de la cantidad normal de líquido amniótico.
Porcentaje de partos atendidos por personal capacitado	para un determinado año, número de partos, independientemente de su lugar físico de ocurrencia, atendidos por personal capacitado expresado como

	proporción porcentual del número de nacidos vivos en dicho año.
Posición supina	acostado sobre la parte posterior del cuerpo (boca arriba)
Posicionamiento	conjunto de <i>beneficios</i> , los que se traducen a su vez, en un valor concreto para la audiencia objetivo o actor social.
PPD (tuberculina)	el Derivado Proteico Purificado (PPD, por sus siglas en inglés) es un antígeno que se utiliza para ayudar en el diagnóstico de la infección por tuberculosis. La infección por la bacteria que ocasiona la tuberculosis conlleva frecuentemente a una sensibilidad a estos antígenos.
Prácticas familiares clave	conjunto de 16 prácticas para el crecimiento y desarrollo infantil saludables, basadas en pruebas científicas y de la experiencia existente y que contribuyen a estimular el crecimiento físico y el desarrollo mental, prevenir enfermedades, brindar mejor asistencia domiciliaria e identificar precozmente cuándo buscar atención fuera del hogar.
Preeclampsia	consiste en la aparición durante el embarazo de hipertensión, edema y proteinuria.
Preguntas de verificación	preguntas que tienen el propósito de determinar lo que alguien ha comprendido y lo que necesita más explicación. Después de enseñarle a una madre cómo alimentar al niño, un trabajador de salud puede formular la pregunta de verificación: "¿Qué alimentos le dará a su hijo?".
Prelacteal	antes de la lactancia. Se aplica a la administración de otros líquidos al recién nacido antes de iniciar el amamantamiento.
Prematuro	que nació antes de las 37 semanas de gestación.
Presión Positiva Continua (PPC)	es aquella que brinda durante la inspiración y la espiración, presión continua a través de mascarilla facial, catéter nasal o por cánula endotraqueal. En general permite manejar presiones de 1 hasta 10 cm de H ₂ O, lo cual se puede lograr con el aparato de Gregory, o con cualquiera de las marcas de ventiladores neonatales que existen en el comercio.
Presupuesto	Asignación planificada de fondos en un período específico.
Pretérmino	<i>vease</i> prematuro.
Prevalencia	el número de casos de una enfermedad dada u otra afección en una población particular en un momento específico.
Prevención	preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar una cosa.
Primigesta	es la primera gravidez.

Priorización	proceso en el cual las intervenciones potenciales se examinan para seleccionar aquellas que son más eficaces, factibles y aceptables.
Proceso	Secuencia de pasos, tareas o actividades que transforman los insumos (materiales, equipo, información, etc.) en resultados o sea el producto o servicio creado en el desarrollo del proceso.
Prolactina	hormona que hace que las células glandulares del seno produzcan leche.
Protozoos	animales unicelulares móviles por medio de pseudópodos, flagelo o cilios
Proyecto	Plan y disposición detallados que se formulan para la ejecución de una idea.
Postérmino	nacimiento después de 42 semanas completas de gestación (294 días en adelante).
Problema	una brecha entre la manera que es y la manera deseamos que llegue a ser. Un problema de salud tiene que ser considerado tanto en una perspectiva epidemiológica como de la comunidad.
Proceso	serie de acciones u operaciones repetitivas y sistemáticas en las cuales los recursos se usan para desarrollar o entregar los productos o servicios.
Problemas de alimentación	diferencias que se aprecian entre la alimentación real de un niño y las recomendaciones sobre la alimentación que se presentan en el cuadro de <i>ACONSEJAR</i> , así como presencia de otros problemas, como dificultades al amamantar, uso de biberón, falta de alimentación activa o alimentación deficiente durante una enfermedad.
Proceso de manejo integrado de casos	proceso para el tratamiento de los pacientes por el cual se tienen en cuenta todos sus síntomas.
Promoción de la salud	se define como el proceso mediante el cual, los individuos y las comunidades, ejercen un mayor control sobre los determinantes de su salud para mejorar su calidad de vida.
Proporción	un tipo de razón en la cual el numerador está incluido en el denominador.
Proteína	sustancia presente en los alimentos y constituida por aminoácidos, que son necesarios para el crecimiento adecuado.
Proteinuria	elevación de proteínas en la orina.
Prueba de diagnóstico	prueba especial, como los análisis de laboratorio o radiografías, para determinar el tipo de enfermedad o la

		causa de esta.
Pulso carotídeo		el pulso que se palpa por encima de la arteria carótida, que discurren en su mayor parte a ambos lados del cuello y que irrigan tanto el cuello como la cabeza.
Pulso radial		el pulso que se palpa por encima de la arteria radial, que es el principal vaso sanguíneo en la muñeca, por fuera del pulgar.
Puntaje Z		(en unidades de desviación estándar) se refiere a cuán lejos y en qué dirección la media antropométrica se desvía de la mediana (promedio) de referencia.
Púrpura		áreas planas más grandes donde la sangre se ha acumulado debajo del tejido, hasta un centímetro en diámetro.
Pústula		pequeña elevación cutánea llena de pus, que se puede originar a partir de una vesícula o ampolla que se infecte aunque no siempre es de origen infeccioso.
Q		
Quejido		sonido grueso que se produce en cada espiración, secundario a un esfuerzo que realiza el niño o niña para compensar algún problema respiratorio o una enfermedad grave.
Queratomalacia		reblandecimiento de la córnea. Proceso de ulceración corneal que puede llevar a la perforación, sin que exista una causa inflamatoria de base. Puede ser secundaria a deficiencia de vitamina A.
Quintil		representa un quinto o el 20% de una población determinada, por ende existen 5 quintiles.
R		
Radiación, pérdida calórica por		es independiente de la temperatura del aire y depende de la superficie corporal expuesta. La temperatura de la superficie del cuerpo es irradiada hacia las superficies frías cercanas al recién nacido (paredes de incubadora).
Razón		el valor obtenido al dividir una cantidad por otra; un término general de qué tasa, proporción, porcentaje, prevalencia, etc. son subconjuntos.
Razón de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos)		para un determinado año, cociente entre el número de muertes maternas (numerador) y el número de nacidos vivos (denominador) en dicho año, multiplicado por cien mil.
RCIU		siglas de Retardo del Crecimiento Intrauterino. Se considera

	<p>que un feto presenta retardo del crecimiento intrauterino cuando se le estima un peso inferior al que le correspondería para su edad gestacional.</p>
Reanimación neonatal	<p>conjunto de pasos ordenados que se utilizan para mejorar ventilación y circulación en recién nacidos que nacen deprimidos.</p>
Reciclaje	<p>conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos.</p>
Recomendaciones nutricionales	<p>norma internacional de cantidades de energía y nutrientes que deben contener los alimentos consumidos para satisfacer los requerimientos de casi todos los individuos de una población sana.</p>
Redes	<p>conjunto de individuos (a veces denominados <i>actores</i>) y las actividades relacionadas entre ellos. El contenido de esas relaciones debe ser definido por el investigador y puede ser cualquier relación (salud, educación, etc).</p>
Reevaluación	<p>en este curso, significa examinar al niño o niña nuevamente en busca de signos de una enfermedad determinada para ver si está mejorando.</p>
Referencia urgente	<p>enviar a un paciente de inmediato a un hospital para que reciba atención adicional.</p>
Reflejo de Moro	<p>se produce fácilmente al colocar una mano debajo de la cabeza y después dejar caer repentinamente la cabeza varios centímetros. La respuesta normal consiste en abducción y extensión de los brazos con extensión mínima de los dedos tercero a quinto, seguido de abducción y flexión de extremidades superiores.</p>
Relactación	<p>es volver a la producción de leche para reiniciar la lactancia materna, seguida a la cesación o disminución significativa de la producción de ésta.</p>
Requerimientos nutricionales	<p>Cantidades de energía y de nutrientes biodisponibles en los alimentos que un individuo debe ingerir para satisfacer todas sus necesidades fisiológicas.</p>
Resfriado	<p>infección vírica común, de curación espontánea, que requiere solo atención de sostén; no deben administrarse antibióticos.</p>
Resultados	<p>resultados a corto plazo que se producen mediante una combinación de los insumos y actividades completadas según lo planificado y con un nivel aceptable de calidad.</p>
Resultados oportunos	<p>que están disponibles cuando sean requeridos para decisiones claves.</p>

Retardo del crecimiento intrauterino	Ver RCIU.
Retracción esternal	consiste en el hundimiento del esternón con cada inspiración.
Riesgo	probabilidad que tiene un individuo o grupo de sufrir un daño.
Riesgo inminente	que está próximo a suceder.
Rinorrea	enfermedad de la nariz que produce mucosidades.
Rubéola	enfermedad benigna exantemática y autolimitada cuyo agente infeccioso es un virus RNA de la familia Togaviridae y género Rubivirus. Si la enfermedad la presenta la madre en el primer trimestre de embarazo, puede provocar anomalías congénitas y retardo psicomotor severo.
Ruptura prematura de membranas	ruptura de membranas ovulares más de 18 horas antes del parto.

S

Sales de rehidratación oral (SRO)	mezcla de glucosa y sales que se ajustan a la fórmula recomendada por la OMS (en gramos por litro): cloruro de sodio, 3,5; citrato trisódico dihidratado, 2,9; bicarbonato de sodio, 2,5; cloruro de potasio, 1,5; y glucosa, 20.0.
Salmonella	género bacteriano formado por bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos, con flagelos peritricos que rodean al microorganismo y no desarrolla cápsula ni espora. Son bacterias móviles que producen sulfuro de hidrógeno. No fermentan glucosa ni lactosa.
Salud reproductiva	Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, en todo lo que se relaciona con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
Sarampión	infección viral aguda con fiebre, <i>rash</i> característico y conjuntivitis. Puede provocar estomatitis que interfiere con la alimentación. Es una enfermedad prevenible con vacuna.
Selectividad	que se concentra en aquellos factores que ayudarán a explicar y resolver el problema que se está examinando.
Sensibilidad	mide la proporción o el porcentaje de aquellos que padecen la enfermedad identificados correctamente por el signo.
Sepsis	presencia en sangre u otros tejidos de microorganismos patógenos o sus toxinas.
Serotipo	antígeno común a la especie bacteriana.

Shock	ver choque.
Sibilancias	sonido suave y agudo que se produce por el paso del aire por las vías aéreas estrechadas.
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, causado por la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El SIDA es la fase final y más grave de la infección por el VIH. El sistema inmunitario funciona mal y el paciente puede tener diversos síntomas y enfermedades (como diarrea, fiebre, neumonía).
Sífilis Congénita	infección causada por la espiroqueta <i>Treponema pallidum</i> que puede pasar de la madre al niño durante el desarrollo fetal o en el momento del nacimiento.
Signos	indicios concretos, objetivos, de un problema de salud que el trabajador de salud comprueba mirando, escuchando o palpando. Ejemplos de signos son: respiración rápida, tiraje subcostal, ojos hundidos, rigidez de la nuca, etc.
Signos de alarma	alteraciones en la forma de comportarse del niño o niña que al presentarse, permiten identificar a tiempo, algún problema (físico, psicológico o de desarrollo) para ayudarlo antes de que éste se agrave.
Silverman-Andersen, puntuación de	signos clínicos para evaluar la magnitud de la dificultad respiratoria en el recién nacido. A cada uno de los cinco signos se les asigna una puntuación, la cual entre mayor más severa la dificultad respiratoria.
Síntomas	problemas de salud notificados por la madre, como tos o diarrea.
Síntomas principales	síntomas que el trabajador de salud debe preguntar siempre a la madre al evaluar al niño.
Sistema de salud	todas las organizaciones, instituciones, comunidades y recursos que están dedicados a producir acciones de salud.
Sostenibilidad	característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades.
Sucedáneo de la leche materna	leche o preparado lácteo que se da en vez de la leche materna o además de esta. Un ejemplo es la leche de vaca preparada del siguiente modo: Mezclar ½ taza (100 ml) de leche entera de vaca hervida con ¼ taza de agua hervida (50 ml) y 2 cucharaditas rasas (10 g) de azúcar.

Sufrimiento fetal	reducción del intercambio y/o la nutrición a nivel placentario, provocando alteraciones de la homeostasis fetal (acidosis, hipercarbia, hipoxia).
Supervisión	actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los procesos de trabajo, que en forma directa o indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción de necesidades de los consumidores y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de un programa
Supresión inmunitaria	debilitación del sistema inmunitario, de modo que el organismo tiene poca resistencia a las enfermedades.
Surfactante	sustancia compleja que contiene fosfolípidos y un número de apoproteínas. Este líquido esencial es producido por las células alveolares Tipo II, y cubre los alveolos y pequeños bronquiolos. El surfactante reduce la tensión superficial en todo el pulmón, contribuyendo a su compliancia general. Es también importante porque estabiliza el alveolo.

T

Talla para edad (T/E)	una talla baja en relación a la edad indica una insuficiencia alimentaria crónica, que afecta el crecimiento longitudinal
Tallmetro	tabla que se usa para medir ya sea la talla (de pie) o la longitud (acostado), graduada en 0.1 cm.
Tamizaje	exámenes que buscan trastornos graves (enfermedades, genéticos, metabólicos), de tal manera que se puedan tomar medidas importantes durante el tiempo crítico antes de que se desarrollen los síntomas
Taquicardia	aumento excesivo de la frecuencia cardíaca.
Tasa	una razón cuya característica esencial es que el tiempo (hora, minuto, etc) es un elemento del denominador y por ello hay una relación diferenciada entre el numerador y el denominador. El numerador quizá sea una medida de cantidad o un valor contado
Tasa de incidencia	la tasa al cual nuevos sucesos ocurren en la población. El número de nuevos sucesos es el numerador, y el número de personas en la población declarada en la cual los casos se dieron es el denominador.
Tasa de letalidad	mide el número de personas que mueren de una enfermedad específica por cada 100 personas que la sufren.

Tasa de mortalidad	se valora el número de muertes por 1,000 ó 100,000 habitantes; se estima como población de referencia a la calculada a la mitad del período.
Tasa de mortalidad fetal tardía	está comprendida a partir de las 28 semanas, momento que el feto alcanza un peso aproximado de 1.000 g.
Tasa de mortalidad neonatal (por 1,000 nacidos vivos)	para un determinado año, cociente entre el número de nacidos vivos que mueren antes de cumplir 28 días de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos (denominador) en dicho año, multiplicado por mil. Expresa el riesgo absoluto de morir en los primeros 27 días de vida.
Tasa de mortalidad neonatal precoz	la que ocurre desde el momento del nacimiento hasta los 6 días.
Tasa de mortalidad neonatal tardía	la que ocurre después de los 7 días, hasta los 27 días posnatales.
Tasa de mortalidad perinatal (por 1000 nacidos vivos)	para un determinado año, cociente entre la suma del número de muertes fetales tardías (22 o más semanas completas de gestación y el número de muertes infantiles neonatales precoces (menos de 7 días de vida) (numerador) y el número de nacidos vivos (denominador) en dicho año, multiplicado por mil. Expresa el riesgo absoluto de morir durante el período perinatal.
Tasa de mortalidad posneonatal (por 1000 nacidos vivos)	para un determinado año, cociente entre el número de nacidos vivos que mueren antes de cumplir un año de edad pero han vivido 28 días o más (numerador) y el número total de nacidos vivos (denominador) en dicho año, multiplicado por mil. Expresa el riesgo absoluto de morir entre los 28 y 364 días de vida.
Temperatura ambiental neutra	rango de temperatura en la cual el recién nacido lleva a cabo todas sus funciones metabólicas con el menor consumo de oxígeno.
Temperatura axilar	temperatura medida en la axila.
Teratogénico	que puede producir anomalías congénitas en el feto.
Tetania uterina	trastorno de hiperexcitabilidad neuromuscular que implica contracciones uterinas dolorosas y muy prolongadas.
Tiraje costal	consiste en la marcación de la parrilla costal con cada inspiración.
Tiraje subcostal	hundimiento entre el abdomen y la parrilla costal a nivel de los diafragmas con cada inspiración.
TORCH	siglas que se refieren a las infecciones intrauterinas más frecuentes (toxoplasma, rubéola, citomegalovirus y herpes zoster), la "O" se refiere a otras entre las que se incluyen sífilis, tuberculosis, hepatitis, VIH/Sida.

Tos ferina	infección bacteriana aguda que afecta el árbol traqueo bronquial, principalmente en infantes y niños mayores y que se caracteriza por accesos repetidos y violentos de tos.
Toxemia	presencia de veneno o toxinas en la sangre y estado morboso consecutivo.
Toxemia del embarazo	síndrome de aparición exclusiva durante la gestación humana, generalmente después de la 20 ^a semana, caracterizado por hipertensión, edema y proteinuria.
Toxinas	proteínas o lipopolisacáridos que causan daños concretos a un huésped.
Trabajador de salud comunitaria	un proveedor de servicios de salud que vive en la comunidad con las personas que sirve.
Trabajo en equipo	grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto.
Tremores	temblores finos, principalmente en extremidades.
Triaje	procedimiento de clasificación rápida encaminada a una terapia eficiente cuando los pacientes llegan al hospital.
Trombocitopenia	disminución del número de plaquetas en sangre (menor de 150.000 por mm ³).
Tuberculosis	enfermedad infecciosa producida por el <i>Micobacterium tuberculosis</i> . Normalmente afecta primariamente a los pulmones pero puede extenderse a otros órganos.
Tuberculosis miliar	infección bacteriana contagiosa causada por la bacteria <i>Mycobacterium tuberculosis</i> . Es "diseminada" si se ha extendido desde los pulmones a otros órganos del cuerpo por medio de la sangre o el sistema linfático.

U

Úlceras de la boca	llagas por dentro de la boca, en los labios o la lengua. Pueden ocurrir con el sarampión y pueden ser rojas o tener una capa blanca. Dificultan el comer o el beber; también se conocen como aftas.
Unidad didáctica	método de diseño de planes de estudio según el cual el plan de estudios se divide en períodos de aprendizaje de duración variable que incluyen teoría y práctica.
Universalidad	que todos los grupos de población puedan acceder a él.

V

Vacuna BCG	vacuna para prevenir la tuberculosis, que se administra al nacer. El nombre lo constituyen las iniciales de "Bacilo de Calmette-Guérin".
Vacuna de toxoide tetánico	inmunización con toxoide tetánico. La inmunización apropiada se considera con 2 vacunas con por lo menos 4 semanas de intervalo, con la segunda dosis un mes o más antes del parto; o un total de 5 inmunizaciones en el transcurso de la vida.
Vacuna pentavalente	combinación de cinco vacunas en una, para prevenir la difteria, el tétanos, la tos ferina, neumonías, meningitis y hepatitis B.
Vacuna triple DPT	vacuna para prevenir la difteria, la tos ferina (tos convulsa) y el tétanos. Para tener protección total, un niño necesita tres inyecciones: a las 6 semanas, a las 10 semanas y a las 14 semanas de edad.
Validez	que exista un tipo de correlación positiva entre el indicador y la variable dependiente o independiente que intenta medir.
Variable	cualquier cantidad que varía. Cualquier atributo, fenómeno o suceso que pueden tener diferentes valores.
Varicela	enfermedad vírica sumamente contagiosa que se caracteriza por la aparición en la piel y mucosas de vesículas típicas, asociadas a una reacción general poco intensa.
Vida al nacer	un recién nacido se considera vivo cuando al nacimiento están presentes movimientos respiratorios o cualquier otra evidencia de vida tal como latidos cardíacos, pulsación del cordón umbilical o movimientos definidos de los músculos voluntarios.
Vigilancia del desarrollo	es un proceso flexible de observación del niño que permite detectar los "Cursos Atípicos" al desarrollo que puedan ser expresión de una discapacidad latente, y comprometer la "calidad de vida" del niño. Vigilar el curso del desarrollo resulta un componente esencial de la práctica pediátrica a nivel de la atención primaria.
Vigilancia en salud	describe el alcance (vigilancia) e indica el contexto en que ocurre (salud pública). La vigilancia no abarca la investigación epidemiológica o el servicio, los cuales son acciones de salud pública relacionadas pero independientes que pueden o no basarse en la vigilancia. Por lo tanto, el límite de la práctica de la vigilancia excluye la investigación y puesta en práctica real de los programas de entrega de servicios.
Vigilancia epidemiológica	la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. El análisis e interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma de decisiones y

	al mismo tiempo ser utilizada para su difusión.
VIH	virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH causa el SIDA.
VIH-negativo	se refiere a personas que se han hecho pruebas del VIH y saben que sus resultados fueron negativos, o a niños pequeños que han tenido resultados negativos y cuyos cuidadores o tutores conocen los resultados.
Viral	relativo a virus. Agente infeccioso más pequeño (20-300 nm de diámetro), que contiene como genoma sólo una clase de ácido nucleico (RNA o DNA), generalmente de molécula única. El ácido nucleico está recubierto por una envoltura proteica y toda la unidad infecciosa (virión) se replica en las células vivas.
Virus de la hepatitis B	uno de varios virus que causan hepatitis; también causa cáncer hepático. Este virus se transmite fácilmente por la sangre, de manera que las agujas y jeringas deben ser estériles.
Visita de seguimiento	visita del niño enfermo al consultorio, solicitada por el trabajador de salud, para comprobar si el tratamiento está teniendo efecto o si se necesita tratamiento o referencia adicional.
Visita domiciliaria	facilita identificar cómo se expresan en la familia, las formas de trabajo y vida de los miembros que la componen, cómo estas formas son sociabilizadas entre los miembros, cuáles patrones de solidaridad se desarrollan en el interior del universo familiar y cómo éstos pueden contribuir al proceso de cuidado, cura o recuperación de sus enfermedades.
Visita inicial	la primera visita a un trabajador de salud por un episodio de una enfermedad o problema del niño o niña.
Vitaminas	compuestos heterogéneos que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlos más que a través de la ingestión directa. Las vitaminas son nutrientes esenciales , imprescindibles para la vida.
VOP	vacuna antipoliomielítica oral. Para prevenir la poliomielitis, se da en cuatro dosis: al nacer, a las 6 semanas, a las 10 semanas y a las 14 semanas de edad.
Voluntario	toda aquella persona que desarrolla una acción voluntaria. Esta acción puede considerarse como tal si cumple con las siguientes condiciones: 1) ser una actividad de interés general, 2) que la realización de esta acción sea consecuencia de una decisión que este sujeto adopta libremente, 3) que se

lleve a cabo de manera responsable y gratuita y 4) que estén desarrolladas dentro de un marco de programas concretos.

Vulnerable

en peligro, con probabilidad de enfermarse.

W**Wahl**, regla de

para calcular la fecha probable de parto, al primer día de la última menstruación se le agregan 10 días y se restan 3 meses.

X**Xeroftalmia**

resequedad de la conjuntiva.

Xerosis

piel seca, escamosa y bastante áspera al tacto. Puede deberse a deficiencia de vitamina A, aunque la falta de proteína y grasa puede ser, en parte, la causa.

Z**Ziehl-Nielsen**,
tinción de

examen microscópico para la identificación de bacilos acidorresistentes (tuberculosis).

Zona de riesgo

zonas con tasas anuales de incidencia parasitaria elevada.