



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/36-2003/35)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	50	6	0	3	7,3	38	3	0	0	0
CAR	DOR	22	0	0	0	9,1	20	2	0	0	0
	GUY	6	0	0	0	16,7	5	1	0	0	0
	HAI	12	1	0	1	30,0	7	2	0	1	0
	HON	54	3	7	4	25,0	30	7	0	3	0
	JAM	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	6	0	0	0	0,0	6	0	0	0	0
FIO	BRA	352	37	0	19	21,6	232	61	0	3	0
	PER	76	2	3	7	26,6	47	17	0	0	0
INC	COR	4	1	0	0	33,3	2	1	0	0	0
	ELS	68	0	0	0	27,9	49	19	0	0	0
	GUT	78	0	4	0	10,8	66	8	0	0	0
	NIC	20	0	0	0	30,0	14	6	0	0	0
	PAN	5	1	0	0	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	337	0	10	10	21,8	248	64	0	5	0
INH	VEN	91	0	3	1	2,3	85	2	0	0	0
INS	COL	109	0	4	11	16,0	79	13	0	2	0
	ECU	25	0	0	0	4,0	24	1	0	0	0
ISP	CHI	25	0	3	0	4,5	21	1	0	0	0
MAL	ARG	112	0	6	0	15,1	90	10	0	6	0
	BOL	57	5	0	8	9,1	40	2	0	2	0
	CHI	74	0	0	0	8,1	68	4	0	2	0
	PAR	17	2	0	0	13,3	13	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
REC	BRA	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1615	58	40	64	17,4	1200	226	0	27	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/36-2003/35)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 35

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM. 2003	Semana													
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31	32	33	34	35
ARG	0	13	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	1	6	0	0
BOL	0	13	0	1	7	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
BRA	0	74	5	5	7	10	13	22	12	0	0	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	13	0	2	2	2	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0
CHI	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	1
COL	0	32	1	1	2	1	3	3	3	2	6	2	4	3	1	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	1	4	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
ECU	0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0
ELS	0	29	0	0	0	0	0	1	9	4	5	2	4	2	0	2
GUT	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
HON	0	14	0	0	0	0	1	3	3	1	2	1	2	1	0	0
MEX	0	157	4	6	16	17	26	16	35	11	7	8	5	5	1	0
NIC	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	3
PAN	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
PAR	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
PER	0	14	0	0	0	0	1	2	4	0	0	1	3	2	0	1
URU	0	5	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
TOTAL	0	418	12	17	40	32	50	51	75	21	27	21	25	25	12	10

Cuadro No. 2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/36-2003/35)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues- tra+	% Sitios Notifi- caron
ARG	129	1,19	128	1,16	87	70	98
BOL	64	1,95	57	1,69	96	65	0
BRA	636	1,23	447	0,86	95	76	91
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	27	1,23	96	63	100
CHI	114	2,64	104	2,41	90	87	97
COL	121	0,86	123	0,88	72	75	56
COR	29	2,38	5	0,41	100	80	NR
CUB	37	0,83	21	0,47	100	100	96
DOR	36	1,12	26	0,77	100	85	90
ECU	43	1,00	43	0,99	72	93	84
ELS	110	4,82	102	4,43	77	84	58
GUT	72	1,58	79	1,73	91	90	45
HAI	12	0,38	12	0,38	67	58	40
HON	72	2,95	54	1,98	100	98	94
MEX	384	1,18	369	1,13	94	85	93
NIC	28	1,25	33	1,45	97	94	100
PAN	4	0,41	5	0,53	100	80	82
PAR	27	1,21	18	0,81	72	67	88
PER	96	1,12	78	0,91	100	95	99
URU	8	0,98	7	0,85	86	29	43
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	96	1,26	93	83	84
Total♦	2150	1,29	1834	1,09	91	81	82

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 35

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 35

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	1	0
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	3	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú