



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/40-2003/39)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	72	21	2	7	7,1	39	3	0	0	0
CAR	DOR	21	0	0	0	9,5	19	2	0	0	0
	GUY	5	0	0	0	20,0	4	1	0	0	0
	HAI	12	1	0	0	36,4	7	3	0	1	0
	HON	52	0	6	0	26,1	34	9	0	3	0
	JAM	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	5	0	0	0	0,0	5	0	0	0	0
FIO	BRA	398	89	4	13	23,6	223	62	0	7	0
	PER	97	5	7	13	23,6	55	17	0	0	0
INC	ELS	83	0	0	0	28,9	59	24	0	0	0
	GUT	79	0	5	3	8,5	65	6	0	0	0
	NIC	26	0	0	2	25,0	18	6	0	0	0
	PAN	5	0	0	1	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	299	0	0	20	20,8	221	54	0	4	0
INH	VEN	93	0	6	0	2,3	85	2	0	0	0
INS	COL	118	0	9	10	15,2	84	14	0	1	0
	ECU	27	0	0	0	0,0	27	0	0	0	0
ISP	CHI	27	0	0	1	3,8	25	1	0	0	0
MAL	ARG	107	0	5	0	14,7	87	11	0	4	0
	BOL	53	2	0	0	7,8	47	2	0	2	0
	CHI	59	0	0	0	10,2	53	4	0	2	0
	PAR	16	0	1	0	13,3	13	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1668	118	45	70	17,4	1186	223	0	26	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/40-2003/39)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 39

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana															
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33	34	35	36	37	38
ARG	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0
BOL	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BRA	0	146	4	5	2	8	6	11	14	28	11	13	11	9	14	9	1	
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAR	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
CHI	0	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	0	
COL	0	44	1	1	2	1	3	3	1	15	4	3	1	5	2	1	1	
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUB	0	14	2	1	4	1	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	
DOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ECU	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	1	
ELS	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	4	2	0	
GUT	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	0	
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
HON	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	1	0	0	
MEX	0	157	4	6	16	17	26	16	35	31	5	1	0	0	0	0	0	
NIC	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	3	0	0	1	1	
PAN	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
PAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
PER	0	25	0	0	0	0	2	4	4	5	5	1	1	0	1	2	0	
URU	0	6	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEN	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	
TOTAL	0	470	11	15	26	27	42	37	59	88	31	32	26	22	30	20	4	

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/40-2003/39)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	123	1,11	85	70	95
BOL	64	1,95	54	1,60	98	67	0
BRA	636	1,23	532	1,03	95	74	91
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	25	1,13	96	68	100
CHI	114	2,64	91	2,11	89	85	97
COL	121	0,86	130	0,93	68	76	82
COR	29	2,38	0	0,00	0	0	NR
CUB	37	0,83	22	0,49	100	100	96
DOR	36	1,12	22	0,65	100	86	90
ECU	43	1,00	44	1,02	75	95	85
ELS	110	4,82	96	4,16	78	85	59
GUT	72	1,58	80	1,76	91	90	45
HAI	12	0,38	12	0,38	67	58	40
HON	72	2,95	52	1,91	98	98	94
MEX	384	1,18	327	1,00	95	83	86
NIC	28	1,25	33	1,45	97	91	100
PAN	4	0,41	5	0,53	100	80	82
PAR	27	1,21	17	0,76	71	71	87
PER	111	1,29	97	1,13	99	95	99
URU	8	0,98	9	1,10	78	33	43
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	94	1,23	95	89	82
Total ♦	2165	1,30	1865	1,11	91	80	87

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA

NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 39

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

Hasta la semana 39

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	2	1
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	0	0
COL	1	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	0	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	4	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú