



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2002/46-2003/45)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	70	17	0	10	7,0	40	3	0	0	0
CAR	DOR	19	0	0	0	10,5	17	2	0	0	0
	GUY	5	0	0	0	20,0	4	1	0	0	0
	HAI	14	3	0	0	36,4	7	3	0	1	0
	HON	51	1	3	0	25,5	35	10	0	2	0
	JAM	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
FIO	BRA	367	101	0	16	26,0	185	58	0	7	0
	PER	98	16	0	14	32,4	46	22	0	0	0
INC	ELS	66	0	0	0	33,3	44	22	0	0	0
	GUT	81	0	2	7	15,3	61	7	0	4	0
	NIC	28	0	0	6	27,3	16	6	0	0	0
	PAN	4	0	0	0	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	330	1	0	33	22,0	231	58	0	7	0
INH	VEN	92	0	2	1	3,4	86	3	0	0	0
INS	COL	121	1	3	2	12,2	101	14	0	0	0
	ECU	23	0	0	0	0,0	23	0	0	0	0
ISP	CHI	27	0	0	1	3,8	25	1	0	0	0
MAL	ARG	110	0	6	0	14,4	89	11	0	4	0
	BOL	54	4	5	0	8,9	41	2	0	2	0
	CHI	45	0	0	0	11,1	40	3	0	2	0
	PAR	18	2	4	0	16,7	10	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1639	146	25	90	18,8	1119	228	0	31	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2002/46-2003/45)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 45

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana														
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41	42	43
ARG	0	13	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	4	4	0	0
BOL	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	4	0	0
BRA	0	151	4	5	2	7	5	10	12	26	43	35	2	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
CHI	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
COL	0	19	1	0	2	0	1	1	2	3	1	3	0	1	3	1	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	17	2	1	4	1	0	1	2	1	2	2	0	0	1	0	0
DOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ECU	0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0
ELS	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	6	4	3	2	1
GUT	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3	1	0	0
HAI	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
HON	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
MEX	0	138	3	1	5	7	8	7	18	19	41	26	3	0	0	0	0
NIC	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	3	0
PAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PAR	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
PER	0	32	0	0	0	0	1	2	1	5	9	5	2	2	0	2	3
URU	0	9	0	1	2	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
TOTAL	0	483	10	9	15	15	19	22	37	54	117	103	24	20	21	10	7

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/46-2003/45)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	126	1,14	83	69	92
BOL	64	1,95	55	1,63	98	69	0
BRA	636	1,23	488	0,94	95	75	92
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	25	1,13	96	56	100
CHI	114	2,64	76	1,76	91	84	97
COL	121	0,86	132	0,94	67	74	84
COR	29	2,38	0	0,00	0	0	NR
CUB	37	0,83	19	0,42	100	100	96
DOR	36	1,12	20	0,59	100	95	90
ECU	43	1,00	45	1,04	73	96	85
ELS	110	4,82	101	4,38	90	86	62
GUT	72	1,58	82	1,80	93	90	47
HAI	12	0,38	14	0,44	64	64	40
HON	72	2,95	52	1,91	98	96	94
MEX	384	1,18	360	1,10	94	83	95
NIC	28	1,25	32	1,40	97	97	100
PAN	4	0,41	5	0,53	100	80	83
PAR	27	1,21	18	0,81	67	72	88
PER	111	1,29	100	1,16	95	95	99
URU	8	0,98	10	1,22	80	40	40
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	92	1,21	95	90	81
Total♦	2165	1,30	1852	1,10	91	81	91

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 45

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 45

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	2	1
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	1	0
COL	1	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	1	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	7	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú