



## Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1**  
**Análisis de las muestras de heces de casos**  
**Últimas 52 semanas (2002/47-2003/46)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla- miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	70	17	0	10	7,0	40	3	0	0	0
CAR	DOR	18	0	0	0	11,1	16	2	0	0	0
	GUY	5	0	0	0	20,0	4	1	0	0	0
	HAI	14	3	0	0	36,4	7	3	0	1	0
	HON	51	2	3	0	26,1	34	10	0	2	0
	JAM	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
FIO	BRA	364	100	0	16	26,2	183	58	0	7	0
	PER	100	16	0	14	31,4	48	22	0	0	0
INC	ELS	81	0	0	0	34,6	53	28	0	0	0
	GUT	79	0	0	9	15,7	59	7	0	4	0
	NIC	28	0	0	0	28,6	20	8	0	0	0
	PAN	4	0	0	0	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	319	1	0	33	22,5	221	57	0	7	0
INH	VEN	89	0	1	2	3,5	83	3	0	0	0
INS	COL	130	3	11	2	12,3	100	14	0	0	0
	ECU	22	0	0	0	0,0	22	0	0	0	0
ISP	CHI	27	0	0	1	3,8	25	1	0	0	0
MAL	ARG	108	0	3	0	16,2	88	11	0	6	0
	BOL	53	4	5	0	9,1	40	2	0	2	0
	CHI	43	0	0	0	11,6	38	3	0	2	0
	PAR	19	3	0	1	13,3	13	1	0	1	0
	URU	1	0	0	0	100,0	0	0	0	1	0
TOTAL		1640	149	23	88	19,4	1112	235	0	33	0

\* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2**  
**Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente**  
**Últimas 52 semanas (2002/47-2003/46)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos  
solamente



# Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 46

**Cuadro No. 1**  
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación  
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana															
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41	42	43	44	45	46
ARG	0	12	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	3	0	2	1
BOL	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	4	0	0	0
BRA	0	151	4	5	2	7	5	10	12	26	43	35	2	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0
CHI	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
COL	0	21	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	2	7	5
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	21	2	1	6	2	0	1	2	2	2	2	0	1	1	0	0	0
DOR	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
ECU	0	22	0	0	0	0	2	4	6	0	1	6	0	0	3	0	0	0
ELS	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	4	3	3	0
GUT	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3	1	0	0	0
HAI	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
HON	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0
MEX	0	138	3	1	5	7	8	7	18	19	41	26	3	0	0	0	0	0
NIC	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
PAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PAR	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
PER	0	30	0	0	0	0	1	2	1	5	7	4	2	2	0	2	4	0
URU	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
TOTAL	0	476	9	8	15	16	20	24	40	53	103	90	22	17	21	12	20	6

**Cuadro No.2**  
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,  
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra  
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/47-2003/46)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	124	1,12	82	67	92
BOL	64	1,95	54	1,60	98	69	0
BRA	636	1,23	484	0,94	95	75	92
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	25	1,13	96	56	100
CHI	114	2,64	74	1,72	91	84	96
COL	121	0,86	145	1,03	68	74	84
COR	29	2,38	0	0,00	0	0	NR
CUB	37	0,83	22	0,49	100	100	96
DOR	36	1,12	20	0,59	100	95	90
ECU	43	1,00	45	1,04	73	96	85
ELS	110	4,82	102	4,43	89	85	62
GUT	72	1,58	80	1,76	93	90	47
HAI	12	0,38	14	0,44	64	64	40
HON	72	2,95	51	1,87	98	96	94
MEX	384	1,18	349	1,07	94	83	95
NIC	28	1,25	31	1,36	97	100	100
PAN	4	0,41	5	0,53	100	80	84
PAR	27	1,21	19	0,85	68	74	89
PER	111	1,29	100	1,16	95	96	99
URU	8	0,98	10	1,22	80	50	39
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	89	1,17	94	90	81
Total♦	2165	1,30	1843	1,10	91	81	91

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis  
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

**Cuadro No. 3**  
Casos confirmados de poliomieltitis  
por semana de inicio

Hasta la semana 46

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

**Cuadro No. 4**  
Casos compatibles de poliomieltitis  
por semana de inicio

Hasta la semana 46

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	2	1
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	1	0
COL	1	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	1	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	7	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS  
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú