



## Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1**  
**Análisis de las muestras de heces de casos**  
**Últimas 52 semanas (2002/50-2003/49)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
				Pendiente	Vacunal	Salvaje					
BEL	BRA	60	17	0	9	8,8	31	3	0	0	0
CAR	DOR	16	0	0	0	12,5	14	2	0	0	0
	GUY	5	0	0	0	20,0	4	1	0	0	0
	HAI	14	1	0	0	30,8	9	3	0	1	0
	HON	54	5	1	3	26,7	33	10	0	2	0
	JAM	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
FIO	BRA	338	99	0	16	26,0	165	51	0	7	0
	PER	93	16	0	14	31,7	43	20	0	0	0
INC	ELS	89	0	0	0	36,0	57	32	0	0	0
	GUT	92	0	7	7	16,7	65	12	0	1	0
	NIC	28	0	0	0	28,6	20	8	0	0	0
	PAN	4	0	0	0	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	305	1	0	33	23,2	208	56	0	7	0
INH	VEN	93	0	2	4	3,4	84	3	0	0	0
INS	COL	130	1	8	4	11,1	104	13	0	0	0
	ECU	41	0	1	0	0,0	40	0	0	0	0
ISP	CHI	40	0	1	1	5,3	36	2	0	0	0
MAL	ARG	105	0	5	1	18,2	81	12	0	6	0
	BOL	55	3	6	1	8,9	41	2	0	2	0
	CHI	32	0	0	0	9,4	29	2	0	1	0
	PAR	23	6	0	1	12,5	14	1	0	1	0
TOTAL		1631	149	31	94	19,3	1095	234	0	28	0

\* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2**  
**Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente**  
**Últimas 52 semanas (2002/50-2003/49)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos  
solamente



# Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 49

**Cuadro No, 1**  
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación  
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana																
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45	46	47	48
ARG	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	2	1	0
BOL	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	3	0	0
BRA	0	151	4	5	2	7	5	10	12	26	43	35	2	0	0	0	0	0	
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAR	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	
CHI	0	22	0	1	0	0	1	0	0	0	3	7	7	1	1	0	2	0	
COL	0	17	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	5	5	1	1	0	
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUB	0	23	2	1	6	2	0	1	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	
DOR	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
ECU	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	
ELS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	1	0	
GUT	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	1	3	0	
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
HON	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	1	
MEX	0	138	3	1	5	7	8	7	18	19	41	26	3	0	0	0	0	0	
NIC	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	
PAN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
PAR	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	1	0	0	
PER	0	30	0	0	0	0	1	2	1	5	7	4	6	4	0	0	0	0	
URU	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEN	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	
TOTAL	0	475	9	8	15	16	18	21	34	52	100	80	55	26	16	15	8	2	

**Cuadro No,2**  
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,  
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra  
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2002/50-2003/49)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	118	1,07	81	66	89
BOL	64	1,95	56	1,66	98	71	0
BRA	636	1,23	447	0,86	96	74	92
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	24	1,09	96	58	100
CHI	114	2,64	80	1,86	85	80	97
COL	121	0,86	144	1,03	68	74	84
COR	29	2,38	0	0,00	0	0	0
CUB	37	0,83	22	0,49	100	100	96
DOR	36	1,12	19	0,56	100	95	89
ECU	43	1,00	44	1,02	75	95	85
ELS	110	4,82	99	4,30	90	87	74
GUT	72	1,58	93	2,04	92	91	49
HAI	12	0,38	14	0,44	64	64	40
HON	72	2,95	54	1,98	98	96	94
MEX	384	1,18	329	1,01	94	84	95
NIC	28	1,25	35	1,54	94	97	100
PAN	4	0,41	6	0,64	83	67	84
PAR	27	1,21	23	1,03	61	78	88
PER	111	1,29	93	1,08	95	96	99
URU	8	0,98	9	1,10	78	44	43
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	93	1,22	95	90	80
Total	2165	1,30	1802	1,07	90	81	91

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis  
 † Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

**Cuadro No, 3**  
Casos confirmados de poliomieltitis  
por semana de inicio

Hasta la semana 49

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

**Cuadro No, 4**  
Casos compatibles de poliomieltitis  
por semana de inicio

Hasta la semana 49

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	2	1
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	1	0
COL	1	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	1	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	7	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS  
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú