



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas



Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2003/01-2003/52)

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
				Pendiente	Vacunal	Salvaje					
BEL	BRA	54	15	0	9	6,7	28	2	0	0	0
CAR	DOR	13	0	0	0	15,4	11	2	0	0	0
	GUY	7	0	0	0	14,3	6	1	0	0	0
	HAI	12	1	0	0	36,4	7	3	0	1	0
	HON	51	8	0	4	25,6	29	8	0	2	0
	JAM	18	0	1	3	0,0	14	0	0	0	0
	SUR	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	TRT	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
FIO	BRA	321	98	0	13	24,8	158	45	0	7	0
	PER	96	3	6	6	30,9	56	23	0	2	0
INC	ELS	87	0	0	0	36,8	55	32	0	0	0
	GUT	91	0	1	11	15,2	67	12	0	0	0
	NIC	27	0	0	0	29,6	19	8	0	0	0
	PAN	4	0	0	0	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	311	0	0	12	25,4	223	70	0	6	0
INH	VEN	90	0	0	1	3,4	86	3	0	0	0
INS	COL	124	0	1	7	12,1	102	14	0	0	0
	ECU	39	0	0	1	0,0	38	0	0	0	0
ISP	CHI	50	0	1	3	8,7	42	4	0	0	0
MAL	ARG	100	0	3	1	18,8	78	12	0	6	0
	BOL	56	4	0	2	12,0	44	4	0	2	0
	CHI	29	0	0	0	6,9	27	1	0	1	0
	PAR	22	4	0	1	11,8	15	1	0	1	0
TOTAL		1606	133	13	74	19,8	1112	246	0	28	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2003/01-2003/52)

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL	
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas					
		P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.	P1	P2	P3	Mez.		
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 18, No 52

Cuadro No. 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	TOTAL	ACUM.	Semana																
			2002	2003	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	49	50	51
ARG	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	1	3	0	0
BOL	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0
BRA	0	151	4	5	2	7	5	10	12	26	43	35	2	0	0	0	0	0	0
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	4	0	0	0	0
CHI	0	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8	7	5	1	0	2	0
COL	0	18	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	8	1	4	1	0
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	23	2	1	6	2	0	1	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0
DOR	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
ECU	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ELS	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	0	0	0
GUT	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	7	0	0	0
HAI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
HON	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	2	0	0
MEX	0	159	3	1	6	7	8	7	18	18	38	32	21	0	0	0	0	0	0
NIC	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	2	0	0
PAN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
PAR	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0
PER	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	3	0	0	0	1
URU	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL	0	499	9	7	16	16	17	19	33	46	89	86	61	66	19	9	5	1	1

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2002		Ultimas 52 semanas (2003/01-2003/52)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	129	1,19	116	1,05	81	65	89
BOL	64	1,95	57	1,69	98	72	0
BRA	636	1,23	421	0,81	96	74	92
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	22	1,00	33	1,50	91	61	100
CHI	114	2,64	83	1,93	83	83	97
COL	121	0,86	144	1,03	67	71	85
COR	29	2,38	0	0,00	0	0	0
CUB	37	0,83	22	0,49	100	100	96
DOR	36	1,12	17	0,50	100	94	89
ECU	43	1,00	42	0,97	79	95	86
ELS	110	4,82	99	4,30	90	87	77
GUT	72	1,58	99	2,17	93	90	51
HAI	12	0,38	12	0,38	67	75	40
HON	72	2,95	51	1,87	98	96	94
MEX	384	1,18	336	1,03	93	83	93
NIC	28	1,25	36	1,58	94	94	100
PAN	4	0,41	6	0,64	100	67	85
PAR	27	1,21	22	0,99	59	77	89
PER	111	1,29	97	1,13	97	96	99
URU	8	0,98	9	1,10	78	44	43
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	106	1,39	90	1,18	96	89	80
Total	2165	1,30	1792	1,07	90	80	91

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 † Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltitis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	0	0	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltitis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2002	Acumulado	
		2002	2003
ARG	0	0	0
BOL	2	2	1
BRA	1	1	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	1	1	0
COL	1	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	0	0	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	1
HAI	0	0	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	1	1	0
PER	0	0	0
URU	1	1	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	7	7	2

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú