



SITUACION DEL SARAMPION BOLIVIA – 2000


En el año 2.000 fueron reportados 1.513 casos sospechosos en el país, confirmándose 122 de ellos como sarampión. Esta cifra representa un marcado descenso con relación a los años 1998 y 1999, con 1.004 y 1.441 casos confirmados respectivamente. El 51% de los casos presentados en la Región de las Américas en 1.999 correspondieron a Bolivia




Los 122 casos de la enfermedad se asociaron a 11 brotes en distintas regiones del país. El 64% de ellos (68 casos en total) corresponden a dos grandes brotes presentados en el período comprendido entre las semanas 20 y 34 en la localidad de Amarete, Departamento de La Paz (12 casos) y en dos colonias menonitas localizadas en el Departamento de Santa Cruz (66 casos) que no habían aceptado la vacunación debido a aspectos de orden religioso.



Los Departamentos más afectados fueron: Santa Cruz con 77 casos, Beni con 21 y La Paz con 16 casos. Los restantes se repartieron entre Cochabamba (4), Pando (3) y Potosí (1). La mayor tasa de incidencia correspondió al Departamento de Beni con 5.7 y Pando con 5.2 por 100.000 habitantes.




En general, los brotes afectaron a niños y adultos jóvenes no vacunados, en muchos casos migrantes de comunidades rurales, observándose las tasas más altas en el grupo de 6 a 11 meses, con 6.4, y en el grupo de 1 a 4 años, con 3.5



El último caso confirmado en el país fue notificado en la semana 40 del 2000 en la ciudad de Cochabamba.

SITUACION DEL SARAMPION BOLIVIA – 2001

Hasta la semana 17 no se han confirmado casos de sarampión en Bolivia, habiéndose reportado 152 casos sospechosos a la fecha, de los cuales 21 correspondieron a rubéola.



Tomando en cuenta que el último caso de sarampión fue notificado en la semana 40 de 2.000, Bolivia lleva 19 semanas sin casos confirmados de sarampión, a pesar del reforzamiento del sistema de vigilancia y, fundamentalmente, de la búsqueda activa en todos los niveles.

Con el propósito de garantizar las coberturas con vacuna antisarampionosa se ha implementado el monitoreo rápido de coberturas en forma permanente en los niveles locales.

Todos los Departamentos han notificado casos sospechosos, especialmente Santa Cruz con 56 y Cochabamba con 41 casos.

