



Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2001/36-2002/35)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- Miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS				
			Aún no en lab.	<6 Sem.	>6 Sem.		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
								Pendiente	Vacunal	Salvaje	
BEL	BRA	102	16	0	9	7,8	71	6	0	0	0
CAR	DOR	33	0	0	0	33,3	22	9	0	2	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HAI	13	0	0	0	15,4	11	1	0	1	0
	HON	77	9	0	1	26,9	49	15	0	3	0
	JAM	9	0	0	0	0,0	9	0	0	0	0
	SUR	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	TRT	7	0	0	0	14,3	6	0	0	1	0
CDC FIO	BOL	2	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
	BOL	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	BRA	208	67	1	17	15,4	104	18	0	1	0
	PER	84	10	0	10	14,1	55	9	0	0	0
INC	COR	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	ELS	74	1	1	0	15,3	61	11	0	0	0
	GUT	60	0	7	2	2,0	50	1	0	0	0
	NIC	23	5	0	0	5,6	17	1	0	0	0
	PAN	4	0	0	0	25,0	3	1	0	0	0
INDRE	MEX	250	0	11	14	27,6	163	58	0	4	0
INH	VEN	94	1	6	0	3,4	84	3	0	0	0
INS	COL	117	3	8	5	6,9	94	7	0	0	0
	ECU	25	0	0	0	16,0	21	4	0	0	0
ISP	CHI	64	0	8	0	5,4	53	3	0	0	0
MAL	ARG	90	0	9	1	22,5	62	17	0	1	0
	BOL	45	3	0	0	14,3	36	6	0	0	0
	CHI	23	0	0	0	21,7	18	5	0	0	0
	PAR	21	2	0	1	33,3	12	4	0	2	0
	URU	4	0	0	0	50,0	2	2	0	0	0
REC	BRA	128	10	0	11	7,5	99	8	0	0	0
TOTAL		1570	127	51	71	15,4	1117	189	0	15	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2001/36-2002/35)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Fláccida Aguda

Vol, 17, No.35

Cuadro No. 1
Casos de parálisis fláccida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total	Acum.,	Semana													
			2001	2002	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29	30	31	32	33
ARG	0	9	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	2	0	1
BOL	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
BRA	0	115	1	1	6	6	23	25	31	4	6	4	5	0	2	1
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAR	0	8	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	1	0	0
CHI	0	31	0	1	0	0	1	8	8	1	1	1	2	1	3	4
COL	0	24	0	1	3	0	2	6	1	4	1	0	0	3	2	1
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUB	0	11	2	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOR	0	5	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ECU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ELS	0	22	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	2	3
GUT	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	0
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
HON	0	11	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	1	1	1
MEX	0	94	5	6	10	6	7	10	24	6	6	6	8	0	0	0
NIC	0	11	0	0	0	0	0	1	4	1	0	1	1	2	1	0
PAN	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PAR	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
PER	0	27	0	1	1	2	5	2	6	1	5	1	0	1	1	1
URU	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEN	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
TOTAL	0	397	9	14	21	18	45	56	88	20	28	23	29	19	13	14

Cuadro No.2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/36-2002/35)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	102	0,69	93	67	99
BOL	44	1,33	50	1,52	94	76	98
BRA	679	1,29	483	0,92	98	73	90
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	21	0,74	90	67	100
CHI	86	1,43	95	1,58	91	86	92
COL	152	1,08	127	0,91	75	78	83
COR	16	0,99	5	0,31	100	80	NR
CUB	17	0,38	17	0,38	94	100	98
DOR	75	2,19	36	1,05	100	75	90
ECU	29	0,68	28	0,66	71	93	85
ELS	77	3,45	94	4,21	80	95	74
GUT	94	2,06	60	1,32	85	93	52
HAI	31	1,03	17	0,57	71	41	NR
HON	61	2,39	78	3,05	91	87	91
MEX	400	1,00	292	0,73	90	77	93
NIC	27	1,25	31	1,43	97	94	100
PAN	9	0,99	4	0,44	100	75	78
PAR	21	0,94	21	0,94	67	62	86
PER	98	1,14	91	1,06	93	96	72
URU	18	2,28	12	1,52	100	83	78
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	94	1,14	91	87	92
Total♦	2197	1,20	1758	0,96	91	80	89

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No. 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No. 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	6	4	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	2	1	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	12	9	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú