



Vigilancia de la Poliomieltis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2001/44-2002/43)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			% Asla- Miento	AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días		Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus			
									Pendiente	Vacunal	Salvaje	
BEL	BRA	92	25	0	11	7,1	52	4	0	0	0	
CAR	DOR	24	0	0	0	33,3	16	6	0	2	0	
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0	
	HAI	13	0	0	1	8,3	11	1	0	0	0	
	HON	75	3	3	0	33,3	46	21	0	2	0	
	JAM	7	0	0	0	0,0	7	0	0	0	0	
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0	
	TRT	8	0	2	0	16,7	5	0	0	1	0	
FIO	BRA	205	94	0	27	17,9	69	14	0	1	0	
	PER	90	0	14	3	19,2	59	14	0	0	0	
INC	ELS	71	0	0	0	14,1	61	10	0	0	0	
	GUT	58	0	0	0	13,8	50	8	0	0	0	
	NIC	28	1	6	1	15,0	17	3	0	0	0	
	PAN	3	0	0	0	33,3	2	1	0	0	0	
INDRE	MEX	277	0	9	3	25,3	198	64	0	3	0	
INH	VEN	94	5	2	3	1,2	83	1	0	0	0	
INS	COL	107	3	8	5	8,8	83	7	0	1	0	
	ECU	27	0	0	0	11,1	24	3	0	0	0	
ISP	CHI	71	0	10	0	4,9	58	3	0	0	0	
MAL	ARG	102	1	4	0	21,6	76	18	0	3	0	
	BOL	58	8	3	0	17,0	39	8	0	0	0	
	CHI	32	0	0	0	18,8	26	6	0	0	0	
	PAR	26	2	2	1	28,6	15	4	0	2	0	
	URU	4	0	0	0	50,0	2	2	0	0	0	
REC	BRA	101	10	0	12	6,3	74	5	0	0	0	
TOTAL		1578	152	63	67	16,8	1078	203	0	15	0	

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2001/44-2002/43)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total 2001	Acum., 2002	Semana															
			1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37	38	39	40	41	42	43
ARG	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1
BOL	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	2	1	1
BRA	0	172	1	3	6	6	20	25	30	32	39	5	3	2	0	0	0	
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAR	0	13	0	0	0	0	1	2	1	3	2	0	0	1	2	0	1	
CHI	0	32	0	1	0	0	0	0	0	0	7	6	2	7	6	0	3	
COL	0	21	0	0	3	0	1	3	0	1	1	2	1	1	2	2	2	
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUB	0	12	2	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
DOR	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	
ECU	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	
ELS	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	3	1	8	2	2	
GUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
HON	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	
MEX	0	114	3	4	6	1	5	7	13	18	19	12	5	7	9	4	1	
NIC	0	9	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	1	2	
PAN	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
PAR	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	
PER	0	17	0	0	0	0	0	1	0	3	6	0	4	2	0	1	0	
URU	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEN	0	10	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	0	0	0	2	1	
TOTAL	0	474	7	12	16	8	31	39	47	59	94	39	23	25	30	20	16	8

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/44-2002/43)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	112	0,76	96	70	100
BOL	44	1,33	58	1,76	95	71	NR
BRA	679	1,29	453	0,86	98	72	89
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	21	0,74	90	62	100
CHI	86	1,43	109	1,81	93	89	93
COL	152	1,08	117	0,83	79	79	83
COR	16	0,99	0	0,00	0	0	NR
CUB	17	0,38	14	0,31	93	100	98
DOR	75	2,19	31	0,91	100	74	90
ECU	29	0,68	38	0,89	71	92	85
ELS	77	3,45	103	4,61	76	92	73
GUT	94	2,06	59	1,30	86	95	49
HAI	31	1,03	16	0,53	69	44	NR
HON	61	2,39	76	2,98	89	87	92
MEX	400	1,00	312	0,78	88	79	96
NIC	27	1,25	30	1,39	97	97	100
PAN	9	0,99	4	0,44	100	100	79
PAR	21	0,94	28	1,26	64	57	86
PER	98	1,14	90	1,05	94	93	48
URU	18	2,28	11	1,39	100	82	79
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	94	1,14	90	86	92
Total♦	2197	1,20	1776	0,98	90	79	89

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
 ♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
 * Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	6	6	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3	2	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	1
Total	13	12	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
 El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú