



Vigilancia de la Poliomiélitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2001/45-2002/44)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	96	11	0	5	7,5	74	6	0	0	0
CAR	DOR	24	0	0	0	33,3	16	6	0	2	0
	GUY	4	0	0	0	0,0	4	0	0	0	0
	HAI	12	0	0	0	8,3	11	1	0	0	0
	HON	76	0	4	0	33,3	48	22	0	2	0
	JAM	8	0	1	0	0,0	7	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	9	0	1	0	12,5	7	0	0	1	0
FIO	BRA	248	53	2	15	16,9	148	27	0	3	0
	PER	87	0	14	3	17,1	58	12	0	0	0
INC	ELS	83	0	0	0	14,5	71	12	0	0	0
	GUT	58	0	0	0	13,8	50	8	0	0	0
	NIC	28	1	6	0	14,3	18	3	0	0	0
	PAN	3	0	0	0	33,3	2	1	0	0	0
INDRE	MEX	269	0	6	6	24,9	193	61	0	3	0
INH	VEN	95	6	2	3	1,2	83	1	0	0	0
INS	COL	104	3	3	2	10,4	86	9	0	1	0
	ECU	36	0	0	0	16,7	30	6	0	0	0
ISP	CHI	74	1	11	1	4,9	58	3	0	0	0
MAL	ARG	102	0	7	0	20,0	76	16	0	3	0
	BOL	59	9	0	3	17,0	39	8	0	0	0
	CHI	29	0	0	0	17,2	24	5	0	0	0
	PAR	28	4	0	3	28,6	15	4	0	2	0
	URU	4	0	0	0	50,0	2	2	0	0	0
REC	BRA	100	9	0	8	6,0	78	5	0	0	0
TOTAL		1638	97	57	49	16,4	1200	218	0	17	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2001/45-2002/44)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 17, No.44

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total	Acum,	Semana														
			2001	2002	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41	42	43
ARG	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
BOL	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	1	1	1
BRA	0	111	0	3	4	2	7	7	13	6	22	37	5	5	0	0	
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAR	0	12	0	0	0	0	1	2	1	2	2	3	0	0	1	0	
CHI	0	33	0	1	0	0	0	0	0	0	6	21	0	3	1	1	
COL	0	17	1	0	2	0	0	3	0	0	0	1	1	3	3	3	
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUB	0	17	2	4	1	1	4	0	1	0	0	1	2	0	1	0	
DOR	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	
ECU	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
ELS	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	2	6	2	
GUT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
HON	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
MEX	0	114	3	4	6	1	5	7	13	18	19	33	4	1	0	0	
NIC	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	1	0	
PAN	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
PAR	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	
PER	0	17	0	0	0	0	0	1	0	3	6	6	1	0	0	0	
URU	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEN	0	11	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	2	2	0	0	
TOTAL	0	410	7	12	13	4	18	21	30	31	63	134	25	24	16	12	

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/45-2002/44)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	113	0,76	96	68	100
BOL	44	1,33	60	1,82	95	72	NR
BRA	679	1,29	504	0,96	98	72	89
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	22	0,77	91	64	100
CHI	86	1,43	108	1,80	93	89	92
COL	152	1,08	118	0,84	77	75	83
COR	16	0,99	0	0,00	0	0	NR
CUB	17	0,38	19	0,42	95	100	98
DOR	75	2,19	31	0,91	100	74	90
ECU	29	0,68	38	0,89	71	92	85
ELS	77	3,45	108	4,83	73	92	72
GUT	94	2,06	60	1,32	87	95	49
HAI	31	1,03	15	0,50	67	40	NR
HON	61	2,39	77	3,01	97	96	92
MEX	400	1,00	303	0,76	88	79	94
NIC	27	1,25	31	1,43	97	97	100
PAN	9	0,99	4	0,44	100	100	78
PAR	21	0,94	29	1,30	62	62	86
PER	98	1,14	87	1,01	94	93	41
URU	18	2,28	11	1,39	100	82	79
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	95	1,15	91	85	92
Total♦	2197	1,20	1833	1,01	90	79	88

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 44

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 44

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	6	6	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	1	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3	2	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	1
Total	14	13	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú