



Vigilancia de la Poliomielitis en las Américas

**Cuadro No. 1
Análisis de las muestras de heces de casos
Últimas 52 semanas (2001/47-2002/46)**

Lab.	País	Total*	SIN RESULTADOS			AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS					
			Aún no en lab.	<28 Días	>28 Días	% Asla-Miento	Negativo	Otros Enterovirus	Poliovirus		
									Pendiente	Vacunal	Salvaje
BEL	BRA	93	11	0	5	7,8	71	6	0	0	0
CAR	DOR	26	0	0	0	34,6	17	7	0	2	0
	GUY	3	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
	HAI	10	0	0	0	10,0	9	1	0	0	0
	HON	77	2	4	0	33,8	47	22	0	2	0
	JAM	8	0	1	0	0,0	7	0	0	0	0
	SUR	1	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0
	TRT	8	0	1	0	14,3	6	0	0	1	0
FIO	BRA	244	53	0	17	17,2	144	27	0	3	0
	PER	91	0	7	14	20,0	56	13	0	1	0
INC	ELS	89	0	0	0	15,7	75	14	0	0	0
	GUT	64	0	6	1	14,0	49	8	0	0	0
	NIC	27	1	0	1	16,0	21	4	0	0	0
	PAN	3	0	0	0	33,3	2	1	0	0	0
INDRE	MEX	269	0	0	13	25,0	192	61	0	3	0
INH	VEN	92	4	0	0	2,3	86	1	0	1	0
INS	COL	102	2	8	1	13,2	79	10	0	2	0
	ECU	36	0	0	0	16,7	30	6	0	0	0
ISP	CHI	76	1	1	3	4,2	68	3	0	0	0
MAL	ARG	103	2	7	0	18,1	77	14	0	3	0
	BOL	60	10	0	3	17,0	39	8	0	0	0
	CHI	28	0	0	0	14,3	24	4	0	0	0
	PAR	28	4	0	3	28,6	15	4	0	2	0
	URU	2	0	0	0	50,0	1	1	0	0	0
REC	BRA	96	9	0	7	6,3	75	5	0	0	0
TOTAL		1637	99	35	68	16,7	1195	220	0	20	0

* Cada muestra se refiere a un individuo

Muestras de casos solamente

**Cuadro No. 2
Poliovirus con diferenciación intratípica pendiente
Últimas 52 semanas (2001/47-2002/46)**

LAB	PAIS	POLIOVIRUS												TOTAL
		AÚN NO EN EL LAB,				EN LAB < de 4 semanas				EN LAB > de 4 semanas				
		P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	P1	P2	P3	Mez,	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muestras de casos
solamente



Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda

Vol, 17, No.46

Cuadro No, 1
Casos de parálisis flácida aguda bajo investigación
según semana de notificación

PAIS	Total	Acum.	Semana																
			2001	2002	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41	42	43	44	45
ARG	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
BOL	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	1	1	1	1	0
BRA	0	111	0	3	4	2	7	7	13	6	22	37	5	5	0	0	0	0	
CAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAR	0	10	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	0	1	0	1	0	
CHI	0	30	0	1	0	0	0	0	0	0	5	17	0	3	2	1	1	0	
COL	0	18	1	0	2	0	0	3	0	0	0	1	1	2	3	3	1	1	
COR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUB	0	17	2	4	1	1	4	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	
DOR	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	
ECU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
ELS	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	6	2	1	3	
GUT	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	0	0	0	
HAI	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
HON	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	
MEX	0	124	3	4	6	1	5	7	13	20	20	36	5	2	2	0	0	0	
NIC	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	
PAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
PAR	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	0	
PER	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	3	0	1	1	2	0	
URU	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEN	0	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	
TOTAL	0	409	7	12	13	4	18	18	29	29	56	118	26	25	25	13	11	5	

Cuadro No,2
Casos de PFA notificados, tasa por 100,000 <15 años,
% de casos investigados dentro 48 horas, % con 1 muestra
Adecuada y % de unidades notificando semanalmente

PAIS	Total 2001		Ultimas 52 semanas (2001/47-2002/46)				
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	% INV, <48 hrs,	%1 Mues-tra+	% Sitios Notifi-caron
ARG	141	0,95	114	0,77	96	68	100
BOL	44	1,33	60	1,82	95	72	NR
BRA	679	1,29	491	0,94	98	72	89
CAN	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CAR	18	0,63	20	0,70	90	65	100
CHI	86	1,43	108	1,80	92	89	93
COL	152	1,08	114	0,81	77	76	83
COR	16	0,99	0	0,00	0	0	NR
CUB	17	0,38	18	0,40	94	100	98
DOR	75	2,19	32	0,93	100	72	91
ECU	29	0,68	38	0,89	71	92	85
ELS	77	3,45	109	4,88	72	92	73
GUT	94	2,06	66	1,45	89	95	49
HAI	31	1,03	13	0,43	69	31	NR
HON	61	2,39	78	3,05	97	96	92
MEX	400	1,00	303	0,76	88	79	94
NIC	27	1,25	30	1,39	97	97	100
PAN	9	0,99	4	0,44	100	100	78
PAR	21	0,94	29	1,30	62	62	86
PER	98	1,14	91	1,06	96	95	91
URU	18	2,28	9	1,14	100	78	79
USA	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
VEN	104	1,26	94	1,14	90	83	91
Total♦	2197	1,20	1821	1,00	91	80	89

+ Tomado dentro de los primeros 14 días del inicio de parálisis
♦ Excluyendo Canadá y EUA NR - No reportes

Cuadro No, 3
Casos confirmados de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 46

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	0	0	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	0	0	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3*	3*	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	0	0	0
HAI	7*	7*	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	0
Total	10*	10*	0

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros
* Virus tipo 1 derivado de la vacuna

Cuadro No, 4
Casos compatibles de poliomieltis
por semana de inicio

Hasta la semana 46

PAIS	TOTAL 2001	Acumulado	
		2001	2002
ARG	0	0	0
BOL	0	0	0
BRA	6	6	0
CAN	0	0	0
CAR	0	0	0
CHI	0	0	0
COL	1	1	0
COR	0	0	0
CUB	0	0	0
DOR	3	3	0
ECU	0	0	0
ELS	0	0	0
GUT	1	1	0
HAI	3	3	0
HON	0	0	0
MEX	0	0	0
NIC	0	0	0
PAN	0	0	0
PAR	0	0	0
PER	0	0	0
URU	0	0	0
USA	0	0	0
VEN	0	0	1
Total	14	14	1

CAR Incluye informes de todos sus Países Miembros

LA POLIOMIELITIS HA SIDO ERRADICADA DE LAS AMÉRICAS
El último caso con poliovirus salvaje fue detectado el 5 de septiembre de 1991, en Perú