

**Comisión  
Nacional de  
Vigilancia de  
la Salud**

**Contenido**

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones en marcha	2
Recomendaciones generales	2

**Contactos**

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:

[www.digepi.saludgob.do](http://www.digepi.saludgob.do)

**SITUACION EN LAS AMERICAS**

La última actualización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al 1 de agosto informa la notificación de 508,122 casos sospechosos de chikungunya en 30 países del continente americano, incluyendo Bahamas el cual reportó transmisión autóctona.

En cuanto a las defunciones relacionadas con la epidemia, la OPS informa sobre 32 personas fallecidas por causas relacionadas con chikungunya.

Estas informaciones y las recomendaciones internacionales para la respuesta a chikungunya están disponibles en <http://www.paho.org>.

**SITUACION NACIONAL**

<b>MORBILIDAD Y MORTALIDAD</b>	<b>Del 20/7 al 26/7</b>
<b>CASOS Y HOSPITALIZACIONES</b>	
Total de casos sospechosos	370,141*
Casos sospechosos nuevos	23,730
Casos confirmados	71
No. de provincias con brotes confirmados	19
<b>MUERTES Y LETALIDAD</b>	
Total de muertes sospechosas	3


\*Incluye 38,549 casos sospechosos notificados tardíamente.

En la semana epidemiológica (SE) 30 se notificaron a nivel nacional 23,700 nuevos casos sospechosos de chikungunya. El total de casos sospechosos notificados hasta esta semana ascienden a 370,141 para una incidencia acumulada de 3,567 casos por cada 100,000 habitantes.

## Gráfico 1. Diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en la SE 30 del 2014, República Dominicana,

El Distrito Nacional y San Juan continúa encabezando la lista de las diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos. A este grupo se agregan las provincias de Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel. (Gráfico 1).

En términos generales en las regiones Metropolitana, Valdesia y Enriquillo mantienen una tendencia sostenida de decrecimiento en el número de nuevos casos sospechosos.



### Acciones en marcha

-Jornadas permanente de acciones de movilización de las organizaciones comunitarias para la integración de la ciudadanía a respuesta nacional.

-Continuación de las acciones intensificadas de control de los mosquitos mediante aplicación de larvicidas y fumigaciones con insecticidas autorizados.

-Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.

-Reforzamiento de la organización y supervisión de los servicios de salud para la atención de los enfermos de forma ambulatoria y los que requieren hospitalización.

### Recomendaciones generales

#### Atención de grupos de alto riesgo

Los servicios de salud y la población en general deben priorizar la atención inmediata a las siguientes poblaciones

1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres síntomas sospechosos durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto.
2. Menores de 1 año
3. Mayores de 65 años
4. Personas con enfermedad preexistente: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares insuficiencia renal crónica, o personas que viven con el VIH-SIDA, con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades hematológicas, como la falcemia.
5. Personas que presentan los siguientes signos de alarma
  - dificultad respiratoria
  - dolor abdominal intenso persistente
  - dolor de pecho
  - vómitos persistentes
  - convulsiones, parálisis, alteración de la conciencia
  - sangrados por orificios corporales
  - mareos posturales o postración
  - fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.