

### SITUACION EN LAS AMERICAS

Al 20 de junio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta 183,781 casos sospechosos de chikungunya, incluidos 22 defunciones. En Islas Vírgenes (USA) e Islas Turcas y Caicos se identificó transmisión autóctona por chikungunya, ascendiendo a 18 el número de países y territorios americanos afectados por la enfermedad.

Otros nueve países han recibido casos importados pero que aún no tiene transmisión autóctona.

Estas informaciones y las recomendaciones internaciones para la respuesta a chikungunya están disponibles en <http://www.paho.org>.

### SITUACION NACIONAL

<b>MORBILIDAD Y MORTALIDAD</b>	<b>Del 1/6 al 8/6</b>
<b>CASOS Y HOSPITALIZACIONES</b>	
Total de casos sospechosos	136,835
Casos sospechosos nuevos	30,591
No. de provincias con brotes confirmados	18
<b>MUERTES Y LETALIDAD</b>	
Total de muertes sospechosas	3

El laboratorio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha confirmado la circulación del virus de chikungunya en 18 provincias del territorio dominicano.

En este orden la Organización Panamericana de la salud señala que durante una epidemia, no es necesario someter a todos los pacientes a las pruebas confirmatorias, por lo que el vínculo epidemiológico puede ser suficiente.

En la SE-24 se notificaron 30,591 nuevos casos sospechosos de chikungunya, para un acumulado de 136,835 casos en todo el territorio nacional, lo que equivale a una tasa de incidencia de 1,318 casos por cada 100,000 habitantes. Duarte se incorpora a la lista de las diez provincias con mayor numero de casos esta semana (Gráfico 1).

#### Comisión

#### Nacional de Vigilancia de la Salud

#### Contenido

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones puesta en marcha	2
Recomendaciones generales	2

#### Contactos

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395


Página Web:

[www.digepisaludgob.do](http://www.digepisaludgob.do)

## Gráfico 1. Diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en la SE 24 del 2014, República Dominicana,

Con el objetivo de monitorear el impacto de la epidemia por chikunguya, el pasado 20 de junio, la Dirección General de Epidemiología inició una serie de encuestas. La primera fue realizada en una muestra de 942 usuarios de las 30 estaciones del Metro de Santo Domingo.

Los resultados reportan que hasta esa fecha, en el 68% (648) de los hogares del Gran Santo Domingo han ocurrido al menos un caso sospechoso de chikungunya (fiebre y dolor fuerte en las coyunturas) y el 44% (1706/3915) de las personas han tenido un cuadro compatible con la enfermedad. El 40% de los enfermos demandó atención en salud y 3% tuvo que ser hospitalizado por esta causa. Las tasas de ausentismo laboral escolar fueron de 29% y 20% respectivamente.



### Acciones en marcha

-Jornadas permanente de acciones de movilización de las organizaciones comunitarias para la integración de la ciudadanía a respuesta nacional.

-Continuación de las acciones intensificadas de control de mosquitos mediante fumigaciones con insecticidas autorizados.

-Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.

-Reforzamiento de la organización y supervisión de los servicios de salud para la atención de los enfermos que requieren hospitalización.

### Recomendaciones generales

#### Atención de grupos de alto riesgo

Los servicios de salud y la población en general deben priorizar la atención inmediata a las siguientes poblaciones

1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres síntomas sospechosos durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto.
2. Menores de 1 año
3. Mayores de 65 años
4. Personas con enfermedad preexistente: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, o personas que viven con el VIH-SIDA, con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades hematológicas, como la falcemia.
5. Personas con enfermedad febril, las presentan los siguientes signos de alarma

- dificultad respiratoria
- dolor abdominal intenso persistente
- vómitos persistentes
- convulsiones, parálisis, alteración de la conciencia
- sangrados por orificios corporales
- mareos posturales o postración
- fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.