

SITUACION EN LAS AMERICAS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su boletín del 27 de junio del presente, reporta 259,723 casos sospechosos de chikungunya, incluidos 22 defunciones.

El Salvador, se agrega a los países con transmisión autóctona, su-
mando 21 los países afectados.

Por otra parte México comenzó a notificar casos importados pero
aún no tiene transmisión autóctona.

Estas informaciones y las recomendaciones internaciones para la
respuesta a chikungunya están disponibles en <http://www.paho.org>.

SITUACION NACIONAL

MORBILIDAD Y MORTALIDAD	Del 15/6 al 21/6
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos	165,433
Casos sospechosos nuevos	28,598
No. de provincias con brotes confirmados	18
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes sospechosas	3

En la SE-25 se notificaron 28,598 nuevos casos sospechosos de chi-
kingunya en todo el territorio nacional, para un acumulado de 165,433
casos en todo el territorio nacional, lo que equivale a una tasa de inci-
dencia de 1,594 casos por cada 100,000 habitantes. No se notificaron
defunciones sospechosas esta semana.

Sigue pág.. 2

Sigue

Comisión

**Nacional de
Vigilancia de la
Salud**

Contenido

Situación del Chikungunya en Las Américas	1
Situación Nacional	1-2
Acciones puesta en marcha	2
Recomendaciones generales	2

Contactos

Teléfono: (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395


Pagina Web:

www.digepisalud.gob.do

Gráfico 1. Diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en la SE 25 del 2014, República Dominicana,

En la SE-25, San Cristóbal vuelve a encabezar la lista de las 10 provincias con mayor número de casos nuevos sospechosos de chikungunya, lo cual se debe a brotes que están ocurriendo en los municipios de Cambita Garabito y Villa Altigracia.

Por otra parte las provincias de La Vega y Espaillat pasaron a ocupar el 4to. y 9no. lugar respectivamente (Gráfico 1). En ambas provincias la mayor intensidad de transmisión se concentra en sus respectivos municipios cabeceras.



Acciones en marcha

-Jornadas permanente de acciones de movilización de las organizaciones comunitarias para la integración de la ciudadanía a respuesta nacional.

-Continuación de la acciones intensificadas de control de los mosquitos mediante aplicación de larvicidas y fumigaciones con insecticidas autorizados.

-Continuación de la campaña de educación a la población, haciendo énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos y el cuidado de los enfermos en el hogar.

-Reforzamiento de la organización y supervisión de los servicios de salud para la atención de los enfermos de forma ambulatoria y los que requieren hospitalización.

-

Recomendaciones generales

Atención de grupos de alto riesgo

Los servicios de salud y la población en general deben priorizar la atención inmediata a las siguientes poblaciones

1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres síntomas sospechosos durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto.
2. Menores de 1 año
3. Mayores de 65 años
4. Personas con enfermedad preexistente: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares insuficiencia renal crónica, o personas que viven con el VIH-SIDA, con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades hematológicas, como la falcemia.
5. Personas que presentan los siguientes signos de alarma

- dificultad respiratoria
- dolor abdominal intenso persistente
- dolor de pecho
- vómitos persistentes
- convulsiones, parálisis, alteración de la conciencia
- sangrados por orificios corporales
- mareos posturales o postración
- fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.