

2020

Weekly / Semanal **Influenza Report EW 40/ Reporte de Influenza SE 40**

Regional Update: Influenza & Other Respiratory Viruses /
Actualización Regional: Influenza y Otros virus respiratorios




**Octubre 13, 2020
13 de octubre de 2020**

*Data as of October 9, 2020/
Datos hasta el 9 de octubre de 2020*

*Prepared by PHE/IHM/Influenza Team/
Realizado por PHE/IHM/Equipo de Influenza*


FluNet

Percentage of reports to FluNet during the last four weeks (EW 37-40, 2020)
Porcentaje de informes a FluNet durante las últimas cuatro semanas (SE 37-40 de 2020)



FluID

Percentage of reports to FluID during the last four weeks (EW 37-40, 2020)
Porcentaje de informes a FluID durante las últimas cuatro semanas (SE 37-40 de 2020)



Map Production /Producción del mapa: PAHO/WHO/OPS/OMS.

Data Source /Fuente de datos:

Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States Reports to the informatics global platforms [FluNet](#) and [FluID](#)
Informe de los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de [FluNet](#) y [FluID](#)

[Go to Index /](#)
[Ir al Índice](#)

WEEKLY REPORT DATA SOURCES

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/

and http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/fluid/en/;

and reports/weekly bulletins that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: [FluNet](#) y [Fluid](#); y de los informes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con OPS/OMS.

Note: Compared to the same period of the previous years, the current influenza surveillance data should be interpreted in light of the ongoing COVID-19 pandemic, which may have influence, to differing extents, health seeking behaviors, staffing/routines in sentinel sites, and testing capacities in Member States. The various social and physical distancing measures implemented by Member States to reduce SARS-CoV2 virus transmission may also have played a role in reducing substantially or even complete influenza virus transmission.

Nota: en comparación con el mismo período de los años anteriores, los datos actuales de vigilancia de la influenza deben interpretarse a la luz de la pandemia de COVID-19 en curso, que puede tener influencia en diferentes grados, comportamientos de búsqueda de salud, personal / rutinas en sitios centinela, y capacidades de prueba en los Estados miembros. Las diversas medidas de distanciamiento social y físico implementadas por los Estados miembros para reducir la transmisión del virus SARS-CoV2 también pueden haber desempeñado un papel en la reducción sustancial o incluso completa, en la transmisión del virus de la influenza.

PAHO INFLUENZA LINKS

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO FluNet: http://ais.paho.org/php/viz/ed_flu.asp

PAHO Fluid: <http://ais.paho.org/php/viz/flumart2015.asp>

Influenza regional reports / Informes regionales de influenza

In English: <https://www.paho.org/hq/influenzareport>

En español: www.paho.org/reportesinfluenza

Severe acute respiratory infections network - SARInet
Red de las infecciones respiratorias agudas graves - SARInet:

<http://www.sarinet.org>

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

REPORT INDEX

ÍNDICE DE LA ACTUALIZACIÓN

Section	Content	Page
1	<u>Weekly Summary / Resumen Semanal</u>	5
2	<u>Influenza Global Update 378/Actualización de influenza a nivel mundial 378</u>	7
3	<u>Overall Influenza and RSV circulation / Circulación general de los virus influenza y VRS</u>	8
4	<u>Overall ORV circulation and antigenic characterization of influenza viruses, 2017-20/Circulación general de OVR y caracterización antigenica de los virus influenza, 2017-20</u>	9
5	<u>Weekly and Cumulative numbers / Números semanales y acumulados</u>	10
6	<u>Epidemiological and Virologic updates by country / Actualización epidemiológica y virológica por país</u>	11
7	<u>Acronyms / Acrónimos</u>	40

WEEKLY SUMMARY (ENGLISH)

North America: Influenza activity remained low in [Canada](#), the [United States](#), and [Mexico](#). In [Canada](#), SARS-CoV-2 activity continued to increase. In the [United States](#), SARS-CoV-2 activity continued elevated and increasing in some states. In [Mexico](#), SARS-CoV-2 activity continued elevated but decreasing.

Caribbean: Influenza and other respiratory virus activity remained low in the subregion. In [Haiti](#), SARI activity increased above epidemic levels. In [Dominican Republic](#) and [Jamaica](#) SARI activity decreased to epidemic levels.

Central America: Influenza and other respiratory virus activity remained low in the subregion. In [Costa Rica](#) and [Honduras](#), SARI activity continued elevated but decreasing and associated to detections of SARS-CoV-2. In [Guatemala](#), and [Nicaragua](#), SARS-CoV-2 activity continued to decrease.

Andean: Influenza and other respiratory virus activity remained low and SARS-CoV-2 activity continued to decrease in the sub-region.

Brazil and Southern Cone: Influenza activity continued low and below the seasonal levels for this period. In [Argentina](#), influenza activity increased above the epidemic level; with equal predominance of B/Victoria and B/Yamagata in the last month. SARS-CoV-2 activity continued elevated and increasing. In [Chile](#) and [Paraguay](#), SARS-CoV-2 activity remained elevated but decreasing.

Global: Globally, influenza activity was reported at lower levels than expected for this time of the year. In the temperate zones of the southern hemisphere, the influenza season remained low or below baseline. Despite continued or even increased testing for influenza in some countries in the southern hemisphere, very few influenza detections were reported. In the temperate zone of the northern hemisphere, influenza activity remained below inter-seasonal levels. Severe acute respiratory infection (SARI) activity, likely due to COVID-19, decreased in most reporting countries. In tropical Africa and Southern Asia there were sporadic or no influenza detections across reporting countries. In South East Asia, increased influenza detections were reported in Cambodia and Lao People's Democratic Republic (PDR). Worldwide, of the very low numbers of detections reported, seasonal influenza A(H3N2) viruses accounted for the majority of detections.

Note: PAHO/WHO encourages the testing of routine influenza surveillance and SARS-CoV-2 samples from sentinel and non-sentinel sources where resources are available and invites all countries/areas/territories to report this information (indicating the source, sentinel and/or non-sentinel) to routine, established regional and global platforms. (See the [Operational considerations for COVID-19 surveillance using GISRS guidance](#)).

RESUMEN SEMANAL (ESPAÑOL)

América del Norte: la actividad de la influenza se mantuvo baja en [Canadá](#), [Estados Unidos](#) y [México](#). En [Canadá](#), la actividad del SARS-CoV-2 sigue aumentando. En los [Estados Unidos](#), la actividad del SARS-CoV-2 continuó elevada y en aumento en algunos estados. En [México](#), la actividad del SARS-CoV-2 continuó elevada, pero disminuyendo.

Caribe: la influenza y otros virus respiratorios se mantuvieron bajos en la subregión. En [Haití](#), la actividad de la IRAG aumentó sobre los niveles epidémicos. En la [República Dominicana](#) y [Jamaica](#), la actividad de la IRAG disminuyó a niveles epidémicos.

América Central: la influenza y otros virus respiratorios se mantuvieron bajos en la subregión. En [Costa Rica](#) y [Honduras](#) la actividad de la IRAG continuó elevada aunque en disminución, y asociada con detecciones de SARS-CoV-2. En [Guatemala](#) y [Nicaragua](#), la actividad de SARS-CoV-2 continuó disminuyendo.

Andina: la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja y la actividad del SARS-CoV-2 continuó disminuyendo en la subregión.

Brasil y Cono Sur: la actividad de la influenza continuó baja y por debajo de los niveles estacionales para este período. En [Argentina](#), la actividad de influenza aumentó sobre el nivel epidémico; con igual predominio de B/Victoria y B/Yamagata en el último mes. La actividad del SARS-CoV-2 continuó elevada y en aumento. En [Chile](#) y [Paraguay](#), la actividad de SARS-CoV-2 permaneció elevada, aunque en descenso.

Global: a nivel mundial, la actividad de la influenza se notificó en niveles más bajos de lo esperado para esta época del año. En las zonas templadas del hemisferio sur, la temporada de influenza se mantuvo baja o por debajo de la línea de base. A pesar de que las pruebas de influenza continúan o incluso aumentan en algunos países del hemisferio sur, se notificaron muy pocas detecciones de influenza. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de la influenza se mantuvo por debajo de los niveles entre estaciones. La actividad de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), probablemente debido al COVID-19, disminuyó en la mayoría de los países informantes. En África tropical y el sur de Asia, hubo detecciones de influenza esporádicas o nulas en los países informantes. En el sudeste de Asia, se informó un aumento de las detecciones de influenza en Camboya y la República Democrática Popular Lao (PDR). En todo el mundo, del muy bajo número de detecciones notificadas, los virus de la influenza estacional A(H3N2) representaron la mayoría de las detecciones.

Nota: La OPS / OMS promueve la prueba de muestras de vigilancia de influenza de rutina de fuentes centinelas y no centinelas, para el virus del SARS-CoV-2, donde haya recursos disponibles, e invita a todos los países / áreas / territorios a notificar esta información (idealmente indicando qué datos provienen de sitios centinela) a las plataformas regionales y globales de rutina y establecidas. (Véanse las [Consideraciones operativas para la vigilancia COVID-19 utilizando la guía GISRS](#)).


Influenza Global Update 378 / Actualización de influenza a nivel mundial 378

12 October 2020 / 12 de octubre de 2020

Based on data up to September 29, 2020 / basado en datos hasta el 29 de septiembre de 2020


While influenza testing in Australia and New Zealand is maintained or even increased, very few influenza viruses were detected. In South Africa, no influenza viruses were detected in ILI and pneumonia samples from sentinel sites. In Western Africa, influenza detections of both influenza A(H3N2) and B viruses were reported in Côte d'Ivoire and Burkina Faso. In Middle and Eastern Africa, the reporting rate was low. In Southern Asia, sporadic influenza detections were reported in Afghanistan and Sri Lanka in recent weeks. In South East Asia, influenza activity of predominantly influenza A(H3N2) increased in Cambodia and Lao PDR in recent weeks. In Ireland, ILI activity increased and was reported above the epidemic threshold earlier than in the previous years, likely reflecting increased SARS-CoV-2 circulation. In Central Asia and in Northern Africa, there were no influenza updates for this reporting period. In Western Asia, there were no influenza detections. Of the samples tested for influenza in Oman and the United Arab Emirates none tested positive for influenza. In East Asia, influenza illness indicators and influenza activity remained at inter-seasonal levels in most reporting countries. ILI activity appeared to increase in Southern China and was reported at higher level than previous years. / Si bien las pruebas de influenza en Australia y Nueva Zelanda se mantienen o incluso aumentan, se detectaron muy pocos virus de influenza. En Sudáfrica, no se detectaron virus de influenza en muestras de neumonía y ETI de sitios centinela. En África occidental, se notificaron detecciones de influenza de los virus de influenza A(H3N2) y B en Costa de Marfil y Burkina Faso. En África media y oriental, la tasa de notificación fue baja. En el sur de Asia, se notificaron detecciones esporádicas de influenza en Afganistán y Sri Lanka en las últimas semanas. En el sudeste asiático, la actividad de la influenza predominantemente de influenza A(H3N2) aumentó en Camboya y la República Democrática Popular Lao en las últimas semanas. En Irlanda, la actividad de la ETI aumentó y se notificó por encima del umbral epidémico más temprano que en años anteriores, probablemente reflejando una mayor circulación del SARS-CoV-2. En Asia central y en el norte de África, no hubo actualizaciones de influenza para este período de informe. En Asia occidental, no hubo detecciones de influenza. De las muestras analizadas para influenza en Omán y los Emiratos Árabes Unidos, ninguna dio positivo para influenza. En el este de Asia, los indicadores de enfermedad por influenza y la actividad de la influenza se mantuvieron en niveles entre estaciones en la mayoría de los países informantes. La actividad de la ETI pareció aumentar en el sur de China y se notificó a un nivel más alto que en años anteriores.

National Influenza Centres (NICs) and other national influenza laboratories from 57 countries, areas or territories reported data to FluNet for the time period from 14 September 2020 to 27 September 2020. The WHO GISRS laboratories tested more than 50 521¹ specimens during that time period. A total of, 99 specimens were positive for influenza viruses, of which 60 (60.6%) were typed as influenza A and 39 (39.4%) as influenza B. Of the sub-typed influenza A viruses, none were influenza A(H1N1)pdm09 and 50 (100%) were influenza A(H3N2). Of the characterized B viruses, 5 (22.7%) belonged to the B-Yamagata lineage and 17 (77.3%) to the B/Victoria lineage. / Los Centros Nacionales de Influenza (NIC) y otros laboratorios nacionales de influenza de 57 países, áreas o territorios reportaron sus datos a FluNet para el período comprendido entre el 14 y el 27 de septiembre de 2020. Los laboratorios GISRS de la OMS analizaron más de 50 521¹ muestras durante ese período. Un total de 99 muestras fueron positivas para los virus influenza, de las cuales 60 (60,6%) se tipificaron como influenza A y 39 (39,4%) como influenza B. De los virus influenza A, a los cuales se les identificó el subtipo, ninguno fue influenza A(H1N1)pdm09 y 50 (100%) fueron influenza A(H3N2). De los virus B caracterizados, 5 (22,7%) pertenecían al linaje B/Yamagata y 17 (77,3%) al linaje B/Victoria.




¹ It includes data only from countries reporting on positive and negative influenza specimens. Incluye datos únicamente de países que notifican muestras positivas y negativas para influenza.

Influenza circulation by subregion, 2014-20 Circulación virus influenza por subregión, 2014-20



Respiratory syncytial virus (RSV) circulation by Subregion, 2014-20


Circulación virus respiratorio sincitial (VRS) por subregión, 2014-20



*To view more lab data, view here. / Para ver más datos de laboratorio, vea aquí.


Other respiratory viruses (ORV) circulation by subregion, 2017-20

Circulación de otros virus respiratorios (OVR) por subregión, 2017-20



Genetic Characterization of Influenza Virus by Subregion, 2020

Caracterización Genética de los Virus Influenza por Subregión, 2020



Genetic Group

■ 3C.2a ■ 3C.2a1 ■ 3C.3a ■ 6B.1 ■ 6B.1A ■ V1A ■ V1A.1 ■ Y3

Weekly and cumulative numbers of influenza and other respiratory viruses, by country and EW, 2020^{2,3} Números semanales y acumulados de influenza y otros virus respiratorios, por país y SE, 2020^{4,5}

EW 40, 2020 / SE 40, 2020																					
		N samples/ muestras	A(H3N2)	A(H1N1)pdm09	Influenza A Non-Subtyped	Influenza A non- subtypable	B Victoria	B Victoria del 162/163	B Yamagata	B linaje no determinado	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza	VSR	% RSV/VSR (+)	Coronavirus	SARS-CoV-2*	SARS-CoV-2 (+) %	Metapneumovir.	Rinovirus*	% All Positive Samples (+)
North America/ América del Nor.		32,297	0	0	0					0	0.0%	16	1	5	0%	4	12,800	2.4%	0	669	2.2%
Mexico		960	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	22,524	35.1%	0	0	0.0%
Caribbean/ Caribe		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	27	5.9%	0	0	0.0%
Haiti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0			0	0	
Jamaica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0			0	0	
Suriname		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0			0	0	
Central America/ América Central		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	200	41.8%	0	0	0.0%
Costa Rica		16									0.0%					3	25.0%		4	25.0%	
Guatemala		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	36	10.2%	0	0	0.0%
Honduras		73									0.0%			1	1%	97	100.0%			1.4%	
Nicaragua																					
Andean/ Andina		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	2,896	100.0%	0	0	0.0%
Bolivia		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0	3	10%	0	11,845	9.7%	0	0	13.3%
Colombia		14	0	0							0.0%	0	0	0	0%	1,200	20.0%			0.0%	
Ecuador		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	2,698	10.9%	0	0		
Brazil & Southern Brazil		7									0.0%					1	14.3%		3	42.9%	
Cone/ Brasil y Cono Sur		882									0.0%	1	3	0	0%				1	0.6%	
Chile		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	13	61.9%	0	0	0.0%
Chile_IRAG		2									0.0%										
Paraguay		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0.0%	0	0	40.0%
Grand Total		34,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	18	1	12	0%	4	54,340	7.3%	1	676	2.1%

These are the raw numbers provided in the country's FluNet update (Not the smoothed averages)
Estos son los números crudos proporcionados en la actualización FluNet del país (no los promedios suavizados)

*Please note blank cells indicate N/A.
*Por favor notar que las celdas en blanco indican N/A.

EW 39, 2020 / SE 39, 2020																					
*Note: These countries reported in EW 40, 2020, but have provided data up to EW 39. *Nota: Estos países reportaron en la SE 40 de 2020, pero han enviado los datos hasta la SE 39.																					
		N samples/ muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A (H1N1)pdm09	Influenza A not subtyped/otro s.	Influenza A not subtipable/no s.	Influenza B	Influenza B Victoria del 162/163	Influenza B Victoria del 162/164	Influenza B Yamagata	Influenza B linaje undetermined	Adenovirus	RSV/VRS	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	SARS-CoV-2*	Metapneumovir.	Rinovirus*	Parainfluenza*	% All Positive Samples (+)
Brazil & Southern Brazil		267	0	0	0	0	5	1.9%	14	0	0%	0	0	0	0	72,437	0	0	0	7.1%	
Argentina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	180	0	0	0	0	
Paraguay IRAG		267	0	0	0	0	5	1.9%	14	0	0%	0	0	0	0	72,617	0	0	0	7.1%	

EW 37, 2020 - EW 40, 2020 / SE 37, 2020 - SE 40, 2020																						
Influenza B																						
		N samples/ muestras	Influenza (H3N2)*	Influenza A/ (H1N1)pdm09*	Influenza A/ non-subtyped*	Influenza A/ non-subtipable/no s.	Influenza B Victoria*	Influenza B Victoria del 162/163	Influenza B Victoria del 162/164	Influenza B Yamagata*	Influenza B linaje undetermined	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza*	RSV/VRS*	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	SARS-CoV-2*	Metapneumo.	Rinovirus*	% All Positive Samples (+)
North America/ América del Norte		159,095	0	0	1	0	0	0	0	7	0.0%	62	10	15	0.0%	0	8	32,976	5	2,741	1.8%	
Mexico		4,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	136,923	0	5	0.1%	
USA		10,974	1	0	12	0	0	0	0	17	0.3%	0	0	10	0.1%	0	0	27,769	0	0	0.3%	
Caribbean/ Caribe		250	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
Aruba		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
Grenada		193	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	
Haiti		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
St. Vincent & the Grenadines		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
Suriname		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
Trinidad and Tobago		328	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	2	1	0	0.0%	0	0	1,673	0	5	3.4%	
Central America/ América Central		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	39	0	13	21.5%
Guatemala		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	3,352	0	0	0.0%
Honduras		251	0	0	1	0	0	0	0	0	0.4%	0	0	1	0.4%	0	0	502	0	0	0.8%	
Nicaragua		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	
Andean/ Andina		126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0	3	2.4%	0	0	25,706	0	0	3.2%	
Bolivia		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	6,021	0	0	0.0%	
Brazil & Southern Cone/ Argentina		752	2	0	0	5	0	9	4	27%	36	0	0	0.0%	0	0	0	211,591	0	0	7.4%	
Cone/ Brasil y Cone Sur		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	1	2.6%	0	0	7	0	8	23.1%	
Brazil		3,426	0	0	3	0	0	0	0	0	0.1%	11	3	7	0.2%	0	0	0	0	15	0	1.1%
Chile		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	123	0	0	0.0%
Chile_IRAG		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0.0%
Paraguay		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	1	0	0	0.0%	
Uruguay		42	5	0	17	5	0	0	9	28	0.0%	112	14	37	0.0%	0	9	462,851	20	2,772	1.7%	

Total Influenza B, EW 37, 2020 - 40, 2020

	Influenza B	B Victoria	B Victoria del 162/163	B Victoria del 162/164	B Yamagata	B linaje non-determ.	% B Victoria	% B Vic del 162/163	% B Vic del 162/164	% B Yamagata
North America/ América del Norte	24	0	0	0</						

EPIDEMIOLOGIC AND VIROLOGIC UPDATE OF INFLUENZA & OTHER RESPIRATORY VIRUSES BY COUNTRY


ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y VIROLÓGICA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS POR PÁIS

North America / América del Norte

Canada / Canadá


- During EW 40, no influenza detections were recorded with influenza B and A viruses co-circulating in previous weeks (Graph 1). Few respiratory syncytial virus detections were recorded, with co-circulation of rhinovirus, adenovirus, among other respiratory viruses. SARS-CoV-2 percent positive increased slightly and was at 2% (Graph 2). As of October 12 among 8 191 592 persons tested for SARS-CoV-2, 182 839 (2.2%) were positive. The three provinces with the highest number of cases recorded were Quebec (86 976), Ontario (59 139), and Alberta (19 995) (Graph 3).The age groups with the highest proportion of cases were 30-49 years (29.9%), followed by adults aged 20-29 years and 50-59 years (18.4% and 13.7%, respectively) (Graph 4). / En la SE 40, no se registraron detecciones de influenza con la circulación concurrente de los virus influenza B y A en semanas previas (Gráfico 1). Se registraron pocas detecciones de virus respiratorio sincitrial, con la circulación concurrente de rinovirus y adenovirus entre otros virus respiratorios. El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 aumentó ligeramente a 2% (Gráfico 2). Al 12 de octubre, de 8 191 592 personas sometidas a la prueba del SARS-CoV-2, 182 839 (2,2%) dieron positivo. Las tres provincias con el mayor número de casos registrados fueron Quebec (86 976), Ontario (59 139) y Alberta (19 995) (Gráfico 3). Los grupos de edad con mayor proporción de casos fueron los de 30 a 49 años (29,9%), seguidos de los adultos de 20 a 29 años y de 50 a 59 años (18,4% y 13,7%, respectivamente) (Gráfico 4).

Graph 1. Canada: Influenza virus distribution, EW 40, 2014–20
Distribución de virus de influenza, SE 40, 2014–20



Graph 3. Canada: Number of COVID-19 total cases in Canada on October 12, 2020


Número total de casos de COVID-19 en Canadá, al 12 de octubre de 2020



Source: Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update. <https://www.canada.ca/en/public-health>

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Graph 2. Canada: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution EW 40, 2015–20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2 SE 40, 2015–20



Graph 4. Canada: Age distribution of COVID-19 cases, as of October 12, 2020

Distribución de los casos de COVID-19 por edad, al 12 de octubre de 2020

Figure 3. Age distribution of COVID-19 cases (n=175,927) in Canada as of October 12, 2020, 7 pm EDT




Source: Epidemiological summary of COVID-19 cases in Canada <https://www.canada.ca/en/public-health>


United States / Estados Unidos

- During EW 40, few influenza detections (one sample) were reported, with influenza A viruses circulating (Graph 1). The percentage of outpatient visits for influenza-like illness (1.1%) remained the same compared to the previous week, below the national baseline (2.6%) and was below levels of previous seasons (Graph 2). In EW 40, 7.0% of reported deaths were due to pneumonia, influenza, or COVID-19, which is lower than the last week and remained above the epidemic threshold for EW 40 (5.6%) (Graph 3). From March 1 through October 3, 2020, 59 728 laboratory-confirmed COVID-19-associated hospitalizations were reported to the COVID-19-Associated Hospitalization Surveillance Network (COVID-NET), 94.3% had information on race and ethnicity. The rate for Hispanic or Latino (375.4) was the highest (Graph 4). / En la SE 40, se reportaron pocas detecciones de influenza (una muestra), con la circulación de los virus influenza A (Gráfico 1). El porcentaje de consultas externas por enfermedades similares a la influenza (1,1%) se mantuvo igual en comparación con la semana anterior, por debajo de la línea de base nacional (2,6%) y estuvo por debajo de los niveles de temporadas anteriores (Gráfico 2). En la SE 40, el 7,0% de las defunciones reportadas se debieron a neumonía, influenza o COVID-19, menor que la semana pasada y se mantuvo por encima del umbral epidémico de la SE 40 (5,6%) (Gráfico 3). Desde el 1 de marzo hasta el 3 de octubre de 2020, se notificaron 59 728 hospitalizaciones asociadas a COVID-19 confirmadas por laboratorio a la Red de vigilancia de hospitalizaciones asociadas a COVID-19 (COVID-NET), el 94,3% tenía información sobre raza y etnia. La tasa de hispanos o latinos (375,4) fue la más alta (Gráfico 4).

Graph 1. USA: Influenza virus distribution, EW 40, 2020
2019-2020 season
Distribución de virus de influenza, SE 40 de 2020
Temporada 2019-2020




Graph 3. USA: Pneumonia, influenza and COVID-19 mortality data as of October 8, 2020
Mortalidad por neumonía, influenza y COVID-19,
datos al 8 de octubre de 2020




Source: COVIDView. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov>

Graph 2. USA: Percentage of visits for ILI, EW 40, 2009-21
Porcentaje de visitas por ETI, SE 40, 2009-21



Graph 4. USA: Laboratory-confirmed COVID-19-associated hospitalizations (per 100,000 population) by age group
Hospitalizaciones asociadas a COVID-19 confirmadas por laboratorio (por 100.000 habitantes) por grupo de edad




Content source: [CDC - Coronavirus Disease 2019 \(COVID-19\)](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov)

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Mexico / México

- No influenza detections were recorded during the past week. Influenza and RSV activity remained at interseasonal levels, with the circulation of influenza A viruses reported in previous weeks (Graphs 1, 2, and 3). During EW 40, no RSV detections were recorded. SARS-CoV-2 percent positivity decreased compared to previous weeks and was at 37% (Graph 2). No influenza-associated SARI/ILI cases were reported during the last week. No SARI/ILI deaths were recorded in EW 40 (Graphs 4 and 5). The five states with the highest cumulative number of laboratory-confirmed SARS-CoV-2 cases were Mexico City, Nuevo Leon, Mexico State, Sonora, and Veracruz (Graph 6). / No se registraron detecciones de influenza durante la semana pasada. La actividad de la influenza y el VRS se mantuvo en los niveles interestacionales, con la circulación de los virus influenza A reportada en las semanas anteriores (Gráficos 1, 2 y 3). En la SE 40, no se registraron detecciones de VRS. El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con las semanas anteriores y fue del 37% (Gráfico 2). No se notificaron casos de IRAG / ETI asociados a la influenza durante la última semana. No se registraron muertes por IRAG / ETI en la SE 40 (Gráficos 4 y 5). Los cinco estados con el mayor número acumulado de casos de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio fueron Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Sonora y Veracruz (Gráfico 6).

Graph 1. Mexico: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución de virus influenza, SE 40, 2014-20



Graph 3. Mexico: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020
(compared to 2010-19)




Graph 5. Mexico: SARI/ILI-influenza deaths, EW 40, 2020
Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza, SE 40 de 2020



*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Graph 2. Mexico: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution
EW 40, 2015-20



Graph 4. Mexico: SARI/ILI-influenza positive, EW 40, 2020
Casos de IRAG/ETI positivos a influenza, SE 40 de 2020



Graph 6. Mexico: Cumulative number of laboratory-confirmed SARS-CoV-2 cases by state, EWs 2*- 40, 2020
Número acumulado de casos de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio por estado, SE 2*- 40 de 2020




* Epi week when the country started to report SARS-CoV-2

Caribbean/ Caribe


CARPHA

- During EW 39, influenza activity continued at baseline levels compared to previous seasons for the same time period; influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2), and B Yamagata viruses were detected in early March (Graph 1). RSV activity remained at baseline levels (Graph 2). Respiratory samples were received from Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago. / En la SE 39, la actividad de la influenza continuó en los niveles de referencia en comparación con temporadas anteriores durante el mismo período de tiempo; los virus influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B/Yamagata se detectaron a principios de marzo (Gráfico 1). La actividad del VRS se mantuvo en niveles de referencia (Gráfico 2). Se recibieron muestras respiratorias de Granada, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Graph 1. CARPHA: Influenza virus distribution, EW 39, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 39, 2015-20



Graph 2. CARPHA: Influenza and RSV distribution, EW 39, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 39, 2015-20




To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Dominican Republic / República Dominicana

- Since EW 29, the number of cases with severe acute respiratory infection (SARI) have decreased and were above the epidemic threshold at a low level of activity compared to levels observed in previous seasons (Graph 1). During EW 39, 47 (6.6%) of 710 total hospitalizations were SARI cases and one (3.7%) out of 27 cases admitted to the ICU was a SARI case. The age group with the highest percentage of SARI cases were those aged 20-29 years representing 25.5% of cases. One (0.6%) ILI case was identified among 179 consultations recorded during EW 39. / Desde la SE 29, el número de casos con infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha disminuido y se encuentra por encima del umbral epidémico en un nivel de actividad bajo respecto a los niveles observados en temporadas anteriores (Gráfico 1). Durante la SE 39, 47 (6,6%) del total de 710 hospitalizaciones fueron casos de IRAG y uno de los 27 casos ingresados en UCI (3,7%) fue un caso de IRAG. El grupo de edad con mayor porcentaje de casos de IRAG fue el de 20 a 29 años que representa el 25,5% de los casos. Se identificó un caso de ETI (0,6%) entre las 179 consultas registradas durante la SE 39.

Graph 1. Dominican Republic: SARI hospitalizations/100 hospitalizations, EW 39, 2020 (compared to 2018-19)
Hospitalizaciones de IRAG/100 hospitalizaciones, SE 39 de 2020 (comparado con 2018-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

French Territories / Territorios Franceses

- Guadeloupe:** During EW 40, 789 new COVID-19 cases were confirmed. The number of acute respiratory infections (ARI) teleconsultations decreased to 1 380 cases, lower than in EW 39 (Graph 1). **Saint-Martin:** During EW 40, 33 new COVID-19 cases were confirmed. In EW 40, 40 ARI teleconsultations were recorded, a decrease compared to the previous week (Graph 2). **Saint-Barthelemy:** Ten new COVID-19 cases were confirmed during EW 40. Eleven ARI teleconsultations were recorded, compared to ten teleconsultations the previous week (Graph 3). **Martinique:** As of EW 40, 1 842 persons tested positive for COVID-19. The number of ARI consultations during EW 40 was 320, increased in comparison to the previous week (140) (Graph 4). **Guiana:** As of October 8, 10 128 cases of COVID-19 were confirmed. The number of new cases hospitalized increased slightly compared to the previous week. The number of new hospitalizations decreased at CHK, remained the same at CHOG and increased at CHC, compared to the previous week (Graph 5). / **Guadalupe:** en la SE 40 se confirmaron 789 casos de COVID-19 nuevos. El número de teleconsultas por infecciones respiratorias agudas (IRA) disminuyó a 1 380 casos, menor que en la SE 39 (Gráfico 1). **San Martín:** en la SE 40 se confirmaron 33 nuevos casos de COVID-19. En la SE 40 se registraron 40 teleconsultas de IRA, una disminución con respecto a la semana anterior (Gráfico 2). **San Bartolomé:** se confirmaron diez nuevos casos de COVID-19 durante la SE 40. Se registraron once teleconsultas de IRA, frente a diez teleconsultas la semana anterior (Gráfico 3). **Martinica:** hasta la SE 40, 1 842 personas dieron positivo para COVID-19. El número de consultas de IRA durante la SE 40 fue de 320, mayor respecto a la semana anterior (140) (Gráfico 4). **Guayana:** al 8 de octubre, se confirmaron 10 128 casos de COVID-19. El número de nuevos casos hospitalizados aumentó ligeramente en comparación con la semana anterior. El número de nuevas hospitalizaciones disminuyó en CHK, se mantuvo igual en CHOG y aumentó en CHC, en comparación con la semana anterior (Gráfico 5).

Graph 1. Guadeloupe: Estimated number of clinically suggestive cases of acute respiratory infection and attributable proportion to COVID-19, EWS 13-40, 2020*

Número estimado de casos clínicamente sugestivos de infecciones respiratorias agudas y parte atribuible a COVID-19, de la semana 13-40 de 2020




Graph 3. Saint-Barthelemy: Estimated number of clinically suggestive cases of acute respiratory infection and attributable proportion to COVID-19, EWS 13-40, 2020*

Número estimado de casos clínicamente sugestivos de infecciones respiratorias agudas y parte atribuible a COVID-19, de la semana 13-40 de 2020




Graph 2. San Martín: Estimated number of clinically suggestive cases of acute respiratory infection and attributable proportion to COVID-19, EWS 13-40, 2020*

Número estimado de casos clínicamente sugestivos de infecciones respiratorias agudas y parte atribuible a COVID-19, de la semana 13-40 de 2020




Graph 4. Martinique: Estimated weekly number of ARI consultations and attributable to COVID-19, EWS 13-40, 2020*

Número semanal estimado de consultas por IRA y atribuibles a COVID-19, semanas 13-40 de 2020



Graph 5. French Guiana: Number of new COVID-19 hospitalizations by week and hospital*

Número de nuevas hospitalizaciones por COVID-19 por semana y hospital



* CHC: Centre Hospitalier de Cayenne, CHOG : Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, CHK : Centre Hospitalier de Kourou.


* Point épidémio régional. Spécial COVID-19. [GLP – MAF - BLM](#), [MTQ](#), [GUF](#) Punto epidémico regional. Especial COVID-19. Disponible aquí: [GLP – MAF - BLM](#), [MTQ](#), [GUF](#)

**To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Grenada / Granada

- Since EW 11, no influenza virus activity has been recorded, with influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2), and B/Victoria viruses co-circulating early in March (Graph 1). RSV activity has not been reported this year. In EW 39, no influenza or other respiratory virus activity were reported. / Desde la SE 11, no se ha registrado actividad del virus de la influenza, con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B/Victoria a principios de marzo (Gráfico 1). No se ha notificado actividad del VRS este año. En la SE 39, no se notificaron detecciones de influenza u otra actividad de virus respiratorio.


Graph 1. Grenada: Influenza virus distribution EW 39, 2016-20
Distribución de virus influenza SE 39, 2016-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#)

- During EW 40, no influenza detections were recorded. Influenza A(H1N1)pdm09 and B/Victoria viruses circulation was last recorded in April (Graph 1). During 2020, respiratory syncytial virus detections have not been reported, with influenza activity at baseline levels. In EW 40, 6.3% (27) of samples tested positive for SARS-CoV-2, an increase compared to the previous week (Graph 2). Since EW 14, the influenza percent positive has been below the levels observed in past seasons for the same period (Graph 3). SARS-CoV-2 detections remained the same compared to the previous week (Graph 4). Since EW 25, the number of SARI hospitalizations trended upward, surpassed the epidemic threshold in EW 29, and was at low activity levels during EW 40 compared to previous seasons for the same time (Graph 5). / En la SE 40 no se registraron detecciones de influenza. La circulación de los virus Influenza A(H1N1)pdm09 y B/Victoria se registró por última vez en abril (Gráfico 1). Durante 2020, no se han notificado detecciones de virus respiratorio sincitial, con la actividad de la influenza en los niveles de referencia. En la SE 40, el 6,3% (27) de las muestras dieron positivo para SARS-CoV-2, un aumento en comparación con la semana anterior (Gráfico 2). Desde la SE 14, el porcentaje de influenza positiva ha estado por debajo de los niveles observados en temporadas pasadas para el mismo período (Gráfico 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 se mantuvieron iguales en comparación con la semana anterior (Gráfico 4). A partir de la SE 25, el número de hospitalizaciones por IRAG mostró una tendencia ascendente, superó el umbral epidémico en la SE 29 y se mantuvo en niveles bajos de actividad durante la SE 40 en comparación con temporadas anteriores para el mismo período (Gráfico 5).


Graph 1. Haiti: Influenza virus distribution EW 40, 2014-20
Distribución de virus influenza SE 40, 2014-20



Graph 3. Haiti: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020
(compared to 2015-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020
(comparado con 2015-19)




Graph 4. Haiti: Number of SARI cases, EW 40, 2020
(compared to 2017-19)
Número de casos de IRAG, SE 40 de 2020
(comparado con 2017-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Graph 2. Haiti: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20




Graph 4. Haiti: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 40, 2019-20
Distribución del VRS y otros virus, SE 40, 2019-20




Jamaica

- In the last six months, there have been no detections of influenza. Co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and B/Victoria viruses was reported in the first months of the year (Graph 1). During 2020, the circulation of the respiratory syncytial virus and other respiratory viruses has not been reported. No samples were analyzed for SARS-CoV-2, in EW 40 (Graph 2). The percent positivity for influenza remained below the average seen in previous seasons (Graph 3). SARI hospitalizations/100 hospitalizations peaked in EW 15 at moderate levels of activity, decreased to baseline levels to increase again to moderate levels with a second peak in EW 37. SARI cases/100 hospitalizations decreased compared to EW 39 and was at a low level of activity above levels observed in previous seasons for the same period (Graph 4). The number of pneumonia cases has decreased compared to previous weeks and was below the average epidemic curve. ARI cases remained very low and below the seasonal thresholds observed during previous seasons (Graphs 5 and 6). / En los últimos seis meses, no ha habido detecciones de influenza. Se notificó la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 y B/Victoria en los primeros meses del año (Gráfico 1). Durante 2020, no se ha reportado la circulación del virus respiratorio sincitial y otros virus respiratorios. No se analizaron muestras para SARS-CoV-2, en la SE 40 (Gráfico 2). El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo por debajo del promedio observado en temporadas anteriores (Gráfico 3). Las hospitalizaciones por IRAG/100 hospitalizaciones alcanzaron su punto máximo en la SE 15 a niveles moderados de actividad, disminuyeron a niveles basales para aumentar nuevamente a niveles moderados con un segundo pico en la SE 37. Los casos de IRAG/100 hospitalizaciones disminuyeron en comparación con la SE 39 y estuvo en un nivel bajo de actividad por encima de los niveles observados en temporadas anteriores para el mismo período (Gráfico 4). El número de casos de neumonía ha disminuido en comparación con las semanas anteriores y estuvo por debajo de la curva epidémica promedio. Los casos de IRA se mantuvieron muy bajos y por debajo de los umbrales estacionales observados durante temporadas anteriores (Gráficos 5 y 6).


Graph 1. Jamaica: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución de virus influenza SE 40, 2014-20




Graph 3. Jamaica: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 5. Jamaica: Number of pneumonia cases,
EW 40, 2014-20
Número de casos de neumonía, SE 40, 2014-2020




Graph 2. Jamaica: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2
virus distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Jamaica: SARI hospitalizations/100 hospitalizations,
EW 40, 2020 (compared to 2011-19)
Hospitalizaciones de IRAG/100 hospitalizaciones, SE 40 de 2020
(comparado con 2011-19)



Graph 6. Jamaica: Number of ARI cases, EW 40, 2020
(compared to 2011-19)
Número de casos de IRA, SE 40 de 2020
(comparado con 2011-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#)

Puerto Rico

- During EW 40, influenza-like illness activity level was minimal; influenza activity remains low with influenza A(H1N1)pdm09 virus most frequently detected and co-circulation of influenza A(H3N2), influenza B/Victoria, and B/Yamagata detected in previous weeks (Graph 1). The number of influenza positive cases (rapid test) reported in EW 40 was below the average number of cases observed in previous seasons during the same period (Graph2). The age group with the greatest number of influenza-confirmed cases was those aged 60-64 years; the distribution of influenza cases among the other age groups is shown in Graph 3. The influenza incidence rate per-100 000 population by municipality of residence is shown in Graph 4: the municipality of Jayuya had the highest influenza incidence rate followed by Villalba, Guayama, and Naguabo**./ En la SE 40, el nivel de actividad de la enfermedad tipo influenza fue mínimo; La actividad de la influenza permanece baja con el virus de influenza A(H1N1)pdm09 detectado con mayor frecuencia y la circulación concurrente de influenza A(H3N2), influenza B/Victoria y B/Yamagata detectada en las semanas anteriores (Gráfico 1). El número de casos positivos de influenza (prueba rápida) reportados en la SE 40 estuvo por debajo del promedio de casos observados en temporadas anteriores durante el mismo período (Gráfico 2). El grupo de edad con el mayor número de casos confirmados de influenza fue el de 60 a 64 años; la distribución de los casos de influenza entre los otros grupos de edad se muestra en el Gráfico 3. La tasa de incidencia de influenza por 100 000 habitantes por municipio de residencia se muestra en el Gráfico 4: el municipio de Jayuya tuvo la mayor tasa de incidencia de influenza seguido de Villalba, Guayama y Naguabo **.


Graph 1. Puerto Rico: Influenza-positive tests reported to CDC by Public Health Laboratories, EW 40, 2019-20[‡]

Pruebas positivas para influenza informadas a los CDC por los Laboratorios de Salud Pública, SE 40, 2019-20[‡]



Graph 3. Puerto Rico: Number of cases positive for influenza by age group, EW 40, 2020

Número de casos positivos para influenza por grupo de edad, SE 40 de 2020




‡ Influenza Positive Tests Reported to CDC by Public Health Laboratories, Puerto Rico.

** Departamento de Salud. Sistema de Vigilancia de Puerto Rico. [Salud Puerto Rico](#)

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Graph 2. Puerto Rico: Influenza-positive cases EW 40, 2020-21 Casos positivos para influenza SE 40, 2020-21



Graph 4. Puerto Rico: Influenza incidence rate per 100,000 population by municipality of residence, EW 40, 2020

Tasa de incidencia de influenza por 100.000 habitantes por municipio de residencia, SE 40 de 2020


Gráfica 2. Mapa de tasas de incidencia de influenza por municipio, semana 40




- No influenza or respiratory syncytial virus detections have been reported in recent months; influenza A(H1N1)pdm09 viruses circulated during EW 11. Influenza percent positivity remained at baseline levels (Graphs 1 and 2). SARS-CoV-2 percent positive remained similar to the percent recorded in previous weeks with a few samples (one) reported the previous week (Graph2). During EW 40 no ILI cases among children < 5 years were reported to the respiratory surveillance system. Among persons aged > 5 years and older, four new ILI cases were reported lower compared to the number reported in 2019, for the same period (nine) (Graphs 3 and 4). During EW 40, the number of SARI cases remained similar at baseline levels compared to previous seasons for the same period of the year (Graph 5). The age groups with the higher percentage of SARI cases were children aged 1-4 (40.0%). / No se han notificado detecciones de virus influenza o virus respiratorio sincitial en los últimos meses; los virus influenza A(H1N1)pdm09 circularon durante la SE 11. El porcentaje de positividad de influenza permaneció en los niveles basales (Gráficos 1 y 2). El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 se mantuvo similar al porcentaje registrado en las semanas anteriores con algunas muestras (una) notificadas la semana anterior (Gráfico 2). Durante la SE 40 no se notificaron al sistema de vigilancia respiratoria casos de ETI en menores de 5 años. En las personas de 5 años y más, se notificaron cuatro nuevos casos de ETI, más bajo en comparación con el número informado en 2019, para el mismo período (nueve) (Gráficos 3 y 4). Durante la SE 40, el número de casos de IRAG se mantuvo similar en los niveles de referencia a temporadas anteriores para el mismo período del año (Gráfico 5). Los grupos de edad con mayor porcentaje de casos de IRAG fueron los niños de 1 a 4 años (40,0%).

Graph 1. Saint Lucia: Influenza virus distribution, EW 40, 2015-20

Distribución de virus influenza, SE 40, 2015-20




Graph 3. Saint Lucia: ILI case distribution by EW among the < 5 years of age, EW 40, 2020 (in comparison to 2016-19)
Distribución de ETI por SE entre los <5 años, SE 40, 2020
(comparado con 2016-19)



Graph 2. Saint Lucia: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 virus distribution, EW 40, 2015-20


Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Saint Lucia: ILI case distribution by EW among the ≥ 5 years of age, EW 40, 2020 (in comparison to 2016-19)
Número de casos de ETI en los ≥ 5 años, SE 40, 2020
(comparado con 2016-19)




Graph 5. Saint Lucia: Number of SARI cases, EW 40, 2020
(compared to 2016-19)
Número de casos de IRAG, SE 40 de 2020
(comparado con 2016-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

- Early this year, minimal influenza detections were reported with influenza A(H1N1)pdm09 and B/Victoria viruses co-circulating (Graphs 1). RSV and other respiratory virus circulation were not reported this week. Early this year, RSV circulation was recorded (Graph 2). An increase in the percentage of SARI cases was last reported in EW 9, no SARI cases were reported during EW 39 (Graph 3). / A principios de este año, se notificaron detecciones mínimas de influenza con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 y B/Victoria (Gráficos 1). En esta semana no se notificó la circulación de VRS u otros virus respiratorios. A principios de año se registró la circulación de VRS (Gráfico 2). Un aumento en el porcentaje de casos de IRAG se informó por última vez en la SE 9, no se notificaron casos de IRAG durante la SE 39 (Gráfico 3).

Graph 1. Saint Vincent and the Grenadines: Influenza virus distribution, EW 39, 2016-20




Graph 2. Saint Vincent and the Grenadines: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 39, 2016-20



Graph 3. Saint Vincent and the Grenadines: Percentage of SARI cases, EW 39, 2020
(compared to 2018-19)

Porcentaje de casos de IRAG, SE 39 de 2020
(comparado con 2018-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Suriname / Surinam

- In EW 40, no influenza viruses were detected; influenza B and A(H1N1)pdm09 viruses circulated at the beginning of the year (Graph 1). No respiratory syncytial virus has been reported during 2020. Influenza percent positivity was at the lowest level observed in recent years. Since EW 23, no SARS-CoV-2 detections have been reported (Graphs 2 and 3). The proportion of SARI hospitalizations/100 hospitalizations increased slightly compared to the last week and was below the epidemic threshold, as observed in past seasons for the same period (Graph 5). No SARI-associated deaths were reported in the last five months. / En la SE 40 no se detectaron virus de influenza; los virus influenza A(H1N1)pdm09 y B circularon a principios del año (Gráfico 1). No se ha notificado virus sincitial respiratorio durante 2020. El porcentaje de positividad para la influenza estuvo en el nivel más bajo observado en los últimos años. Desde la SE 23, no se han notificado detecciones de SARS-CoV-2 (Gráficos 2 y 3). La proporción de hospitalizaciones por IRAG/100 hospitalizaciones aumentó ligeramente en comparación con la semana previa, por debajo del umbral epidémico, como se observó en temporadas pasadas para el mismo período (Gráfico 5). No se reportaron muertes asociadas a IRAG en los últimos cinco meses.


Graph 1. Suriname: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución de virus influenza, SE 40, 2014-20




Graph 3. Suriname: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020
(compared to 2015-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020
(comparado con 2015-19)



Graph 2. Suriname: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 virus distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Suriname: SARI cases/100 hospitalizations, EW 40, 2020
(compared to 2014-19)
Casos de IRAG por cada 100 hospitalizaciones, SE 40 de 2020
(comparado con 2014-19)




*To view more epi data, view here. / Paraver más datos epi, vea aquí.

Trinidad and Tobago

- During EW 39, no influenza detections were reported. In early March, influenza detections were recorded with influenza A(H1N1)pdm09, influenza B/Victoria, and B/Yamagata viruses co-circulating (Graph 1). Influenza percent positivity remained at baseline levels; few RSV detections were reported in recent weeks (Graphs 2 and 3). The number of SARI cases reported in past weeks was below levels observed in previous seasons (Graph 4). / En la SE 39, no se notificaron detecciones de influenza. A principios de marzo, se registraron detecciones de influenza con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09, influenza B/Victoria y B/Yamagata (Gráfico 1). El porcentaje de positividad de la influenza se mantuvo en los niveles basales; se notificaron pocas detecciones de VRS en las últimas semanas (Gráficos 2 y 3). El número de casos de IRAG reportados en las últimas semanas estuvo por debajo de los niveles observados en temporadas anteriores (Gráfico 4).


Graph 1. Trinidad and Tobago: Influenza virus distribution, EW 39, 2015-20

Distribución de virus influenza, SE 39, 2015-20




Graph 3. Trinidad and Tobago: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 39, 2015-20

Distribución de VRS y otros virus respiratorios, SE 39, 2015-20




Graph 2. Trinidad and Tobago: Influenza and RSV distribution, EW 39, 2015-20

Distribución de virus influenza y VRS, SE 39, 2015-20



Graph 4. Trinidad and Tobago: Percentage of SARI cases, EW 39, 2020 (compared to 2018-19)

Porcentaje de casos de IRAG, SE 39 de 2020 (comparado con 2018-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Central America / América Central**Costa Rica**


- During the past six months, no influenza or RSV detections have been recorded. Influenza A and B viruses circulation was last recorded in early March. Influenza percent positivity remained at baseline levels; SARS-CoV-2 percent positive decreased slightly compared to the previous week at 41.0% (Graphs 1, 2, and 3). SARS-CoV-2 detections decreased compared to the last week (Graph 4). The three provinces with the highest cumulative proportion of SARS-CoV-2 cases recorded were Puntarenas, Limón, and San José. The number of severe acute respiratory infection (SARI) cases continued to decrease at extraordinary levels of activity compared to previous seasons (Graph 5). Influenza-like illness visits continued elevated and decreased compared to past weeks (Graph 6). In EW 40, 77.3% (225/291) of hospitalizations were SARI cases, 53.3% reported having an underlying condition; of eight SARI cases tested for SARS-CoV-2, one was positive. Four SARI deaths were recorded during EW 40, all tested negative for the analyzed viruses. Adults 60 years and older had the highest proportion of deaths. / En los últimos seis meses, no se han registrado detecciones de influenza o VRS. La circulación de los virus influenza A y B se registró por última vez a principios de marzo. El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales; el porcentaje de SARS-CoV-2 positivo disminuyó ligeramente en comparación con la semana anterior a 41,0% (Gráficos 1, 2 y 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 disminuyeron en comparación con la semana pasada (Gráfico 4). Las tres provincias con la mayor proporción acumulada de casos de SARS-CoV-2 registrados fueron Puntarenas, Limón y San José. El número de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) continuó disminuyendo, a niveles extraordinarios de actividad en comparación con temporadas anteriores (Gráfico 5). Las visitas por enfermedad tipo influenza continuaron elevadas y disminuyeron en comparación con las últimas semanas (Gráfico 6). En la SE 40, el 77,3% (225/291) de las hospitalizaciones fueron casos de IRAG, el 53,3% informó tener una condición de base; de ocho casos de IRAG evaluados para el SARS-CoV-2, uno fue positivo. Se registraron cuatro muertes por IRAG durante la SE 40, todas resultaron negativas para los virus analizados. Los adultos de 60 años o más tuvieron la mayor proporción de muertes.

Graph 1. Costa Rica: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20


Distribución de virus influenza por SE 40, 2014-20

**Graph 3.** Costa Rica: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2011-19)


Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020 (comparado con 2011-19)

**Graph 2.** Costa Rica: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20


Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20

**Graph 4.** Costa Rica: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 40, 2014-20


Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 40, 2014-20



Graph 5. Costa Rica: Number of SARI cases, EW 40, 2020
(compared to 2013-19)
Número de casos de IRAG, SE 40 de 2020
(comparado con 2013-19)



Graph 6. Costa Rica: Number of ILI cases, EW 40, 2019-20
Número de casos de ETI, SE 40 de 2019-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


El Salvador

- During EW 38, no detections of influenza were reported, influenza remained below the seasonal threshold; influenza B viruses circulated in previous months (Graphs 1 and 3). No respiratory syncytial virus detections were reported. Percent positivity for SARS-CoV-2 remained the same compared to the percent observed in the last week at 4.0% (Graphs 2 and 4). In EW 38, the percentage of samples that tested positive for SARS-CoV-2 was 4.8% (710/14 831). / En la SE 38, no se reportaron detecciones de influenza, la influenza se mantuvo por debajo del umbral estacional; los virus influenza B circularon en meses anteriores (Gráficos 1 y 3). No se notificaron detecciones de virus respiratorio sincitial. El porcentaje de positividad para el SARS-CoV-2 se mantuvo igual en comparación con el porcentaje observado en la última semana en 4,0% (Gráficos 2 y 4). En la SE 38, el porcentaje de muestras que dieron positivo para SARS-CoV-2 fue de 4,8% (710/14 831).

Graph 1. El Salvador: Influenza virus distribution, EW 38, 2014-20
Distribución de virus influenza, SE 38, 2014-20




Graph 3. El Salvador: Percent positivity for influenza, EW 38, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 38 de 2020 (comparación 2010-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Graph 2. El Salvador: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 38, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 38, 2015-20




Graph 4. El Salvador: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 38, 2014-20
Distribución del VRS otros virus respiratorios, SE 38, 2014-20




Guatemala

- In Guatemala, in EW 40, no influenza or RSV detections were reported; influenza percent positivity remained at baseline levels with influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2) viruses co-circulating early in the year. Percent positive for SARS-CoV-2 remained the same compared to the previous week (Graphs 1, 2, and 3). No SARS-CoV-2 detections were reported this week (Graph 4). / En Guatemala, en la SE 40 no se notificaron detecciones de influenza o VRS; el porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales con los virus influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) que circularon concurrentemente a principios de año. El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 permaneció igual en comparación con las semanas anteriores (Gráficos 1, 2 y 3). Esta semana no se notificaron detecciones de SARS-CoV-2 (Gráfico 4).


Graph 1. Guatemala: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución de influenza, SE 40, 2014-20




Graph 3. Guatemala: Percentage positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020 (comparado con 2010-19)



Graph 2. Guatemala: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Guatemala: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 40, 2014-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 40, 2014-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aqui](#).


Honduras

- In EW 40, no influenza or RSV detections were reported with influenza B viruses circulating early in August. Influenza and RSV activity remained at baseline levels (Graphs 1, 2, and 3). In EW 40, at the national level, a total of 352 samples were analyzed for SARS-CoV-2, 10.2% tested positive. The number of SARI cases continued to decrease and was at high activity levels for this time of year compared to the average of previous seasons (Graph 5). / En la SE 40, no se notificaron detecciones de influenza o VRS con la circulación de los virus influenza B a principios de agosto. La actividad de los virus influenza y VRS se mantuvo en niveles de línea base esta semana (Gráficos 1, 2 y 3). En la SE 40, se analizaron un total de 352 muestras para SARS-CoV-2, 10,2% dieron positivo. El número de casos de IRAG continuó disminuyendo y se mantuvo en niveles de actividad altos para esta época del año en comparación con el promedio de temporadas anteriores (Gráfico 5).


Graph 1. Honduras: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución virus de la influenza, SE 40, 2014-20




Graph 3. Honduras: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza SE 40 de 2020 (comparado con 2010-19)




Graph 2. Honduras: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Honduras: RSV and other respiratory virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 40, 2014-20



Graph 5. Honduras: SARI cases, from sentinel surveillance, EW 40, 2020 (compared to 2010-19)
Casos de IRAG de la vigilancia centinela, SE 40 de 2020 (comparado con 2010-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Nicaragua

- In EW 40, no influenza detections were reported with influenza A viruses circulating in the previous week; influenza percent positivity continued below the average epidemic curve. Few respiratory syncytial virus (RSV) detections (one sample) were recorded this week (Graphs 1, 2, and 3). SARS-CoV-2 detections continued to decrease, and percent positive remained the same compared to the percent recorded in previous weeks (Graph 4). In EW 40, 100% (97) of the analyzed samples, tested positive for SARS-CoV-2. / En la SE 40, no se notificaron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A en la semana pasada; el porcentaje de positividad de la influenza continuó por debajo de la curva epidémica promedio. Se registraron pocas detecciones (una muestra) de virus respiratorio sincitial (VRS) esta semana (Gráficos 1, 2 y 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 continuaron disminuyendo y el porcentaje de positividad permanece igual comparado con el porcentaje registrado en semanas previas (Gráfico 4). En la SE 40, el 100% (97) de las muestras analizadas dieron positivo para el SARS-CoV-2.


Graph 1. Nicaragua: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución de influenza, SE 40, 2014-20




Graph 2. Nicaragua: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 3. Nicaragua: Percent positivity for influenza, from sentinel surveillance; EW 40, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza de la vigilancia centinela; SE 40 de 2020 (comparado con 2010-19)



Graph 4. Nicaragua: RSV and other respiratory virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 40, 2014-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

South America / América del Sur – Andean countries / Países andinos


Bolivia

- During EW 40, 2020, at the national level, no influenza detections were recorded with influenza A(H1N1)pdm09 viruses circulating in previous months; influenza percent positivity remained at baseline levels. No respiratory syncytial virus detections have been reported since January. SARS-CoV-2 percent positive remained the same compared to last weeks (Graphs 1, 2, and 3). SARS-CoV-2 detections decreased compared to the previous week, with 2 896 samples positive (Graph 4). In recent weeks, the number of SARI cases have fluctuated and in EW 40 remained the same compared to the previous week, below levels observed in previous seasons (2017-19) (Graph 5). / En la SE 40 de 2020, a nivel nacional, no se registraron detecciones de influenza con virus influenza A(H1N1)pdm09 circulando en meses anteriores; el porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles de referencia. No se han reportado detecciones de virus respiratorio sincitrial desde enero. El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 se mantuvo igual en comparación con las últimas semanas (Gráficos 1, 2 y 3). Las detecciones de SARS-CoV-2 disminuyeron en comparación con la semana anterior, con 2 896 muestras positivas (Gráfico 4). En las últimas semanas el número de casos de IRAG ha fluctuado y en la SE 40 se mantuvo igual respecto a la semana anterior, por debajo de los niveles observados en temporadas anteriores (2017-19) (Gráfico 5).


Graph 1. Bolivia: Influenza virus distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de influenza, SE 40, 2015-20




Graph 3. Bolivia: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020 (comparado con 2010-19)




Graph 2. Bolivia: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Bolivia: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 40, 2014-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 40, 2014-20



Graph 5. Bolivia: Number of SARI cases, EW 40, 2020 (compared to 2017-19)
Número de casos de IRAG, SE 40 de 2020 (comparado con 2017-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Colombia

In Colombia, influenza detections trended downward with no detections in EW 40, with influenza B virus detections reported in June (Graph 1). Few respiratory syncytial virus (RSV) detections were reported with adenovirus co-circulating; RSV percent positive increased at 10% (Graph 2). SARS-CoV-2 percent positive increased slightly and was at 14.0% this week (Graph 2); detections decreased compared to the last week (Graph 3). At the national level, of the 122 176 samples analyzed for SARS-CoV-2, 12 077 (10.0%) tested positive. After an increase in EW 35, SARI case counts in the general ward decreased; during this week, the number of SARI cases remained similar to the number in the previous week and was below the seasonal threshold at low level of activity (Graph 4). The number of consultations for pneumonia and acute respiratory infections (ARI) continued below the average seasonal level (Graphs 5 and 6). / En Colombia, las detecciones de influenza tuvieron una tendencia a la baja sin detecciones en la SE 40, con detecciones de virus influenza B reportadas en junio (Gráfico 1). Se notificaron pocas detecciones de virus respiratorio sincitial (VRS) con la circulación concurrente de adenovirus; el porcentaje de positividad para el VRS aumentó a 10% (Gráfico 2). El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 aumentó ligeramente y estuvo en 14,0% esta semana (Gráfico 2); las detecciones disminuyeron en comparación con la semana pasada (Gráfico 3). A nivel nacional, de las 122 176 muestras analizadas para SARS-CoV-2, 12 077 (10%) dieron positivo. Después de un aumento en la SE 35, el recuento de casos de IRAG en la sala general disminuyó; durante esta semana, el número de casos de IRAG se mantuvo similar al número de la semana anterior y estuvo por debajo del umbral estacional con bajo nivel de actividad (Gráfico 4). El número de consultas por neumonía e infecciones respiratorias agudas (IRA) continuó por debajo del nivel promedio estacional (Gráficos 5 y 6).


Graph 1. Colombia: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución de virus influenza, SE 40, 2014-20




Graph 3. Colombia: Composite ARI cases x Percent positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2012-19)
Producto de casos de IRA x Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020 (comparado con 2012-19)




Graph 5: Colombia: Pneumonia cases, EW 40, 2020
(compared to 2012-19)
Casos de neumonía, SE 40 de 2020 (comparado con 2012-19)




Graph 2. Colombia: Influenza, RSV and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de virus influenza, VRS y SAR-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Colombia: Number of SARI cases in general ward, EW 40, 2020 (compared to 2013-19)
Número de casos de IRAG en sala general, SE 40 de 2020 (comparado con 2013-19)



Graph 6. Colombia: Number of ARI cases (from all consultations) EW 40, 2020 (compared to 2012-19)
Número de casos de IRA, (de todas las consultas) SE 40 de 2020 (comparado con 2012-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Ecuador

- Influenza detections trended downward since EW 1 with no detections of influenza or respiratory syncytial virus recorded in EW 40. Influenza B, A(H1N1)pdm09, and A(H3N2) viruses were reported during the three first months of the year. SARS-CoV-2 percent positive increased slightly compared to the previous week and was at 20.0%, while the number of detections decreased compared to previous weeks (Graphs 1, 2, 3, and 4). In EW 40, among 5 989 samples processed for SARS-CoV-2, 20.0% of samples tested positive, an increase compared to 19.4% of samples tested positive in EW 39. The number of SARI and pneumonia cases remained at baseline levels of activity for this time of year (Graphs 5 and 6). / Las detecciones de influenza tuvieron una tendencia a la baja desde la SE 1 sin detecciones de influenza o virus respiratorio sincitrial registrado en la SE 40. Los virus de influenza B, A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) se reportaron durante los tres primeros meses del año. El porcentaje positivo de SARS-CoV-2 aumentó ligeramente en comparación con la semana anterior y fue del 20,0%, en tanto el número de detecciones disminuyó en comparación con la semana pasada (Gráficos 1, 2, 3 y 4). En la SE 40, de las 5 989 muestras procesadas para SARS-CoV-2, el 20,0% de las muestras dieron positivo, un aumento en comparación con el 19,4% de las muestras dieron positivo en la SE 39. El número de casos de IRAG y neumonía se mantuvo en niveles de referencia de actividad para esta época del año (Gráficos 5 y 6).


Graph 1. Ecuador: Influenza virus distribution from SARI sentinel cases, EW 40, 2014-20

Distribución de virus influenza de casos de IRAG centinela SE 40, 2014-20




Graph 3. Ecuador: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2011-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020 (comparado con 2011-19)




Graph 5. Ecuador: Number of SARI cases / 100 inpatients, EW 39, 2020 (compared to 2015-2019)

Número de casos de IRAG / 100 hospitalizaciones, SE 39 de 2020 (comparado con 2015-19)




Graph 2. Ecuador: Influenza and RSV distribution from SARI sentinel cases, EW 40, 2015-20

Distribución de los virus influenza y VRS de casos de IRAG centinela, SE 40, 2015-20




Graph 4. Ecuador: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 40, 2014-20

Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 40, 2014-20



Graph 6. Ecuador: Pneumonia cases, EW 39, 2020 (compared to 2012-19)

Casos de neumonía, SE 39 de 2020 (comparado con 2012-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Peru


- During EW 40, no influenza detections were reported with influenza A(H1N1)pdm09 viruses circulating early in the year (Graph 1). Influenza percent positivity remained at baseline levels of activity (Graphs 1 and 3). No RSV detections have been reported during 2020. SARS-CoV-2 percent positive decreased compared to previous weeks (Graph 2). After an increase in EW 33, SARS-CoV-2 detections have decreased in recent weeks (Graph 4). At the national level, among 23 595 analyzed samples in EW 40, 11.0% were positive for SARS-CoV-2. The jurisdictions with the highest proportion of samples positive for SARS-CoV-2 were Lima, Callao and Ancash. / En la SE 40, no se notificaron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A(H1N1)pdm09 a principios de año (Gráfico 1). El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales de actividad (Gráficos 1 y 3). No se han notificado detecciones de VRS en el 2020. El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con las semanas anteriores (Gráfico 2). Luego de un aumento en la SE 33, las detecciones de SARS-CoV-2 han disminuido en las últimas semanas (Gráfico 4). A nivel nacional, de las 23 595 muestras analizadas en la SE 40, el 11,0% fueron positivas para SARS-CoV-2. Las jurisdicciones con la mayor proporción de muestras positivas para SARS-CoV-2 fueron Lima, Callao y Ancash.

Graph 1. Peru: Influenza virus distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 40, 2015-20




Graph 3. Peru: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020
(compared to 2010-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 2. Peru: Influenza and RSV distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 40, 2015-20



Graph 4. Peru: RSV and other respiratory viruses distribution,
EW 40, 2014-20

Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 40, 2014-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Argentina

- During EW 39, few influenza detections (four samples) were recorded with influenza B/Yamagata, B/Victoria, and influenza A(H3N2) viruses co-circulating. In recent weeks influenza activity increased and was above the epidemic threshold of previous seasons, at a low level of activity (Graphs 1 and 3). Few RSV detections were recorded in previous weeks with adenovirus co-circulating. SARS-CoV-2 percent positive increased in EW 39 compared to the last week; detections decreased compared to EW 38 (Graphs 2 and 4). Among 135 842 samples tested for SARS-CoV-2, 69 026 (50.8%) were positive. The three provinces with the highest cumulative percentage of samples testing positive for SARS-CoV-2 were Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, and Santa Fe. The number of ILI patients, have been low, continued to decrease and remained at baseline levels (Graph 5). / En la SE 39, se registraron pocas detecciones de influenza (cuatro muestras) con la circulación concurrente de los virus influenza B/Yamagata, B/Victoria e influenza A(H3N2). En las últimas semanas la actividad de la influenza aumentó y estuvo por encima del umbral epidémico de temporadas anteriores, con un nivel de actividad bajo (Gráficos 1 y 3). Se registraron pocas detecciones de VRS en las semanas anteriores con la circulación concurrente de adenovirus. El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 aumentó en la SE 39 en comparación con la semana pasada; las detecciones disminuyeron en comparación con la SE 38 (Gráficos 2 y 4). De 135 842 muestras analizadas para SARS-CoV-2, 69 026 (50,8%) fueron positivas. Las tres provincias con el porcentaje acumulado más alto de muestras que dieron positivo para SARS-CoV-2 fueron Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. El número de pacientes con ETI ha sido bajo, siguió disminuyendo y se mantuvo en los niveles basales (Gráfico 5).


Graph 1. Argentina: Influenza virus distribution, EW 39, 2014-20
Distribución de virus influenza, SE 39, 2014-20




Graph 3. Argentina: Percent positivity for influenza, EW 39, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 39 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 2. Argentina: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution,
EW 39, 2015-20
Distribución de virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 39, 2015-20



Graph 4. Argentina: RSV and other respiratory virus distribution,
EW 39, 2014-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 39, 2014-20



Graph 5. Argentina: Number of ILI cases, EW 39, 2020,
(compared to 2012-19)
Número de casos ETI, SE 39 de 2020
(comparado con 2012-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Brazil

- During EW 40, no influenza detections were reported, with influenza B viruses circulating in recent weeks. Influenza percent positivity remained at baseline levels of activity compared to previous seasons for the same period (Graphs 1, 2, and 3). In EW 40, no respiratory syncytial virus activity was recorded with no detections reported; few SARS-CoV-2 detections were reported (Graphs 2 and 4). / En la SE 40, no se reportaron detecciones de influenza, con la circulación de los virus influenza B en las últimas semanas. El porcentaje de positividad de influenza se mantuvo en los niveles iniciales de actividad en comparación con temporadas anteriores para el mismo período (Gráficos 1, 2 y 3). En la SE 40, no se registró actividad de virus respiratorio sincitrial y no se notificaron detecciones; se notificaron pocas detecciones de SARS-CoV-2 (Gráficos 2 y 4).


Graph 1. Brazil: All NICs. Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20

Distribución de virus influenza, SE 40, 2014-20




Graph 3. Brazil: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2011-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020 (comparado con 2011-19)




Graph 2. Brazil: All NICs. Influenza, RSV, and SARS-CoV-2, distribution, EW 40, 2015-20

Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20



Graph 4. Brazil: All NICs. RSV and other respiratory virus distribution, EW 40, 2014-20

Distribución del VRS y otros virus respiratorios SE 40, 2014-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#)


Chile

- During EW 40, no influenza detections were reported with influenza A viruses circulating in the previous week. Influenza activity continued below the average epidemic curve at baseline levels (Graphs 1 and 3). Few respiratory syncytial virus detections were reported, with adenovirus and metapneumovirus co-circulating. At sentinel sites, SARS-CoV-2 percent positivity and detections decreased compared to last weeks (Graphs 2 and 4). The number of ILI visits increased compared the last week and continued below the epidemic curve at baseline levels of activity (Graph 5). The number of SARI cases increased and were at the epidemic threshold for this time of year as compared to previous seasons (Graph 6). In EW 40, 1 184 hospitalizations were recorded, 60 (5.1%) were SARI cases, of which 80.0% were tested for influenza and ORV. Of 21 SARI cases tested for SARS-CoV-2, 13 (70.0%) tested positive. None of the SARI cases tested positive for influenza or RSV. Among SARI cases, 66.7% reported at least one risk factor, 65.0% had a history of influenza vaccination, and 7.5% (11/146) were admitted to ICU. Two SARI deaths were recorded, deaths occurred among adults 60 years and older (100.0%). / En la SE 40, no se notificaron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A en la semana anterior. La actividad de la influenza continuó por debajo de la curva epidémica promedio en los niveles de referencia (Gráficos 1 y 3). Se notificaron pocas detecciones de virus respiratorio sincitial, con la circulación concurrente de adenovirus y metapneumovirus. En los sitios centinela, el porcentaje de positividad y detecciones de SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con las últimas semanas (Gráficos 2 y 4). El número de visitas por ETI aumentó en comparación con la última semana y continuó por debajo de la curva epidémica en los niveles de actividad inicial (Gráfico 5). El número de casos de IRAG aumentó y se situó en el umbral epidémico para esta época del año en comparación con temporadas anteriores (Gráfico 6). En la SE 40 se registraron 1 184 hospitalizaciones, 60 (5.1%) fueron casos de IRAG, de los cuales el 80,0% fueron analizados para influenza y OVR. De los 21 casos de IRAG analizados para el SARS-CoV-2, 13 (70,0%) dieron positivo. Ninguno de los casos de IRAG resultó positivo para influenza o VRS. Entre los casos de IRAG, el 66,7% informó al menos un factor de riesgo, el 65,0% tenía antecedentes de vacunación contra la influenza y el 7,5% (11/146) ingresaron a la UCI. Se registraron dos muertes por IRAG, las muertes ocurrieron en adultos de 60 años o más (100,0%).


Graph 1. Chile: Influenza virus distribution, EW 40, 2014-20
Distribución de virus de influenza, SE 40, 2014-20




Graph 2. Chile: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2, distribution, (sentinel surveillance) EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, (vigilancia centinela) SE 40, 2015-20




Graph 3. Chile: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020 (comparado con 2010-19)




Graph 4. Chile: RSV and other respiratory viruses distribution, (sentinel surveillance) EW 40, 2014-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios (vigilancia centinela) SE 40, 2014-20



Graph 5. Chile: Number of ILI cases EW 40, 2020
(compared to 2015-19)
Número de consultas por ETI, SE 40 de 2020
(comparado con 2015-19)



Graph 6. Chile: Number of SARI cases, EW 40, 2020
(compared to 2015-19)
Número de casos de IRAG, SE 40 de 2020
(comparado con 2015-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Paraguay

- Influenza detections were last reported in mid-April with influenza B viruses circulating; during EW 40, at the national level, no influenza detections were reported, and influenza activity continued at baseline levels (Graphs 1 and 3). Since EW 24, no RSV detections have been reported. SARS-CoV-2 percent positive increased at 22.0%, compared to 15.0% the previous week; detections decreased compared to the last week (Graphs 2, and 4). / La última vez en la que se notificaron detecciones de influenza fue a mediados de abril con la circulación de virus influenza B; durante la SE 40, a nivel nacional, no se notificaron detecciones de influenza y la actividad de influenza continuó en los niveles de referencia (Gráficos 1 y 3). Desde la SE 24, no se han reportado detecciones de VRS. El porcentaje de positivos para SARS-CoV-2 aumentó a 22,0% comparado con 15,0% de la última semana, y las detecciones disminuyeron en comparación con la semana anterior (Gráficos 2 y 4).


Graph 1. Paraguay: Influenza virus distribution EW 40, 2014-20

Distribución de virus de influenza, SE 40, 2014-20




Graph 2. Paraguay: Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution, EW 40, 2015-20

Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2, SE 40, 2015-20




Graph 3. Paraguay: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020
(in comparison to 2011-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020
(comparado con 2011-19)



Graph 4. Paraguay: RSV and other respiratory viruses distribution, (sentinel surveillance) EW 40, 2014-20

Distribución del VRS y otros virus respiratorios
(vigilancia centinela) SE 40, 2014-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Uruguay


- In Uruguay, circulation of influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2), and influenza B/Victoria was reported in late March. During EW 40, no influenza detections or respiratory syncytial virus were reported. Influenza percent positivity remained at baseline levels. Few SARS-CoV-2 detections were reported in the previous week (Graphs 1, 2, and 3). / En Uruguay, se notificó la circulación de influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B/Victoria, a fines de marzo. Durante la SE 40 no se notificaron detecciones de influenza ni virus respiratorio sincitial. El porcentaje de positividad para la influenza se mantuvo en los niveles iniciales. Se notificaron pocas detecciones de SARS-CoV-2 en la semana pasada (Gráficos 1, 2 y 3).

Graph 1. Uruguay: Influenza virus distribution EW 40, 2014-20
Distribución de virus de influenza, SE 40, 2014-20




Graph 3. Uruguay: Percent positivity for influenza, EW 40, 2020
(compared to 2010-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 40 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 2. Uruguay: Influenza and RSV distribution, EW 40, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 40, 2015-20



Graph 4. Uruguay: SARI cases/100 hospitalizations, EW 40, 2020 (compared to 2017-19)

Casos de IRAG/100 hospitalizaciones, SE 40 de 2020 (comparado con 2017-19)



*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

ACRONYMS

ARI	acute respiratory infection
CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
EW	epidemiological week
ILI	influenza-like illness
INS	Instituto Nacional de Salud
ORV	other respiratory viruses
SARI	severe acute respiratory infection
ICU	intensive care unit
RSV	respiratory syncytial virus

ACRÓNIMOS

CARPHA	Agencia de Salud Pública del Caribe
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
ETI	Enfermedad tipo influenza
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección respiratoria aguda
IRAG	Infección respiratoria aguda grave
OVR	Otros virus respiratorios
SE	Semana epidemiológica
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
UCI	Unidad de cuidados intensivos
VRS	Virus respiratorio sincitial