



Alerta Epidemiológica:

Actualización semanal sobre la situación del Cólera

SE 50 (12 – 18 de diciembre)

(23 diciembre 2010)

Situación epidemiológica

Haití

Como en las alertas epidemiológicas anteriores, la información que aquí se presenta es la proporcionada por el Ministère de la Sante Publique et de la Population (MSPP) en la cual se integra los datos obtenidos por los diferentes socios del Grupo de Acción Sanitaria¹.

Entre la Semana Epidemiológica (SE) 42² a la SE 50, el MSPP registró, a nivel de todo el país, un total de 128.251 casos de cólera³, de los cuales, 53,6 % (68.764) fueron hospitalizados y 2.707 fallecieron (1.888 a nivel de servicios de salud y 819 a nivel de la comunidad). La tasa de letalidad hospitalaria, hasta la SE 50, fue de 2,7% y la tasa de letalidad global de 2,1%.

Actualmente, se registran casos y defunciones por cólera en los 10 departamentos de Haití. Durante las últimas tres semanas epidemiológicas, los departamentos que registraron la mayor incidencia acumulada de casos de cólera continúan siendo Artibonite (305 casos por 10.000 habitantes), seguido de Nord Ouest, Nord y Centre (con 190, 185 y 167 casos por 10.000 habitantes respectivamente).

En Port-au-Prince y área metropolitana, entre la SE 44⁴ y la SE 50, se registraron 20.853 casos de cólera, de los cuales, 38,1% (7.942) han sido hospitalizados y 257 fallecieron (248 a nivel de servicios de salud y 9 a nivel de la comunidad). La tasa de letalidad hospitalaria hasta la SE 50 es de 3,1 % y la tasa de letalidad global de 1,2%.

A nivel nacional, durante la SE 50 se registró un nuevo aumento, tanto en el número de casos nuevos como en los hospitalizados por cólera, luego de dos semanas consecutivas de disminución de estos indicadores. La tasa de letalidad hospitalaria por cólera sigue en tendencia decreciente por octava semana consecutiva.

¹ Grupo de Acción Sanitaria: está compuesto por las organizaciones que están trabajando en la respuesta al brote de cólera en Haití, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Merlin, International Medical Corps, Partners in Health y Save the Children, al igual que otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones bilaterales. El MSPP y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) coordinan el Grupo de Acción Sanitaria.


² El 20 de octubre de 2010 se confirmaron laboratorialmente los primeros casos de cólera en pacientes hospitalizados en el departamento de Artibonite. El laboratorio de Salud Pública de Haití aisló *V. cholerae* O:1 serotipo Ogawa. Este aislamiento fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

³ A partir del 16 de noviembre el MSPP incorpora en su informe diario de casos, los registros de consultas debido a cólera, los cuales son considerados como casos.

⁴ Las primeras hospitalizaciones por cólera fueron informadas por el MSPP a partir del 7 de noviembre de 2010.

A nivel departamental, durante la SE 50 se siguió registrando una disminución, tanto en el número de casos nuevos de cólera como en el de hospitalizados, en los mismos cuatro departamentos (Artibonite, Centre, Nord y Nord Ouest). Durante esta misma semana, el departamento Sud Est registró una disminución en estos indicadores por vez primera. En los restantes seis departamentos, se registró un aumento en el número de casos nuevos y hospitalizados por cólera. Los mayores incrementos se registraron en Ouest, Grand Anse y Nippes. En cuatro departamentos (Artibonite, Nord Ouest, Ouest y Sud Est) se registró una tasa de letalidad hospitalaria menor a la registrada en la SE anterior; en los demás se observó un incremento.

Figura 1. Curva diaria de casos y letalidad por cólera. Haití. SE 42 a la SE 50



Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population

Las actualizaciones diarias respecto al número de casos, hospitalizaciones y defunciones por cólera se publican a través del Mapa Interactivo de Cólera el cual se encuentra disponible a través del siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html

El informe sobre las acciones de respuesta realizadas por el Grupo de Asistencia Sanitaria, a nivel nacional y departamental se encuentra disponible en el siguiente enlace:

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=3487

República Dominicana

A partir de la SE 46⁵ y hasta la SE 50, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana ha registrado 73 casos de cólera confirmados laboratorialmente, de los cuales 5% (55) fueron hospitalizados. Hasta el momento no se han registrado defunciones. Cuatro casos se consideraron importados y 69 autóctonos.

Se registraron casos en 10 de las 32 provincias del país: Santiago (19), Santo Domingo (15), Elías Piña (13), San Juan (12), Da-jabón (3), Valverde (2), Independencia (2), Monte Cristi (1), San Cristóbal (1) y María Trinidad Sánchez (1).

La Organización Panamericana de la Salud reitera a los Estados Miembros la necesidad de redoblar los esfuerzos de vigilancia y de implementar las medidas de prevención y promoción de la salud apropiada en base a los planes actualizados de preparación y respuesta.

Recordamos que continúan vigente las recomendaciones de la OMS publicadas el 7 de diciembre de 2010 de la página de **Viajes Internacionales y Salud de la Organización Mundial de la Salud:**

Haití, viajes, comercio y cólera

A pesar de que es inusual que los turistas y visitantes a corto plazo puedan verse afectados por el cólera, siempre y cuando se adhieran a la seguridad alimentaria e higiene adecuada; esta enfermedad sigue causando graves brotes en algunas partes del mundo donde los suministros de agua, saneamiento, seguridad alimentaria y la higiene son insuficientes.

La OMS no recomienda restricciones de viaje a las personas ni al comercio en relación con el brote de cólera en Haití. Se alienta a las autoridades nacionales a ofrecer a los viajeros que llegan, información sobre los síntomas del cólera, las medidas preventivas de higiene y donde buscar atención médica en caso de que se presenten síntomas. De igual manera, se alienta a las autoridades a difundir a todas las clínicas para viajeros, redes de medicina del viajero y otras redes de atención de salud, información sobre la situación del cólera a nivel mundial y de los brotes actuales.

<http://www.who.int/ith/updates/20101207/en/index.html>

Versión original en inglés. Traducción no oficial al español.

Referencias

1. Ministère de la Santé Publique et de la Population de Haiti. Disponible en: http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=1
2. Grupo de Acción Sanitaria. Boletín Informativo N° 7, 4 de diciembre de 2010. Disponible en: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4404&Itemid=3487

⁵ El 16 de noviembre de 2010, el laboratorio de Referencia Nacional aisló *V. cholerae* O:1 serotipo Ogawa a partir de la muestra del paciente de 32 años.