

Situación de la epidemia

En Uruguay la epidemia presenta un patrón de tipo concentrado. La prevalencia del VIH en población general es inferior al 1%. El estudio de prevalencia de alcance nacional realizado en el 2008 por el equipo del Departamento de Vigilancia en Salud (DEVISA) y el Departamento de Laboratorio de Salud Pública mostró una seroprevalencia de VIH de 0,42%

En poblaciones más expuestas, las cifras alcanzan a 36% en personas Trans, 8% en profesionales del sexo masculinos, a 9%, en HSH, 5.5% en varones privados de libertad.


La relación varón/mujer ha disminuido en forma constante. La principal vía de transmisión, responsable de un 68% de los casos de VIH/SIDA, es la sexual.

La transmisión madre a hijo, es responsable del 2,6% de los casos de VIH/SIDA notificados.

La epidemia afecta mayormente a los jóvenes, con una media de 33 años para los casos de VIH/SIDA. La edad de mayor frecuencia de casos es 26 años.

Geográficamente la epidemia se distribuye en la población urbana, concentrándose en la capital Montevideo, que posee la tasa de incidencia de nuevos diagnósticos más alta del país. Se observan incidencias elevadas, por encima de la media en los departamentos fronterizos con Brasil y en los departamentos de destino turístico de la costa atlántica.

Tasa de notificaciones de SIDA y VIH



Información de poblaciones PEMAR

Estudios de 2° generación (serológico, comportamental, de prácticas y actitudes)

Profesionales del sexo masculino y trans

Antecedente censo en 2006 y 2007 en profesionales del sexo masculinos y trans callejeros: 1721 profesionales del sexo. Se realizó un estudio serológico y comportamental en una muestra por conveniencia dentro de las personas contactadas en el 2008. Muestra 313 que ejercían su actividad en calle.

Resultados:

- Media de edad 30 años
- 1/3 vivía en situación de calle.
- Uno de cada 5 terminó la enseñanza secundaria.
- Prevalencia de consumo de drogas es muy elevada.
- El del preservativo en las relaciones sexuales comerciales es de 84 %.
- La prevalencia de la infección por VIH es 19.3. Trans 36.54% y taxi-boys 8.15%

Pro Fundación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública

HSH

2008 se realizó por primera vez un estudio serológico y comportamental en una muestra por conveniencia.

Los HSH representan el 3% de la población nacional.

Muestra de 309 casos contactados en calle y discotecas.

Resultados:

- El promedio de fue de 26 años
- El nivel educativo no difería de la población general de referencia.
- Las relaciones sexuales heterosexuales de forma ocasional o frecuente se reportaron en 43% de los casos.
- Menos de la mitad de los casos (44%) se realizó la prueba de VIH alguna vez en su vida.
- La prevalencia del VIH fue de 9%.

Alcance de los estudios limitado: Montevideo y área metropolitana

Muestreo por conveniencia, o sea realizado en personas contactadas a través de pares, por lo que no representan muestras representativas ni probabilísticas

PPL

En el año 2007-08, estudio de 2da generación en la cárcel de varones del Departamento de Canelones, encontró 5,5% de casos VIH positivos.

Usuarios de drogas

2004 prevalencia de 18.5% de la infección VIH en UDI.

Los usuarios de cocaína no inyectada presentan una prevalencia de 9,5% (2003- 2004).

Actualmente se está ejecutando un estudio en usuarios de drogas no inyectables utilizando metodología RDS (Respondent Driven Sampling)

Difusión: los estudios sobre Trans y trabajadores sexuales masculinos fue impreso y presentado públicamente

En que ha sido útil la información y como se esta utilizando ?

En base a los datos se elaboró la propuesta país a la 10 Ronda del Fondo Mundial, proyecto finalmente aprobado y en ejecución con acciones de promoción, prevención, empoderamiento y diagnóstico en PEMAR (HSH y Trans), promoviendo la inclusión social. Igualmente, los datos permitieron el desarrollo de líneas de acción con énfasis en las poblaciones vulnerables en el Plan Estratégico Nacional