


VENEZUELA (República Bolivariana de)

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS¹



- **Población total:** 29.436.900
- **Media anual de defunciones:** 153.100
- **Esperanza de vida al nacer (años):**
Total: 75 Male: 72 Female: 78
- **Población adulta alfabetizada:** 95,2%
- **Ingreso nacional bruto US\$ per cápita:** 10.090


FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de:	Total (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Adultos fumadores actuales de tabaco ^{2,a}	21,5	28,9	14,4
Jóvenes consumidores actuales de cualquier producto de tabaco ³	9,4	11,0	7,2
Consumo de frutas y verduras en adultos ^{1,b}
Consumidores de alcohol en los últimos 12 meses ⁴
Actividad física baja en adultos ^{1,c}
Obesidad en adultos (IMC ≥ 30) ¹	30,8	26,6	34,8
Prevalencia de VPH (mujeres con citología normal) ⁵


Notas: a: Adultos de 18 a 65 años; b: % que consume 5 o más porciones de frutas y verduras al día; c: % físicamente activo <600 met por minuto; IMC: Índice de masa corporal; VPH: Virus del Papiloma Humano.

PERFIL DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2009)⁶


HOMBRES



MUJERES



TENDENCIAS DE LAS TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER (2000-2009)⁶



Porcentaje medio de cambio anual (PMCA) de las tasas estandarizadas de mortalidad, según tipo de cáncer (2000-2009) ⁶				
Tipo de cáncer	Sexo	Número de muertes (2009)	TEM (2009)	PMCA
Todos los cánceres	Hombres	10.152	104.86	-2.0*
	Mujeres	9.852	86.38	-3.1*
Cáncer de mama		1.643	14.12	-1.8
Cáncer cervicouterino		1.199	9.91	-3.1*
Cáncer colorrectal	Hombres	655	6.79	-1.94*
	Mujeres	722	6.55	-3.5*
Cáncer de hígado	Hombres	443	4.60	-1.75*
	Mujeres	424	3.87	-3.71*
Cáncer de pulmón	Hombres	1.916	19.69	-1.0
	Mujeres	1.184	10.71	-1.7*
Cáncer de próstata		2.076	24.57	-2.03*
Cáncer de estómago	Hombres	1.167	12.16	-3.56*
	Mujeres	750	6.50	-5.92*

Notas: TEM: Tasa estandarizada de mortalidad; PMCA: Porcentaje medio de cambio anual; *: El PMCA es estadísticamente significativo distinto de cero para $p=0.05$.

PLANES DE CÁNCER Y REGISTROS DE CÁNCER⁷

Política, estrategia o plan de acción nacional integrado para las ENT	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción integrado para las ENT?	Si
¿Está incluido el cáncer en el plan de ENT?	Si
Primer año de implementación	2005
Política, estrategia o plan de acción para el cáncer	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para el cáncer?	Si
Primer año de implementación	1946
Registro de cáncer	
¿Hay un registro de cáncer?	Si
¿Alcance (Nacional vs. Subnacional)?	Nacional
¿Tipo de registro (Poblacional vs. hospitalario)?	Hospitalario
Último año con información disponible	2010

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER

Control del tabaco³	
¿Espacios libres de humo?	Todos los espacios públicos son totalmente libres de humo
¿Impuestos sobre el tabaco?	Los impuestos representan el 71% del precio final
¿Advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco?	Advertencia grande con todas las características apropiadas
¿Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco?	Ausencia completa de prohibiciones, o prohibición que no cubre al menos televisión, radio y medios impresos a nivel nacional
Prevención y control del sobrepeso y la obesidad⁷	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del sobrepeso y la obesidad? (Primer año de implementación)	En desarrollo
Prevención y control del consumo abusivo de alcohol⁷	
¿Hay una política, estrategia o plan de acción para la reducción del consumo abusivo de alcohol? (Primer año de implementación)	En desarrollo
¿Está incluida la vacuna frente al VPH en el programa nacional de inmunizaciones?⁸	
Año de introducción/Población diana/Estrategia de administración	N/A
Cobertura estimada de 3 dosis (año de calendario)	N/A
¿Está incluida la vacuna frente al VHB en el programa nacional de inmunizaciones?⁸	
Año de introducción/Población diana	2000/Recién nacidos-2m-4m-6m-18m; grupos de riesgo, personal sanitario
Cobertura estimada de 3 dosis (2012)	81%

CANCER SCREENING

Cáncer cervicouterino	
Guías de práctica clínica⁹	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer cervicouterino?	Si
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	Pap /25-64 años/ cada 3 años después de dos Paps anuales negativos consecutivos
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Citología cervical⁷	
Inspección visual con ácido acético ⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje⁹	
	25% de la población diana (2011)

TAMIZAJE DEL CÁNCER

Cáncer de mama	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer de mama?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Examen clínico de las mamas⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Mamografía⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...
Cáncer colorrectal	
Guías de práctica clínica	
¿Se dispone de guías para el tamizaje del cáncer colorrectal?	...
Recomendaciones de la guía (Prueba/Grupo de edad/Frecuencia)	...
Disponibilidad y cobertura de los servicios de tamizaje	
Prueba de sangre oculta en heces o prueba inmunológica con material fecal⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Exploración o colonoscopia⁷	Generalmente disponible en los sectores público y privado
Cobertura de tamizaje	...

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y CUIDADOS PALIATIVOS

Radioterapia ¹⁰		Morfina oral ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público? ⁷	Generalmente disponible	¿Disponibilidad en el sector público?	Generalmente disponible
Unidades de telerradioterapia/millón de habitantes	2,4	¿Cubierto por seguro de salud o financiado públicamente?	Si
Centros de radioterapia	58	¿Aparece en la lista de medicamentos esenciales?	Si
Oncólogos radioterapeutas	172	Consumo de opioides ¹⁴	
Médicos físicos	47	Total de equivalentes de morfina, per cápita	2,88
Quimioterapia ⁷		¿Disponibilidad cuidados comunitarios/domiciliarios? ⁷	
¿Servicio disponible en el sector público?	Generalmente disponible	¿Hay servicios comunitarios/domiciliarios disponibles en el sector público para personas con ENT en etapas avanzadas?	Generalmente no disponible

Notas: ... Información no disponible; N/A: No aplicable; m: meses.

Fuentes:

- (1) OPS. Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011. Washington D.C, EUA, 2011.
- (2) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.who.int/tobacco>
- (3) PAHO/WHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas, 2013. Washington D.C, USA, 2013.
- (4) WHO. Global Information System on Alcohol and Health, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/17zhuqZ>.
- (5) ICO. Information Centre on HPV and Cancer, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.hpvcentre.net/>.
- (6) OPS. Sistema de Información de mortalidad, 2012.
- (7) OPS. Encuesta Nacional Sobre la Capacidad de los países para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2013.
- (8) OPS. Unidad de inmunización integral de la familia. Año de introducción—Informes de los países a la OPS; Pauta-OPS. Perfiles de inmunización de los países, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn4Td3>; Cobertura—OPS. Cobertura de inmunizaciones reportada en las Américas, por tipo de vacuna consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://bit.ly/1dn59ZK>.
- (9) Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC/UNASUR). Informe preliminar reducido sobre la situación del control del cáncer de cuello uterino en 8 países de Latinoamérica. 2012.
- (10) OMS/IAEA Base de datos del directorio de centros de radioterapias (DIRAC), consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.naweb.iaea.org/nahu/dirac/>.
- (11) Universidad de Wisconsin. Centro colaborador de la OMS para las políticas sobre el dolor y los cuidados paliativos, Base de datos sobre consumo de opioides 2010, consultado el 28 de Agosto del 2013, en <http://www.painpolicy.wisc.edu/countryprofiles/amro>