


# ESTRATEGIA FIN DE LA TB: PRINCIPALES INDICADORES EN LAS AMÉRICAS

## INDICADORES DE ALTO NIVEL


Reducción en número de muertes por TB en 35% para 2020.	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
Datos estimados	25.100	16.300	2.500

### Muertes Estimadas por TB en las Américas: Tendencia, Hitos y Metas



Reducción de la tasa de incidencia por TB en 20% para 2020.	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
Estimados x 100.000 hab.	27,3	21,6	5,6

### Incidencia estimada de TB en Las Américas: Tendencia, Hitos y Metas



Familias afectadas por TB que enfrentan gastos catastróficos por la TB (%)	Línea Base 2015	Hito 2020	Meta 2030
	ND**	Cero	Cero

\*\* No Disponible

## Número de muertes notificadas por TB, Estadísticas Vitales 2016

País	Muertes 2016*
Brasil	6329
México	2569
Argentina	749
Estados Unidos de América	592
Ecuador	579
Chile	457
Guatemala	347
Paraguay	265
Panamá	253
Nicaragua	159
Uruguay	82
Cuba	55
Puerto Rico	13
Belice	9
<b>Total</b>	<b>12.458</b>

\* Incluye casos TB/VIH

- 14 países notificaron 12.458 defunciones por TB, a través de sus estadísticas vitales en 2016. Muchas de estas muertes pudieron ser evitadas.
- En 2017 la brecha en la detección de casos por TB en la Región fue de **53.000**.
- Desde el año 2000 la disminución de la tasa de incidencia ha sido 1,6% por año. Para lograr el hito 2020 de las metas de la Estrategia Fin de la TB se requiere un descenso de 8% anual.
- Es necesario que los países realicen encuestas sobre los **gastos catastróficos** que las familias afectadas deben afrontar.

## ESTRATEGIA FIN DE LA TB - INDICADORES PRIORITARIOS

INDICADOR		VALOR 2017	META 2025
Cobertura de tratamiento anti-TB*		81%	≥ 90%
Tasa de éxito de tratamiento	Nuevos y recaídas (2016)	75%	≥ 90%
	RR/MDR (2015)	56%	
Porcentaje de familias afectadas por TB que enfrentan gastos catastróficos por la TB		ND**	0%
Porcentaje de pacientes nuevos de TB que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas por la OMS		13%	≥ 90%
Cobertura de tratamiento de infección latente por TB	menores de 5 años	57%	≥ 90%
	VIH	16%	≥ 90%
Cobertura de investigación de contactos		5%***	≥ 90%
Cobertura de pacientes de TB con resultados de pruebas de sensibilidad a drogas		33%	100%
Cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos anti-TB		ND**	≥ 90%
Porcentaje de pacientes con TB que conocen su estado de VIH		81%	100%
Tasa de letalidad por TB		6,5***	≤ 5%

\* Calculado sobre el número estimado de casos incidentes

\*\* No disponible

\*\*\* Valor correspondiente a 2015

Recomendaciones para acelerar el avance hacia el fin de la TB en las Américas:

1. Mejorar y/o acelerar la implementación y expansión del diagnóstico temprano con las nuevas pruebas rápidas moleculares.
2. Promover el estudio de contactos, principalmente en los menores de 15 años.
3. Acelerar la implementación de los nuevos esquemas de TB-MDR y la introducción de medicamentos dispersables pediátricos para mejorar los resultados del tratamiento de TB.
4. Aumentar el trabajo con poblaciones vulnerables y sobre los determinantes sociales con actividades interprogramáticas e intersectoriales centradas en las personas y en la comunidad.
5. Promover los abordajes especiales como la Iniciativa de control de la TB en Grandes Ciudades, el Frente Parlamentario de Tuberculosis y expansión de la investigación operativa.
6. Cubrir las brechas financieras existentes con recursos sostenibles, reduciendo la dependencia de fondos externos.