

La rabia humana transmitida POR EL PERRO EN LAS AMÉRICAS

Los resultados alcanzados en los últimos 36 años permiten afirmar que la rabia humana de origen canina (variante 1 y 2) puede ser eliminada en el continente americano para 2022

0

casos de rabia humana transmitida por el perro en 2019

0

casos de rabia humana transmitida por el perro en la América Continental en los últimos 12 meses

Cerca de
100

millones de perros vacunados al año en campañas de vacunación contra la rabia

La región de las Américas muestra una situación favorable con respecto a la situación global donde gran parte de los países desarrollan eficientemente sus programas de eliminación y mantienen la cobertura de inmunización canina adecuadas para evitar la reintroducción de la rabia en humanos.

Éxitos en las Américas



Gran parte de los países de las Américas han alcanzado la **eliminación de la rabia en sus poblaciones caninas**

100% de los casos humanos son prevenibles por medio de la vacunación de poblaciones caninas



Las **vacunas antirrábicas** más utilizadas y preconizadas en los países de las Américas son las vacunas inactivadas producidas en cultivos celulares

Estrategia Regional de la OPS

- Fortalecimiento de la capacidad de sostenimiento de los programas nacionales de rabia en los países
- Implementación de campañas masivas de vacunación canina **anualmente**
- Cobertura vacunal de al menos **80%** de la población total de perros
- Mejora del acceso, la disponibilidad y la calidad de inmunobiológicos y de atención para personas expuestas a la rabia
- En 1983 se realiza la 1ª REDIPRA - Reunión de Directores de los Programas de Rabia de las Américas, desde entonces se han llevado a cabo 16 Reuniones
- Fortalecimiento de la capacidad del diagnóstico laboratorial

Las acciones para la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro en las Américas se iniciaron en 1983, con el Programa Regional de Eliminación de la Rabia de la OPS, coordinado por PANAF-TOSA/OPS.

Último caso (oficial) en las Américas ocurrió en diciembre de 2018

Desde 1983, la incidencia de la rabia humana transmitida por perros en las Américas se han reducido en el 95% y 98% en humanos y perros respectivamente.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha establecido el objetivo de eliminar la rabia humana transmitida por el perro en las Américas para el 2022

Rabia Humana por Perros en las Américas

1983	1990	2000	2010	2018	2019 (Sep)	2022
258	224	59	6	13	0	0

Rabia en Perros en las Américas

1983	1990	2000	2010	2018	2019 (Sep)
11.276	7.760	1.958	400	163	41