MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD | Organización Panamericana de la Salud | Organización Mundial de la Salud OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

ESQUEMA DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO HTA NO COMPLICADA

Paso 1	**IECA o ARA + DIURETICO**
	Si a las 4 semanas Presión arterial Persiste igual o mayor de 140/90mmhg
Paso 2	**IECA o ARA + DIURETICO + ANTAGONISTA DE LOS CANALES DE CALCIO**
	Si a las 4 semanas Presión arterial Persiste igual o mayor de 140/90mmhg
Paso 3	**AUMENTAR LA DOSIS DE IECA o ARA + DIURETICO + ANTAGONISTA DE LOS CANALES DE CALCIO**
	Si a las 4 semanas Presión arterial Persiste igual o mayor de 140/90mmhg
Paso 4	**IECA o ARA + DIURETICO + AUMENTAR LA DOSIS DE ANTAGONISTA DE LOS CANALES DE CALCIO**
	Si a las 4 semanas Presión arterial Persiste igual o mayor de 140/90mmhg
Paso 5	**IECA o ARA + AUMENTAR LA DOSIS DE DIURETICO + ANTAGONISTA DE LOS CANALES DE CALCIO**
	SI A LAS 4 SEMANAS PRESIÓN ARTERIAL PERSISTE IGUAL O MAYOR DE 140/90MMHG REFIERA A UN ESPECIALISTA EN HIPERTENSION

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

ESQUEMA DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO HTA NO COMPLICADA

Algoritmo 1: PRIMERA ELECCIÓN

Si TA ≥140/90 sin comorbilidad

ESTE PROTOCOLO ESTÁ CONTRAINDICADO EN MUJERES QUE ESTÉN O PUEDAN QUEDAR EMBARAZADAS

SI ≥ 140 o ≥ 90**

Enalapril 10mg	Hidroclorotiazida 12.5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Enalapril 10mg	Hidroclorotiazida 12.5mg	Amlodipina 2.5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Enalapril 20mg	Hidroclorotiazida 12.5mg	Amlodipina 2.5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Enalapril 20mg	Hidroclorotiazida 12.5mg	Amlodipina 5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Enalapril 40mg	Hidroclorotiazida 25mg	Amlodipina 5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90

Comprobar adherencia, **REFERIR**

HEARTS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

ESQUEMA DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO HTA NO COMPLICADA

Algoritmo 1: SEGUNDA ELECCIÓN

Si TA >140/90 sin comorbilidad

ESTE PROTOCOLO ESTÁ CONTRAINDICADO EN MUJERES QUE ESTÉN O PUEDAN QUEDAR EMBARAZADAS

SI ≥ 140 o ≥ 90**

Losartan 50mg	Hidroclorotiazida 12.5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Losartan 50mg	Hidroclorotiazida 12.5mg	Amlodipina 2.5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Losartan 100mg	Hidroclorotiazida 12.5mg	Amlodipina 2.5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Losartan 100mg	Hidroclorotiazida 12.5mg	Amlodipina 5mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90 ; Comprobar adherencia

Losartan 100mg	Hidroclorotiazida 25mg	Amlodipina 10mg

4 semanas después

SI persiste ≥ 140 o ≥ 90

Comprobar adherencia, **REFERIR**

HEARTS