


ESTRATEGIA FIN DE LA TB: PRINCIPALES INDICADORES EN LAS AMÉRICAS

Indicadores de Alto Nivel

Reducción del número de	Línea Base	Hito	Meta
muertes por TB en 90%	2015	2020	2030
para 2030* Datos estimados	24.900	16.200	2.500

Reducción de la tasa de	Línea Base	Hito	Meta
incidencia por TB en 80% para	2015	2020	2030
2030* Estimados x 100.000 hab.	27,5	22	5,5

Muertes estimadas por TB en las Américas: tendencia, hitos y metas



Incidencia estimada de TB en las Américas: tendencia, hitos y metas



Familias afectadas por TB que enfrentan	Línea Base	Hito	Meta
gastos catastróficos por la TB (%)	2015	2020	2030
	ND**	Cero	Cero

^{*}En comparación con 2015

Países con Alta Carga* Estimada de TB las Américas, 2019

País	Número de casos estimados	% del total de casos estimados	Incidencia estimada (x100.000 habitantes)
Brasil	96.000	33,1%	45,5
Perú	39.000	13,4%	120,0
México	30.000	10,3%	23,5
Colombia	19.000	6,6%	35,8
Haití	18.000	6,2%	168,7
Argentina	13.000	4,5%	29,0
Venezuela	13.000	4,5%	45,6
Bolivia	12.000	4,1%	104,2
Ecuador	7.900	2,7%	45,5
El Salvador	3.800	1,3%	58,9
Paraguay	3.300	1,1%	46,8
Guyana	620	0,2%	79,2
Total	255.620	88%	46,5
Total región	290.000	100%	28,7

*Países con más de 10.000 casos y países con una tasa de incidencia > 45 por 100.000 habitantes.

- 12 países tienen una alta carga estimada de TB con una incidencia mayor de 45 x 100.000 habitantes. Representan el 88% del total de casos de la Región.
- En 2019 la brecha en la detección de casos por TB en la Región fue de 52.500 casos.
- En los últimos 5 años la tasa de incidencia se ha incrementado. Para lograr el hito 2020 de las metas de la Estrategia Fin de la TB se requiere un descenso de 23% anual.
- Es necesario que los países realicen encuestas sobre los costos catastróficos que las familias afectadas deben afrontar.

^{**} No disponible

Estrategia Fin de la TB - Indicadores Prioritarios

	INDICADOR	VALOR 2019	META 2025	
Cobertura de tratamiento anti-TB*		81%	≥ 90%	
Tasa de éxito de tratamiento	Nuevos y recaídas (2018)	76%	> 000/	
	RR/MDR (2017)	59%	≥ 90%	
Porcentaje de familias afectadas por TB que enfrentan gastos catastróficos por la TB		ND**	0%	
Porcentaje de pacientes nuevos de TB que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas por la OMS		25%	≥ 90%	
Cobertura de tratamiento de infección latente por TB	menores de 5 años	61%	≥ 90%	
	VIH	26%	≥ 90%	
Cobertura de investigación de contactos		70%	≥ 90%	
Cobertura de pacientes de TB con resultados de pruebas de sensibilidad a drogas		38%	100%	
Cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos anti-TB		ND**	≥ 90%	
Porcentaje de pacientes con TB que conocen su estado de VIH		80%	100%	
Tasa de letalidad por TB		8%	≤ 5%	

^{*} Calculado sobre el numero estimado de casos incidentes

Recomendaciones para acelerar el avance hacia el fin de la TB en las Américas:

- 1. Mejorar y/o acelerar la implementación y expansión del diagnóstico temprano con las nuevas pruebas rápidas moleculares.
- 2. Aumentar la búsqueda de casos de TB y el estudio de contactos.
- 3. Garantizar el tratamiento preventivo de TB, principalmente en menores de 15 años y personas con VIH.
- 4. Acelerar la implementación de los nuevos esquemas de orales de tratamiento de TB-RR/MDR y la introducción de medicamentos dispersables pediátricos.
- 5. Fortalecer las intervenciones con poblaciones vulnerables y sobre los determinantes sociales de TB a través de actividades interprogramáticas e intersectoriales centradas en las personas y en la comunidad.
- 6. Promover los abordajes especiales como la Iniciativa de control de la TB en Grandes Ciudades, el Frente Parlamentario contra la TB y la expansión de la investigación operativa.
- 7. Cubrir las brechas financieras existentes, reduciendo la dependencia de fondos externos, para garantizar la sostenibilidad.
- 8. Implementar el marco de rendición de cuentas multisectorial (MRC-TB) para facilitar el logro de las metas y compromisos internacionales.

www.paho.org/tuberculosis © OPS/OMS, 2021

^{**} No disponible