



## Casos TB/VIH estimados y notificados en las Américas, 2005-2019



## Proporción de casos notificados de TB que conocen su estado de VIH y porcentaje con coinfección TB/VIH - las Américas, 2005-2019



### En el Mundo (2019)

- La OMS estimó que, de 10 millones de personas con TB, 815.000 estarían coinfectadas con VIH (8%).

### En las Américas (2019)


#### La OMS estimó:

- 290.000 casos nuevos de tuberculosis.
- 29.000 casos nuevos de TB en personas con VIH (10%).
- De las muertes estimadas en 2019 (22.900), el 26% ocurrió en personas con VIH.
- El 80% de los casos con TB/VIH se concentra en 7 países: Brasil, México, Haití, Perú, Colombia, República Dominicana y Ecuador.


#### Se notificaron:

- 235.600 casos nuevos de TB.
- 187.956 personas con TB conocían su estado de VIH (80%), manteniéndose este porcentaje estable en los últimos 5 años.
- 20.124 personas con TB presentaron coinfección con VIH.

## Cobertura de TAR en personas con TB/VIH - las Américas, 2019



## Resultado de tratamiento para casos nuevos y recaídas de TB/HIV - las Américas, 2012-2018



- El 61% de las personas con TB/VIH recibieron TAR\*, con diferencias importantes entre los países (debilidades en los sistemas de información y reporte pueden afectar estas cifras).
- Los resultados de la cohorte de casos TB/VIH se han mantenido estables, con alta mortalidad, pérdida de seguimiento y no evaluados.
- Comparativamente con la cohorte de casos nuevos de TB, en la de TB/VIH se triplica la mortalidad y duplica la pérdida en el seguimiento.
- En la última década la proporción de pacientes que ha culminado con éxito su tratamiento se ha incrementado, sin embargo, el éxito de tratamiento aun es bajo.
- Se requiere fortalecer la implementación de las actividades de colaboración TB/VIH para lograr que estos casos se diagnostiquen temprano, se traten oportunamente y se eviten muertes.
- La cobertura de la terapia preventiva con isoniacida (TPI) en personas viviendo con VIH es actualmente muy baja con 26% en el 2019. No todos los países notifican.

\*TAR: tratamiento antirretroviral