



Datos demográficos y socioeconómicos

Población Total (en 1000) (2020)	97.93
Población <1 año de edad (en 1000)(2020)	1.44
Población de 1 año de edad (in 1000)(2020)	1.46
Población <5 años de edad (in 1000) (2020)	7.36
Mujeres en edad fértil (2020)	71.30
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2017)	18.00
Ingreso nacional bruto (US\$ per capita) valor actual (2020)	14,250.0
Gasto nacional en salud en % del PIB (Público) (2018)	2.9
Gasto nacional en salud en % del PIB (Privado) (2018)	2.3

Destacados del sistema de inmunización

- No existe un plan multianual de inmunización exhaustivo.
- Existe un comité nacional de prácticas de inmunización con términos de referencia escritos. El grupo se reunió 2 veces en 2020.
- No información disponible en los gastos de inmunización de rutina son financiados con fondos del gobierno.
- No información disponible en los gastos en compra de vacunas son financiados con fondos del gobierno.
- Un registro nominal de vacunación electrónico está en progreso.


Introducción de vacunas

	Año
Antineumocócica conjugada	
Fiebre amarilla	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	2000
Hepatitis B	1999
Influenza	2007
Meningitis bacteriana	
Pentavalente	2000
Rotavirus	
SRP1	1988
SRP2	1997
Tdap	
Tetavalente DPT-Hib or DPT-HepB	
VPH	2018

Esquema de vacunación

ATG	Dosis					
	1	2	3	4	5	6
BCG						
HepB pediátrica						
DTP-Hib						
DTP-Hib-HepB	M2	M4	M6			
DTP-Hib-IPV						
DTP-Hib-HepB-IPV						
DTP				M18		
Influenza pediátrica						
IPV	M2	M4				
OPV			M6	M18	A5	A15
SRP	M12	M18				
Neumoco conjugada	M2	M4	M6			
Rotavirus						
Td						A15
Tdap						
VPH	A9-13	+M6	+A1 grupos mayor de edad			

Cobertura de vacunación



Indicadores de vigilancia

Parálisis flácida aguda (PFA) - (CARPHA) 2020


Casos sospechosos de PFA	4
Tasa de PFA por 100.000 habitantes	0.22
% de muestras adecuadas	25
% de casos con investigación <48 horas	50
% de unidades notificados	72

Sarampión-rubeola (SR) - CARPHA) 2020


Numero de casos sospechosos de SR	55
% de casos con investigación adecuada	60
% de casos con muestra de sangre adecuada	96
% de muestras de sangre que llegan al lab. <= 5 días	22
% de resultados de laboratorio reportados <=4 días	76




Cobertura de polio y tasa de PFA por 100.000 niños <15 años de edad




Cobertura de DTP3 y casos reportados de difteria y tos ferina




Número de casos de tétanos (no neonatal) y tétanos neonatal



Proporción de municipios por rango de cobertura con DTP3 en niños <1 año de edad



Tasa de deserción de DTP1-DTP3 y DTP1-SRP1



Desabastecimiento de las vacunas

ATG	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antineumo. conj.				●	●	●	●	●
BCG								
DTP				●	●	●	●	●
Fiebre amarilla			●	●	●	●	●	●
HepB		●		●	●	●	●	●
Hib					●			
Influenza			●	●	●	●	●	●
IPV			●	●	●	●	●	●
Polio	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotavirus								
Sarampión					●	●	●	●
Tdap					●	●	●	●
TT						●	●	●
Cajas de seguridad			●	●	●	●	●	●
Jeringas AD						●	●	●
Jeringas desechables				●	●	●	●	●
Jeringas para reconst.					●	●	●	●

Leyenda
 RN/rn-recién nacido
 M/m -mes
 A/a-año
 MEF-mujeres en edad fértil
 ● con desabastecimiento
 ● sin desabastecimiento
 sin datos disponibles