



Datos demográficos y socioeconómicos

Población Total (en 1000) (2020)	393.25
Población <1 año de edad (en 1000)(2020)	5.99
Población de 1 año de edad (in 1000)(2020)	5.58
Población <5 años de edad (in 1000) (2020)	27.06
Mujeres en edad fértil (2020)	295.97
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2016)	16.00
Ingreso nacional bruto (US\$ per capita) valor actual (2020)	27,780.0
Gasto nacional en salud en % del PIB (Público) (2018)	3.1
Gasto nacional en salud en % del PIB (Privado) (2018)	3.1

Destacados del sistema de inmunización

- No existe un plan multianual de inmunización exhaustivo.
- Existe un comité nacional de prácticas de inmunización con términos de referencia escritos. El grupo se reunió 2 veces en 2020.
- No información disponible en los gastos de inmunización de rutina son financiados con fondos del gobierno.
- No información disponible en los gastos en compra de vacunas son financiados con fondos del gobierno.
- Un registro nominal de vacunación electrónico está en progreso.


Introducción de vacunas

	Año
Antineumocócica conjugada	2012
Fiebre amarilla	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	1998
Hepatitis B	2001
Influenza	2005
Meningitis bacteriana	
Pentavalente	2001
Rotavirus	2014
SRP1	1991
SRP2	2001
Tdap	
Tetavalente DPT-Hib or DPT-HepB	
VPH	2015

Esquema de vacunación

	Dosis					
BHS	1	2	3	4	5	6
BCG						
HepB pediátrica	1er contacto	+M1	+M5			
DTP-Hib				M15		
DTP-Hib-HepB	M2	M4	M6			
DTP-Hib-IPV						
DTP-Hib-HepB-IPV	M2	M4	M6			
DTP					A4-A5	
Influenza pediátrica						
IPV	M2	M4				
OPV			M6	A4-Y5		
SRP	M12	M15				
Neumoco conjugada	M2	M4	M6	M15		
Rotavirus	M2	M4				
Td						
TdaP						A12
VPH	A9-A10	+M1-M2	+M6			

Cobertura de vacunación



Indicadores de vigilancia

Parálisis flácida aguda (PFA) - (CARPHA) 2020


Casos sospechosos de PFA	4
Tasa de PFA por 100.000 habitantes	0.22
% de muestras adecuadas	25
% de casos con investigación <48 horas	50
% de unidades notificados	72

Sarampión-rubeola (SR) - CARPHA) 2020


Numero de casos sospechosos de SR	55
% de casos con investigación adecuada	60
% de casos con muestra de sangre adecuada	96
% de muestras de sangre que llegan al lab. <= 5días	22
% de resultados de laboratorio reportados <=4 días	76




Cobertura de polio y tasa de PFA por 100.000 niños <15 años de edad




Cobertura de DTP3 y casos reportados de difteria y tos ferina




Número de casos de tétanos (no neonatal) y tétanos neonatal



Proporción de municipios por rango de cobertura con DTP3 en niños <1 año de edad



Tasa de deserción de DTP1-DTP3 y DTP1-SRP1



Desabastecimiento de las vacunas

BHS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antineumo. conj.	●		●	●	●	●	●	●
BCG								●
DTP	●		●	●	●	●	●	●
Fiebre amarilla	●		●	●	●	●	●	●
HepB	●	●	●	●	●	●	●	●
Hib	●		●	●	●			●
Influenza	●		●	●	●	●	●	●
IPV			●	●	●	●	●	●
Polio	●		●	●	●	●	●	●
Rotavirus				●	●	●	●	●
Sarampión	●		●	●	●	●	●	●
Tdap			●		●	●	●	●
TT	●		●	●	●	●	●	●
Cajas de seguridad	●		●	●	●	●	●	●
Jeringas AD	●		●	●	●	●	●	●
Jeringas desechables	●		●	●	●	●	●	●
Jeringas para reconst.			●	●	●	●		●

Legenda
 RN/rn- recién nacido
 M/m -mes
 A/a-año
 MEF-mujeres en edad fértil
 ● con desabastecimiento
 ● sin desabastecimiento
 sin datos disponibles