

Notas Técnicas

Definición de los Indicadores

Consumo actual de cualquier producto de tabaco

Estudiantes que han consumido cualquier producto de tabaco, **fumado o sin humo**, al menos una vez en los 30 días anteriores a la encuesta.

Consumo actual de cigarrillos

Estudiantes que han fumado **cigarrillos manufacturados**, al menos un día en el mes anterior a la encuesta.

Consumo actual de cualquier producto de tabaco, excepto cigarrillos.

Estudiantes que han consumido cualquier producto de **tabaco fumado o sin humo, excepto cigarrillos**.

Consumo actual de cigarrillos 1-5 días, 6-19 días, más de 20 días

Estudiantes que han consumido **cigarrillos manufacturados** en un número específico de días en los 30 días previos a la encuesta.

Consumo actual de productos de tabaco fumado, excepto cigarrillos

Estudiantes que han usado **productos de tabaco fumado, excepto cigarrillos manufacturados**.

Consumo actual de productos de tabaco sin humo

Estudiantes que han consumido **productos de tabaco sin humo** en los 30 días previos a la encuesta.

Clasificación de los productos de tabaco

Productos de tabaco fumado: Esta categoría incluye: cigarrillos manufacturados, cigarros, pipas, pipas de agua (narguile, hooka, shisha), cigarrillos armados, bidis, Kreteks y cualquier otra forma de producto de tabaco fumado.

Productos de tabaco sin humo: Esta categoría incluye productos en los que el tabaco no se quema e inhala, sino que puede ser masticado, absorbido por vía oral o aspirado por vía nasal conocidos como tabaco de mascar, oral, de escupir, chimo, snus, etc.

Acerca de las encuestas

Las encuestas fueron realizadas en diferentes países y años (entre 2000 y 2010). Algunos países han implementado la encuesta más de una vez. Los datos presentados en esta publicación son los datos de la última ronda de GYTS, disponibles en el país.

Datos subnacionales fueron presentados para Bolivia (La Paz), Brasil (São Paulo), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá), Ecuador (Quito), Haití (Port-au-Prince), Honduras (Tegucigalpa), México (Ciudad de México), Nicaragua (Centro Managua).

Limitaciones: Los datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS por sus siglas en inglés) están sujetos a tres limitaciones. Primera, la GYTS es aplicada en estudiantes y por eso no es representativa de todos los jóvenes con edades entre 13-15 años de los países/localidades. Segunda, los datos son de jóvenes que estuvieron en la escuela en el día que la encuesta fue aplicada. Finalmente, los datos son producidos en base al auto-reporte de los estudiantes que pueden haber exagerado o minimizado sus respuestas sobre sus comportamientos y actitudes.

Agradecimientos


Este material fue producido por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC). El apoyo financiero para la producción de este documento fue provisto por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC).

Puede encontrar más información sobre control de tabaco en la página web de OPS: www.paho.org

Tasas de Respuesta

Local de la Encuesta, Año	Tasa de Respuesta %				# Edad 13 - 15	% Participación de las jóvenes
	Escuela	Clase	Estudiante	Total		
Las Américas						
América del Norte						
Estados Unidos de América, 2009	92,3	100,0	91,9	84,8	9.702	48,7
América Latina y Caribe						
América Latina						
México						
México (Ciudad de México), 2006	96,0	100,0	84,5	81,2	1.412	50,2
Istmo Centroamericano						
Bélica, 2008	94,4	100,0	99,4	93,9	1.138	51,6
Costa Rica, 2008	100,0	97,5	82,7	80,6	2.920	49,2
El Salvador, 2009	100,0	100,0	93,8	93,8	3.063	51,0
Guatemala, 2008	96,3	98,9	83,6	79,6	3.838	50,1
Honduras (Tegucigalpa), 2003	91,3	98,3	81,7	73,3	1.119	55,4
Nicaragua (Centro Managua), 2003	100,0	100,0	86,4	86,4	881	51,6
Nicaragua, 2008	96,0	99,3	83,9	80,0	2.716	51,5
Caribe Latino						
Cuba, 2010	100,0	100,0	90,8	90,8	2.533	55,0
República Dominicana, 2004	97,3	100,0	86,2	83,9	3.600	51,5
Haití (Port-au-Prince), 2005	68,0	100,0	62,2	42,3	767	51,7
Puerto Rico, 2004	52,0	100,0	62,1	32,3	521	53,5
Area Andina						
Bolivia (La Paz), 2003	95,0	100,0	91,9	87,3	3.246	47,5
Colombia (Bogotá), 2007	93,8	100,0	89,5	83,9	1.235	53,3
Ecuador (Quito), 2007	92,0	100,0	95,1	87,5	1.389	52,8
Perú, 2007	98,6	97,5	87,7	84,3	6.686	49,6
Venezuela, 2010	86,9	100,0	87,4	75,9	1.522	50,4
Brasil						
Brasil (São Paulo), 2009	84,6	100,0	83,1	70,3	1.413	54,5
Cono Sur						
Argentina, 2007	94,7	92,2	78,2	68,2	3.452	52,0
Chile (Santiago), 2008	92,0	100,0	86,9	79,9	3.590	48,4
Paraguay, 2008	98,0	100,0	88,4	86,7	4.524	50,1
Uruguay, 2007	100,0	99,3	74,9	74,4	2.483	55,7
Caribe No-Latino						
Antigua & Barbuda, 2009	96,2	100,0	88,9	85,5	1.068	54,0
Bahamas, 2004	96,0	100,0	86,9	83,5	1.018	55,9
Barbados, 2007	95,5	100,0	83,2	79,4	1.066	52,6
Dominica, 2009	100,0	97,1	82,5	80,1	368	49,4
Granada, 2009	100,0	100,0	87,9	87,9	934	49,7
Guyana, 2010	100,0	99,0	76,7	75,9	1.798	51,5
Islas Virgenes (EUA), 2004	91,5	100,0	88,4	80,9	1.751	52,0
Islas Virgenes (RU), 2001	75,0	100,0	85,6	64,2	1.188	59,2
Jamaica, 2010	100,0	100,0	78,0	78,0	129	48,9
Montserrat, 2000	100,0	100,0	100,0	100,0	770	50,3
Saint Kitts & Nevis, 2010	100,0	100,0	73,9	73,9	836	51,0
Santa Lucía, 2007	100,0	97,8	77,7	76,0	872	55,6
San Vicente y las Granadinas, 2007	100,0	100,0	84,5	84,5	927	52,8
Suriname, 2009	100,0	100,0	93,4	93,4	1.802	51,1
Trinidad y Tabago, 2007	100,0	99,3	74,5	74,0	1.433	50,6

Inicio Temprano del Consumo de Cigarrillo



Datos no disponibles para todos los países/localidades. En algunos casos los datos no fueron extraídos del mismo año que los presentados en las tablas de prevalencia.

Exposición al Humo de Tabaco Ajeno

Local de la Encuesta, Año	% Estudiantes que informaron estar alrededor de fumadores fuera de sus hogares¹					
	Total		Masculino		Femenino	
	%	CI	%	CI	%	CI
Antigua & Barbuda, 2009	47,5	(43,9 - 51,1)	45,0	(40,2 - 50,0)	49,6	(44,5 - 54,7)
Argentina, 2007	68,6	(65,9 - 71,1)	66,4	(63,2 - 69,5)	70,7	(66,9 - 74,2)
Bahamas, 2004	51,1	(45,7 - 56,4)	48,9	(41,7 - 56,1)	52,1	(45,7 - 58,3)
Barbados, 2007	59,6	(56,3 - 62,7)	59,7	(55,0 - 64,2)	59,6	(54,5 - 64,5)
Bélica, 2008	50,4	(45,9 - 54,9)	52,1	(46,8 - 57,4)	48,6	(42,0 - 55,3)
Bolivia (La Paz), 2003	52,9	(49,5 - 56,3)	54,4	(51,7 - 57,0)	51,4	(46,4 - 56,3)
Brasil (São Paulo), 2009	51,3	(47,6 - 55,0)	48,2	(43,6 - 52,8)	54,1	(48,1 - 59,9)
Chile (Santiago), 2008	68,3	(65,6 - 71,0)	63,4	(60,3 - 66,5)	73,0	(69,3 - 76,5)
Colombia (Bogotá), 2007	56,1	(52,7 - 59,4)	55,1	(50,0 - 60,1)	56,9	(52,6 - 61,1)
Costa Rica, 2008	41,5	(38,3 - 44,8)	40,0	(36,5 - 43,6)	42,8	(38,4 - 47,4)
Cuba, 2010	60,4	(56,7 - 64,0)	58,5	(53,8 - 63,2)	62,1	(57,6 - 66,3)
Dominica, 2009	62,3	(58,5 - 66,0)	61,4	(55,8 - 66,6)	62,5	(57,3 - 67,4)
Ecuador (Quito), 2007	52,5	(47,7 - 57,3)	49,5	(44,7 - 54,4)	54,6	(48,2 - 60,9)
El Salvador, 2009	33,7	(31,4 - 36,1)	36,7	(33,6 - 39,8)	30,7	(27,5 - 34,1)
Estados Unidos de América, 2004	54,9	(52,4 - 57,4)	50,5	(47,9 - 53,1)	59,3	(56,6 - 62,0)
Granada, 2009	53,1	(50,1 - 56,1)	50,5	(46,4 - 54,6)	55,7	(52,3 - 58,9)
Guatemala, 2008	40,8	(36,3 - 45,4)	43,8	(39,3 - 48,4)	37,9	(32,5 - 43,6)
Guyana, 2010	55,0	(51,5 - 58,5)	53,9	(49,0 - 58,7)	55,8	(51,1 - 60,3)
Haití (Port-au-Prince), 2005	43,2	(38,0 - 48,6)	46,2	(40,1 - 52,4)	40,4	(33,3 - 47,9)
Honduras (Tegucigalpa), 2003	42,2	(36,5 - 48,2)	46,9	(38,1 - 55,9)	38,4	(32,5 - 44,6)
Islas Virgenes (EUA), 2004	36,6	(33,9 - 39,5)	34,2	(30,3 - 38,3)	38,9	(35,2 - 42,8)
Islas Virgenes (RU), 2001	43,3	(37,8 - 48,9)	40,5	(32,9 - 48,7)	43,4	(35,2 - 52,0)
Montserrat, 2000	43,4	*	41,7	*	42,4	*
Nicaragua (Centro Managua), 2003	54,1	(51,5 - 56,7)	56,4	(52,2 - 60,5)	51,9	(47,2 - 56,5)
Panamá, 2008	40,3	(37,1 - 43,5)	38,9	(36,0 - 41,9)	41,4	(37,2 - 45,7)
Paraguay, 2008	55,3	(51,2 - 59,2)	57,3	(52,2 - 62,3)	53,4	(48,0 - 58,8)
Perú, 2007	46,8	(44,3 - 49,4)	46,4	(42,4 - 50,6)	46,9	(42,9 - 51,0)
Puerto Rico, 2004	34,6	(30,3 - 39,2)	31,4	(25,5 - 38,1)	37,8	(32,3 - 43,7)
República Dominicana, 2004	41,9	(38,7 - 45,1)	38,5	(34,6 - 42,5)	44,9	(41,4 - 48,4)
Saint Kitts y Nevis, 2010	*	*	*	*	*	*
Santa Lucía, 2007	64,0	(59,3 - 68,5)	61,1	(55,0 - 66,9)	65,7	(59,7 - 71,2)
San Vicente y las Granadinas, 2007	59,7	(54,8 - 64,4)	56,5	(50,6 - 62,3)	61,8	(56,3 - 67,0)
Suriname, 2009	53,3	(49,5 - 57,1)	51,4	(45,8 - 56,9)	53,8	(49,1 - 58,3)
Trinidad y Tabago, 2007	64,2	(59,7 - 68,5)	62,8	(57,1 - 68,2)	65,9	(61,8 - 69,7)
Uruguay, 2007	68,6	(66,0 - 71,1)	64,0	(60,5 - 67,4)	72,1	(68,6 - 75,3)
Venezuela, 2010	*	*	*	*	*	*

¹ Fuera de sus hogares podría ser lugares cerrados o abiertos
* - Valor inferior a 35

Cesación

Local de la Encuesta, Año	% Fumadores actuales que desean dejar de fumar					
	Total		Masculino		Femenino	
	%	CI	%	CI	%	CI
Antigua & Barbuda, 2009	51,6	(36,2 - 66,7)	57,2	(26,2 - 83,3)	40,1	(19,6 - 64,8)
Argentina, 2007	50,2	(44,1 - 56,2)	47,3	(38,0 - 56,9)	52,3	(45,7 - 58,9)
Bahamas, 2004	*	*	*	*	*	*
Barbados, 2007	54,7	(39,3 - 69,3)	52,7	(36,7 - 68,2)	*	*
Bélica, 2008	74,7	(55,5 - 87,5)	*	*	*	*
Bolivia (La Paz), 2003	60,7	(51,0 - 69,6)	65,5	(54,8 - 74,8)	50,9	(41,8 - 60,0)
Brasil (São Paulo), 2009	63,6	(54,1 - 72,1)	56,2	(31,2 - 78,4)	71,5	(57,2 - 82,5)
Chile (Santiago), 2008	49,7	(45,8 - 53,5)	48,5	(41,9 - 55,2)	49,3	(44,7 - 54,0)
Colombia (Bogotá), 2007	64,7	(56,5 - 72,1)	65,5	(54,2 - 75,3)	63,1	(49,9 - 74,6)
Costa Rica, 2008	57,5	(49,4 - 65,2)	55,2	(43,3 - 66,5)	59,7	(47,3 - 71,0)
Cuba, 2010	55,0	(44,8 - 64,8)	56,7	(46,8 - 66,1)	52,0	(33,4 - 70,1)
Dominica, 2009	70,8	(57,8 - 81,1)	*	*	*	*
Ecuador (Quito), 2007	59,2	(48,9 - 68,8)	64,5	(53,2 - 74,4)	54,1	(36,9 - 70,4)
El Salvador, 2009	58,0	(43,6 - 71,2)	72,4	(57,4 - 83,6)	40,4	(24,9 - 58,2)
Estados Unidos de América, 2004	51,5	(47,5 - 55,5)	48,2	(43,1 - 53,3)	54,4	(49,7 - 59,1)
Granada, 2009	72,9	(58,0 - 83,9)	76,2	(53,6 - 89,8)	*	*
Guatemala, 2008	60,1	(51,9 - 67,9)	65,6	(55,9 - 74,1)	53,4	(40,6 - 65,7)
Guyana, 2010	81,5	(69,2 - 89,6)	88,9	(77,5 - 94,9)	64,5	(39,2 - 83,6)
Haití (Port-au-Prince), 2005	72,6	(56,6 - 84,4)	*	*	77,0	(54,0 - 90,6)
Honduras (Tegucigalpa), 2003	58,8	(44,5 - 71,7)	70,2	(44,6 - 87,3)	50,2	(38,4 - 61,9)
Islas Virgenes (EUA), 2004	*	*	*	*	*	*
Islas Virgenes (RU), 2001	*	*	*	*	*	*
Jamaica, 2010	59,1	(45,1 - 71,7)	55,9	(42,4 - 68,5)	63,3	(48,2 - 76,2)
México (Ciudad de México), 2006	42,2	(36,3 - 48,4)	42,5	(34,9 - 50,4)	45,7	(37,8 - 53,8)
Montserrat, 2000	*	*	*	*	*	*
Nicaragua (Centro Managua), 2003	60,4	(44,5 - 74,3)	65,0	(43,9 - 81,6)	53,0	(31,2 - 73,7)
Panamá, 2008	65,9	(47,8 - 80,3)	69,7	(51,3 - 83,5)	*	*
Paraguay, 2008	59,0	(42,2 - 74,0)	57,2	(36,7 - 75,6)	63,4	(46,0 - 77,9)
Perú, 2007	72,2	(66,5 - 77,2)	71,0	(61,5 - 79,0)	73,1	(64,1 - 80,6)
Puerto Rico, 2004	*	*	*	*	*	*
República Dominicana, 2004	50,9	(31,6 - 69,9)	*	*	54,0	(27,4 - 78,5)
Saint Kitts y Nevis, 2010	81,0	(43,8 - 95,9)	87,1	(

Prólogo

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han apoyado el Sistema Mundial de Vigilancia de Tabaco (Global Tobacco Surveillance System- GTSS) en la Región de las Américas por más de una década.

El GTSS ha sido implementado con éxito en todos los países de la Región de las Américas y en más de 170 Estados Miembros de la OMS. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto de la OPS/OMS, CDC y los Ministerios de Salud. La vigilancia es una herramienta importante que ha ayudado a los países a frenar la epidemia del tabaco y a avanzar en la implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT OMS).

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (Global Youth Tobacco Survey -GYTS) es uno de los componentes del GTSS y utiliza un cuestionario patrón y una metodología estandarizada con una muestra representativa de estudiantes en los grados asociados a las edades de 13 a15 años.

La encuesta produce datos sobre la prevalencia del cigarrillo y de otros productos de tabaco, la exposición al humo de tabaco ajeno, actitudes y conocimientos de los estudiantes hacia el tabaquismo, currículo escolar, exposición a los medios de comunicación, el acceso/disponibilidad de cigarrillos y cesación. Esta encuesta ha sido realizada en las Américas, en colaboración con las autoridades nacionales desde 1999.

Este folleto presenta una selección de resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes y esperamos sea un instrumento importante para ayudar a los países en el planeamiento y evaluación de intervenciones apropiadas y efectivas para controlar el consumo y exposición de los jóvenes a los productos de tabaco, una población que ha sido constantemente el blanco de las estrategias de la industria tabacalera.

Para esta publicación: **América Latina está compuesta por México, el Istmo Centroamericano, el Caribe Latino, el Área Andina, Brasil y el Cono Sur. América Latina y el Caribe se compone por América Latina y el Caribe No-Latino. Debido a su tamaño poblacional Brasil y México se muestran separados. Canadá no fue incluido porque no es parte del Sistema Mundial de Vigilancia de Tabaquismo (Global Tobacco Surveillance System - GTSS)**

Prevalencia

Local de la Encuesta, Año	Consumo Actual de Cualquier Producto de Tabaco % (95% CI)			Consumo Actual de Cigarrillos % (95% CI)		
	Total	Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino
Las Américas	16,2 (14,2 - 18,5)	17,8 (15,2 - 20,7)	14,5 (12,3 - 16,9)	11,9 (10,1 - 14,0)	12,3 (10,0 - 15,0)	11,3 (9,4 - 13,6)
América del Norte						
Estados Unidos de América, 2009	13,2 (11,6 - 15,1)	15,4 (13,1 - 17,9)	11,1 (9,7 - 12,7)	8,8 (7,3 - 10,4)	9,7 (7,8 - 11,9)	7,9 (6,9 - 9,2)
América Latina y el Caribe	20,4 (18,0 - 23,2)	21,2 (18,1 - 24,7)	19,2 (16,1 - 22,9)	16,2 (13,9 - 18,9)	15,9 (13,1 - 19,2)	16,1 (13,1 - 19,7)
América Latina	20,3 (17,9 - 23,0)	21,0 (18,0 - 24,4)	19,2 (16,1 - 22,8)	16,3 (14,1 - 18,9)	15,9 (13,1 - 19,1)	16,2 (13,3 - 19,8)
México						
México (Ciudad de México), 2006	28,6 (25,2 - 32,2)	27,8 (23,6 - 32,4)	28,5 (25,2 - 32,0)	27,1 (23,8 - 30,8)	26,3 (22,0 - 31,0)	27,1 (23,7 - 30,8)
Istmo Centroamericano	15,8 (13,6 - 18,2)	18,7 (15,8 - 22,0)	12,8 (10,4 - 15,7)	10,6 (8,6 - 13,1)	12,4 (9,7 - 15,9)	8,8 (6,7 - 11,5)
Belize, 2008	18,3 (15,6 - 21,5)	21,8 (18,2 - 26,0)	15,3 (12,1 - 19,0)	7,7 (5,7 - 10,4)	5,9 (4,5 - 7,7)	*
Costa Rica, 2008	14,6 (13,1 - 16,2)	15,9 (14,0 - 17,9)	13,1 (11,2 - 15,3)	9,6 (7,9 - 11,7)	9,4 (7,2 - 12,0)	9,7 (7,8 - 12,1)
El Salvador, 2009	14,6 (12,6 - 16,7)	18,2 (15,1 - 21,8)	11,0 (9,1 - 13,2)	9,1 (7,3 - 11,3)	11,2 (8,3 - 15,1)	7,1 (5,5 - 8,9)
Guatemala, 2008	16,6 (14,5 - 18,9)	19,7 (16,8 - 22,9)	13,3 (11,0 - 16,1)	11,4 (9,5 - 13,6)	13,7 (10,9 - 17,0)	9,3 (7,0 - 11,6)
Honduras (Tegucigalpa), 2003	20,4 (16,9 - 24,4)	22,8 (19,3 - 26,7)	18,2 (13,8 - 23,7)	14,2 (10,6 - 18,8)	14,4 (10,9 - 18,8)	14,1 (9,8 - 19,9)
Nicaragua (Centro Managua), 2003	25,1 (21,1 - 29,6)	30,4 (26,3 - 34,9)	20,5 (15,6 - 26,4)	21,2 (17,2 - 25,8)	25,6 (21,4 - 30,3)	17,4 (12,6 - 23,6)
Panamá, 2008	8,4 (6,4 - 11,0)	10,5 (7,7 - 14,1)	6,5 (4,8 - 8,7)	4,3 (3,0 - 6,2)	5,9 (4,0 - 8,5)	7,8 (6,1 - 9,8)
Caribe Latino	15,0 (12,5 - 18,3)	17,2 (13,9 - 21,1)	13,1 (10,0 - 17,1)	8,3 (6,2 - 11,0)	8,5 (6,2 - 11,7)	8,1 (5,5 - 11,9)
Cuba, 2010	17,1 (14,2 - 20,6)	19,8 (14,7 - 26,2)	15,0 (12,7 - 17,6)	10,6 (8,9 - 12,6)	13,1 (9,8 - 17,3)	8,7 (7,1 - 10,7)
República Dominicana, 2004	14,9 (13,3 - 16,8)	14,9 (13,3 - 16,8)	11,9 (9,8 - 14,3)	11,9 (9,8 - 14,3)	7,9 (5,9 - 9,0)	5,4 (4,0 - 8,2)
Haití (Port-au-Prince), 2005	23,2 (19,7 - 27,1)	21,7 (17,0 - 27,2)	23,9 (19,2 - 29,3)	17,6 (13,6 - 22,6)	17,2 (12,4 - 23,5)	17,7 (13,3 - 23,0)
Puerto Rico, 2004	11,9 (7,9 - 17,7)	12,8 (8,7 - 18,6)	10,9 (6,5 - 17,6)	7,3 (4,2 - 12,4)	5,7 (2,8 - 11,2)	9,0 (4,9 - 16,0)
Área Andina	16,3 (14,0 - 19,0)	18,0 (15,1 - 21,4)	14,1 (11,2 - 17,6)	12,8 (10,7 - 15,1)	13,8 (11,2 - 16,8)	11,4 (8,7 - 14,8)
Bolivia (La Paz), 2003	20,8 (18,0 - 23,8)	24,7 (20,6 - 29,3)	16,6 (14,3 - 19,1)	16,3 (13,4 - 19,6)	20,3 (16,5 - 24,7)	12,9 (9,3 - 15,3)
Colombia (Bogotá), 2007	27,6 (23,7 - 31,8)	27,6 (22,7 - 31,7)	27,0 (22,7 - 31,7)	27,0 (22,7 - 31,7)	25,4 (21,0 - 30,3)	26,6 (20,9 - 33,1)
Ecuador (Quito), 2007	28,6 (23,8 - 33,9)	31,2 (27,9 - 34,8)	26,1 (18,9 - 34,8)	20,5 (15,6 - 26,6)	23,2 (19,4 - 27,6)	18,1 (11,1 - 28,0)
Perú, 2007	19,4 (16,9 - 22,3)	21,5 (18,8 - 24,6)	16,5 (13,7 - 19,8)	15,7 (13,5 - 18,1)	17,7 (15,2 - 20,6)	12,9 (10,5 - 15,7)
Venezuela, 2010	9,4 (7,9 -11,3)	11,0 (8,5-14,2)	7,2 (5,2-10,4)	5,6 (4,4-7,1)	5,8 (4,0-8,3)	5,4 (3,6-8,0)
Brasil						
Brasil (São Paulo), 2009	30,1 (26,1 - 34,5)	28,7 (25,4 - 32,1)	30,8 (25,0 - 37,2)	11,6 (8,3 - 16,1)	9,2 (6,8 - 12,3)	13,2 (8,5 - 19,9)
Cono Sur	27,0 (25,0 - 29,3)	25,5 (22,9 - 28,3)	28,4 (24,7 - 32,2)	23,0 (21,6 - 28,4)	21,6 (17,6 - 23,1)	25,7 (22,1 - 29,7)
Argentina, 2007	28,0 (25,9 - 30,3)	26,1 (23,6 - 28,8)	29,7 (25,7 - 34,0)	24,5 (22,2 - 27,0)	21,1 (18,5 - 23,8)	27,3 (23,4 - 31,6)
Chile (Santiago), 2008	35,1 (32,4 - 37,9)	29,8 (26,2 - 33,7)	39,8 (35,8 - 43,8)	34,2 (31,3 - 37,3)	28,0 (24,3 - 32,0)	39,9 (36,0 - 43,9)
Paraguay, 2008	16,7 (15,3 - 18,1)	20,8 (18,9 - 22,7)	10,3 (11,3 - 14,6)	8,5 (7,9 - 9,0)	11,3 (9,3 - 13,6)	8,5 (6,9 - 9,3)
Uruguay, 2007	23,2 (21,0 - 25,5)	21,4 (18,1 - 25,1)	24,5 (21,8 - 27,4)	20,2 (18,0 - 22,6)	16,4 (13,5 - 19,8)	22,9 (20,1 - 26,0)
Caribe No-Latino	23,2 (18,9 - 28,0)	25,7 (20,3 - 32,0)	19,7 (14,4 - 26,3)	13,5 (10,0 - 17,9)	16,3 (11,9 - 21,9)	10,6 (6,9 - 15,9)
Antigua & Barbuda, 2009	20,1 (17,6 - 22,7)	24,3 (21,1 - 27,8)	15,9 (12,5 - 20,1)	5,2 (3,9 - 6,7)	4,3 (2,6 - 7,1)	4,3 (2,6 - 7,1)
Bahamas, 2004	11,9 (10,1 - 13,8)	12,9 (10,3 - 16,1)	10,2 (7,6 - 13,5)	5,2 (4,0 - 6,7)	6,2 (3,8 - 10,1)	3,7 (2,1 - 6,6)
Barbados, 2007	28,6 (25,2 - 32,2)	34,5 (30,1 - 39,3)	23,2 (19,4 - 27,5)	11,6 (8,9 - 15,0)	14,3 (10,4 - 19,3)	9,3 (6,4 - 13,2)
Dominica, 2009	25,3 (22,0 - 29,0)	30,4 (24,6 - 36,8)	19,8 (16,1 - 24,2)	11,6 (8,9 - 15,1)	13,8 (9,5 - 19,7)	8,9 (6,0 - 12,8)
Granada, 2009	20,5 (18,0 - 23,3)	24,5 (20,5 - 29,0)	16,7 (14,4 - 19,2)	8,1 (6,4 - 10,2)	9,9 (7,5 - 13,0)	6,2 (4,4 - 8,7)
Guyana, 2010	20,9 (17,4 - 24,9)	25,3 (20,4 - 31,1)	16,0 (12,9 - 19,5)	9,5 (7,0 - 12,7)	13,3 (9,2 - 18,9)	5,6 (4,4 - 7,1)
Islas Vírgenes (EUA), 2004	7,8 (6,4 - 9,5)	9,9 (7,6 - 12,7)	5,7 (4,1 - 7,9)	3,4 (2,5 - 4,6)	3,1 (2,0 - 4,7)	3,5 (2,4 - 5,2)
Islas Vírgenes (RU), 2001	10,5 (7,4 - 14,7)	11,3 (8,7 - 18,3)	10,1 (6,8 - 14,7)	3,5 (2,0 - 5,9)	4,1 (1,7 - 9,2)	2,8 (1,1 - 6,7)
Jamaica, 2010	28,7 (22,9 - 35,3)	31,3 (24,2 - 39,3)	24,6 (17,1 - 34,1)	17,8 (12,8 - 24,1)	21,5 (15,9 - 28,1)	14,3 (9,0 - 22,1)
Montserrat, 2000	12,5	10,2	13,6	5,6	3,5	6,3
Saint Kitts y Nevis, 2010	9,2 (6,6 - 12,6)	10,4 (7,0 - 15,1)	7,8 (4,9 - 12,1)	4,0 (2,4 - 6,6)	4,8 (2,7 - 8,5)	3,2 (1,6 - 5,1)
Santa Lucía, 2007	17,9 (14,8 - 21,4)	22,4 (16,9 - 29,2)	14,5 (11,3 - 18,4)	5,2 (3,6 - 7,1)	17,0 (12,2 - 23,1)	9,6 (7,4 - 12,4)
San Vicente y las Granadinas, 2007	19,1 (15,5 - 23,4)	22 (16,8 - 28,2)	16,6 (13,1 - 20,9)	12,0 (9,0 - 15,9)	14,8 (9,8 - 21,7)	9,5 (6,6 - 13,4)
Suriname, 2009	12,2 (10,2 - 14,2)	20,7 (17,2 - 24,8)	16,6 (12,4 - 21,9)	9,1 (7,5 - 11,6)	14,0 (10,8 - 17,8)	10,1 (6,0 - 16,4)
Trinidad y Tobago, 2007	19,9 (16,1 - 24,4)	20,8 (16,2 - 26,4)	17,8 (12,8 - 24,1)	12,9 (9,9 - 16,7)	14,0 (10,8 - 17,8)	10,3 (6,9 - 15,1)

Prevalencia

Local de la Encuesta, Año	Consumo Actual de Cualquier Producto de Tabaco, Excepto Cigarrillos % (95% CI)			Consumo Actual de Cigarrillos 1-5 días % (95% CI)		
	Total	Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino
Las Américas	8,3 (7,1 - 9,8)	10,5 (8,6 - 12,8)	6,1 (4,9 - 7,7)	59,1 (53,6 - 64,0)	57,5 (49,5 - 64,7)	61,1 (53,4 - 68,2)
América del Norte						
Estados Unidos de América, 2009	9,2 (8,0 - 10,6)	11,6 (9,8 - 13,7)	6,7 (5,6 - 8,1)	49,7 (45,4 - 53,9)	48,0 (41,0 - 55,1)	51,7 (44,4 - 59,0)
América Latina y el Caribe	7,1 (5,8 - 8,7)	8,9 (6,9 - 11,5)	5,3 (4,0 - 7,2)	72,2 (65,1 - 78,0)	71,0 (61,5 - 78,3)	74,5 (65,7 - 81,3)
América Latina	6,9 (5,6 - 8,4)	8,7 (6,8 - 11,2)	5,1 (3,8 - 6,9)	72,0 (65,0 - 77,8)	70,8 (61,3 - 78,1)	74,3 (65,7 - 81,1)
México						
México (Ciudad de México), 2006	4,8 (3,6 - 6,4)	5,5 (3,3 - 9,0)	4,0 (3,0 - 5,3)	71,9 (64,1 - 78,6)	67,8 (60,4 - 74,4)	77,0 (65,3 - 85,6)
Istmo Centroamericano	8,1 (6,9 - 9,5)	9,9 (8,1 - 12,0)	6,2 (5,0 - 7,8)	74,4 (67,5 - 80,1)	72,2 (63,6 - 79,4)	76,4 (66,0 - 84,3)
Belize, 2008	14,5 (10,7 - 16,7)	14,5 (10,7 - 19,5)	5,9 (4,5 - 7,7)	85,3 (74,2 - 92,1)	81,4 (67,8 - 90,1)	*
Costa Rica, 2008	7,7 (6,6 - 8,9)	9,3 (8,1 - 10,8)	6,4 (5,1 - 8,0)	69,1 (62,1 - 75,3)	68,2 (59,4 - 75,8)	70,2 (60,9 - 78,0)
El Salvador, 2009	8,5 (7,2 - 10,0)	10,7 (8,9 - 12,7)	6,2 (5,3 - 7,2)	71,1 (65,3 - 76,3)	68,1 (60,8 - 74,6)	75,3 (66,3 - 82,6)
Guatemala, 2008	7,9 (7,1 - 8,9)	9,5 (8,0 - 11,3)	8,0 (5,8 - 10,9)	78,4 (70,9 - 84,7)	77,7 (71,0 - 82,7)	78,7 (70,1 - 87,7)
Honduras (Tegucigalpa), 2003	9,9 (8,2 - 11,9)	12,1 (9,3 - 15,6)	8,0 (5,8 - 10,9)	64,9 (54,1 - 74,4)	54,3 (38,2 - 69,5)	72,7 (58,7 - 83,3)
Nicaragua (Centro Managua), 2003	9,6 (7,0 - 12,9)	12,8 (9,8 - 16,5)	6,7 (3,9 - 11,3)	81,0 (73,2 - 88,1)	75,5 (62,1 - 89,0)	84,0 (71,9 - 91,5)
Panamá, 2008	7,1 (5,3 - 9,5)	7,1 (5,3 - 9,5)	4,5 (3,3 - 6,0)	73,0 (62,8 - 81,2)	70,4 (57,9 - 80,5)	76,1 (65,8 - 86,9)
Caribe Latino	8,9 (7,0 - 11,7)	10,9 (8,1 - 14,8)	7,1 (5,0 - 10,2)	75,0 (62,8 - 85,3)	86,8 (75,1 - 93,3)	79,0 (66,4 - 87,7)
Cuba, 2010	8,2 (5,9 - 11,3)	8,9 (5,5 - 14,1)	7,6 (5,9 - 9,6)	71,9 (64,3 - 78,5)	69,4 (55,6 - 80,5)	75,8 (63,7 - 84,8)
República Dominicana, 2004	10,0 (8,5 - 11,8)	12,9 (10,6 - 15,8)	7,4 (6,0 - 9,2)	80,6 (73,5 - 87,8)	79,3 (68,1 - 90,7)	80,3 (68,1 - 88,6)
Haití (Port-au-Prince), 2005	10,4 (8,3 - 13,1)	9,0 (6,5 - 12,3)	11,1 (7,4 - 16,3)	74,1 (59,6 - 84,7)	72,1 (52,7 - 85,8)	76,6 (60,0 - 87,7)
Puerto Rico, 2004	7,7 (4,9 - 11,9)	9,6 (5,9 - 15,4)	5,5 (2,8 - 10,6)	45,7 (22,2 - 71,2)	*	*
Área Andina	4,9 (3,9 - 6,1)	6,2 (4,7 - 8,2)	3,3 (2,3 - 4,8)	80,5 (74,1 - 85,0)	77,7 (66,9 - 84,9)	82,7 (77,6 - 86,9)
Bolivia (La Paz), 2003	8,2 (7,0 - 9,7)	9,5 (7,8 - 11,5)	6,9 (5,7 - 8,3)	81,9 (75,2 - 87,1)	79,4 (69,4 - 86,8)	86,9 (80,8 - 91,3)
Colombia (Bogotá), 2007	6,7 (4,7 - 9,7)	3,6 (2,4 - 5,4)	6,2 (4,2 - 8,4)	83,6 (52,8 - 93,1)	80,2 (64,8 - 91,3)	80,2 (74,0 - 87,3)
Ecuador (Quito), 2007	15,3 (12,7 - 18,3)	15,9 (12,9 - 19,5)	14,6 (11,1 - 19,0)	81,5 (76,0 - 85,9)	80,2 (70,4 - 87,3)	84,5 (77,6 - 89,5)
Perú, 2007	3,7 (3,0 - 4,5)	4,4 (3,4 - 5,7)	3,0 (2,2 - 4,2)	70,7 (65,7 - 75,2)	71,0 (63,2 - 77,8)	69,0 (61,4 - 75,6)
Venezuela, 2010	51,0 (4,0 - 6,4)	6,9 (5,3-9,1)	2,6 (1,6 - 4,1)	91,3 (83,6 - 95,5)	87,5 (73,9 - 94,5)	95,2 (92,8 - 96,9)
Brasil						
Brasil (São Paulo), 2009	25,0 (22,0 - 28,4)	25,5 (22,7 - 28,5)	24,3 (19,8 - 29,6)	66,0 (54,9 - 75,5)	70,8 (53,0 - 84,0)	63,9 (50,6 - 75,4)
Cono Sur	29,0 (26,7 - 10,6)	11,4 (9,5 - 13,7)	6,9 (5,3 - 8,9)	59,3 (53,4 - 64,1)	55,4 (47,5 - 62,4)	61,8 (53,6 - 68,8)
Argentina, 2007	8,9 (7,4 - 10,5)	11,6 (9,6 - 13,9)	6,5 (4,9 - 8,5)	57,5 (52,2 - 62,3)	53,4 (45,0 - 61,6)	59,9 (52,4 - 66,9)
Chile (Santiago), 2008	9,2 (8,1 - 10,4)	9,5 (8,1 - 11,1)	8,8 (7,0 - 11,0)	53,8 (49,0 - 58,5)	54,9 (44,1 - 61,5)	53,0 (47,5 - 58,4)
Paraguay, 2008	13,1 (11,3 - 14,6)	12,4 (10,3 - 14,8)	8,4 (7,0 - 10,0)	62,4 (56,0 - 68,9)	71,4 (64,7 - 77,3)	78,3 (70,0 - 84,0)
Uruguay, 2007	7,9 (6,6 - 9,4)	10,3 (8,1 - 13,0)	6,1 (4,6 - 8,0)	51,8 (46,0 - 57,5)	51,9 (42,7 - 60,9)	51,8 (44,2 - 59,5)
Caribe No-Latino	14,5 (11,8 - 17,6)	15,9 (11,8 - 21,1)	12,2 (9,0 - 16,4)	77,1 (67,5 - 84,7)	78,5 (67,6 - 86,2)	78,8 (65,2 -